




1902

USNM

EX LIBRIS

William Healey Dall

Division of Mollusks  
Sectional Library










I. Born

WILLIAM H. DALL  
SECTIONAL LIBRARY  
DIVISION OF MOLLUSKS





*Ignatii a Born Equ.*


*Academiae Imp. Naturae Curiosorum, Petropolit.  
Londinens. Holmens. Göttingens. Upsaliensis, Londin.  
gothorum, Senens. Monacensis, Burghaus. Pata.  
vinæ nec non Physicorum Bercliniensium Sodalit.*


*INDEX  
Rerum Naturalium  
Musei  
Cesarei Vindobonensis  
Pars I.<sup>ma</sup>  
Testacea*

*Verzeichniß  
Der natürlichen Seltenheiten  
des k.k.  
Naturalien Cabinets  
zu Wien  
Erster Theil  
Schalthiere*

*Vindobonæ, ex Officina Krausiana. 1778.*

*Division of Mollusks  
Sectional Library*





## AD LECTOREM.

*Si publicas rerum naturalium collectiones  
opportuna atque efficacia ad dilatandam  
bistoriae naturalis cognitionem subsidia esse  
conuenit, finis hic nulla alia ratione obti-  
netur, quam si cuiusvis naturae scrutatori  
aditus aperiatur ad ea ex thesauris istis de-*

\*

*pro-*

## AD LECTOREM.

*promenda, quae siue ad vniuersale aliquod systema concinnandum, perpoliendumue, siue ad singulares obseruationes instituendas vsui ipsi esse possunt.*

*Patent quidem Musea rerum naturalium passim curiosorum conspectui, & quidquid in iis rarum & singulare admirandum est, a Praefectis diligenter ostenditur. At vero si perpendimus, quam velocibus, & quasi fugientibus oculis, totum hunc corporum naturalium apparatus, ob temporis, quod ei exhibendo definitum est, angustias, percurrere oporteat; quam exigua mora in hoc illoue corpore, quod animaduer-*

*uer-*

## AD LECTOREM.

*uersionem nostram maxime excitat, obtutum attentionemque defigere liceat; quam raro singulae partes naturali & continua serie sua exhiberi possint, ac demum quam plena molestiae taediique eorum, qui Museis istis praesunt, sit occupatio, eandem, ut ajunt, crabem fere quotidie recoquere, operamque suam saepius apud homines scientiae naturalis prorsus ignaros & magis curiositati suae, quam scientiae amplificandae studio seruientes perdere; facile profecto videbimus: Musea haec semper aliena fore a proposito, donec res naturales iis contentae accurate describantur, atque ea*



## AD LECTOREM.

*ratione ad notitiam manusque omnium, qui  
iisdem uti volent, perueniant. Sane si-  
ne tali instituto pretiosissima licet & varif-  
sima naturae cimmelia exteris maximam  
partem incognita, indigenis vero inutilia  
remanere necesse est.*

*Id animo reuoluens AVGVSTA on-  
stra, non patriae tantum, sed & scien-  
tiarum artiumque Mater, cuius gloriosif-  
simi, sapientissimique imperii haec aeterna  
& peculiaris erit memoria, prouidisse ip-  
sam singulari sollicitudine omnia, quaecun-  
que ad instituendos excolendosque subdito-  
rum animos conducere valeant, locupletif-  
si-*

AD LECTOREM.

*simum ac pretiosissimum rerum natura-  
lium thesaurum, qui in palatio Caesa-  
reo Viennae adservatur, quemque FRAN-  
CISCO Augusto, Diuo illius Conjugi,  
sagacissimo rerum istarum aestimatori,  
conquisitorique solertissimo, acceptum re-  
ferimus, publici juris facere, atque ad id  
peragendum opera mea — quamvis praeter  
meritum — uti decrevit. Parui, ut par  
erat ILLIUS mandato, atque una cum ex-  
quisitis artificibus operi concinnando, exor-  
nando, perficiendoque illico manus admo-  
ui, cuius Volumen primum propediem typis  
exscriptum prodibit in lucem.*

*Quo-*

## AD LECTOREM.

Quoniam vero neque omnes officii mei partes exsecutus, neque totam beneficentiae *AVGVSTAE* amplitudinem complexus videri poteram, si diligentiam meam soli illi operi adornando impenderem, majoris utpote pretii, quam ut a quolibet historiae naturalis studioso comparari possit, ad indicem hunc, facile cuius parabilem, conscribendum, animum adjeci. Is enim & iis, quibus Museum hoc Caesareum videndi est facultas, quidquid eodem continetur, intento velut digito commonstrabit, & aliis, qui alibi degunt, scientiae naturalis cultoribus, baud mediocri adjumento erit.

Ni-

AD LECTOREM.

*Nil aliud Indici huic inseri poterat, nisi quod re ipsa in Museo nostro reperitur. Vnde & corpora eodem contenta non secundum novum quodpiam, a me fortasse condendum systema, sed secundum aliquod ex iis, quae jam ab aliis constituta habemus, disponi oportebat. Qua re & illa difficultate me expediui, qua naturalis historiae scriptores in novis novarum rerum nominibus apte imponendis passim implicantur.*

*In prima hac parte, quae Conchyliorum indicem exhibet, diligenti omnium prope Conchyliographorum instituto examine, mag-*

## AD LECTOREM.

*ni Linnaei systema secutus sum, propterea: quod omnium, quae adhuc extant — quidquid alii obloquantur — sit absolutissimum; quod characteres generum, familiarum, specierumque singularum, quoad in systemate, quod sola testarum figura nititur, fieri potuit, accuratissime designet; quodque tamdiu praestantiam suam, auctoritatemque tuebitur, donec Adansonii, Basteri, Ottones Mülleri consequentium seculorum, studio, sagacitate & industria Svammerdamii, Bradleii, Pouparti, & Reaumurii animati, accuratam descriptionem formae, partium, generis, vivendique rationis, quae*

## AD LECTOREM.

*unicuique testaceorum animalium propria sunt, praebeant; ut tandem genuinum Conchyliorum systema naturale, aut saltem ad naturam proxime accedens constitui possit.*

*Linnaei igitur, ut dixeram, systema secutus, nequaquam tamen presse adeo vestigiis ipsius institi, ut non interdum generum ac specierum definitiones ab ipso propositas distinctius enarrare, & si dicere fas est, emendare ausus fuerim. Neque non conatus sum, singulas Concharum partes decentioribus nominibus insignire; figuras a Linnaeo commemoratas rectius indicaui, du-*  
*bias*

AD LECTOREM.

*bias omisi, easque ex recentioribus Conchyliologis supplui, parum curans: quid teutonica Linnaeani systematis editio, Index Linnaeanus in Knorriana Conchyliographia, & Jo. Sam. Schröterus in Bibliothecae lithologico conchyliographiae Tomo IV. peccauerit.*

*Eas Conchyliorum species, quas Linnaei systema haud complectitur, methodo, summo huic viro usitata, descripsi, illis familiis, quibus procul dubio ipse easdem inserturus erat, singulas inserui, notas omnes characteresque fusius declaravi, &*  
*ad*



A D L E C T O R E M.

*ad accuratas earundum effigies, quae in maiori opere comparebunt, prouocauit.*

*Denique singulorum testaceorum nomina triuialia, quibus gallica, anglica & belgica lingua compellantur, ex optimis harum nationum scriptoribus adjeci; generaque, familias, species, & varietates eorum, quae hoc indice continentur, apposita alphabeti littera distinxi, ut ii, qui Museum lustraturi sunt, omnia facilius inueniant.*

*Eadem methodo & in aliis thesauri hujus Caesarei rerum naturalium Classibus describendis progrediar, quarum quidem*

*ma-*

AD LECTOREM.

*maturationem , tametsi pluribus aliis negotiis destinear , tanto certius polliceri audeo , quod Viri doctissimi Georgii Sebastiani Helbling de Hirzenfeld , qui pro singulari , qua in rerum naturalium cognitionem fertur , studio , eximiam hoc in genere doctrinam sibi comparavit , amica opera me non parum adjuvari hic gratus profitear.*

# An den Leser.

Sollen öffentliche Naturaliensammlungen wirksame Hilfsmittel zu Erweiterung der Kenntnisse in der Naturgeschichte seyn, so wird dieser Entzweck nur dadurch erreicht, wenn jedem Naturforscher Gelegenheit verschafft wird, aus diesen Behältnissen natürlicher Seltenheiten die erforderlichen Materialien herzuholen, deren er etwann zur Darstellung eines allgemeinen Natursystems, zur Vervollkommnung desselben oder zu seinen einzelnen Beobachtungen bedarf. Zwar

## An den Leser.

stehen die meisten Naturalien Kabinete dem Wißbegierigen offen , und werden von den Vorstehern derselben vorgezeigt. Wenn man aber weiß , wie flüchtig man meistens in dem kurzen Zeitraume , der zu diesen Vorgeigungen bestimmt ist , den ganzen Vorrath natürlicher Körper durchzugehen gezwungen werde ; wie wenig man sich bei einem oder dem andern Gegenstande , welcher etwann unsre Aufmerksamkeit mehr reizet , verweilen dürfe ; wie selten alle einzelne Stücke in ihrem Zusammenhange vorgezeigt werden können ; wie unangenehm es den Vorstehern dieser Sammlungen fallen müsse , eine und eben dieselbe Sache fast täglich

lich

## An den Leser.

lich zu wiederholen , und ihre Mühe öfters an Leute zu verschwenden , welche ohne alle Vorbereitung und Kenntniß in diesem Fache mehr aus Neugierde , als aus Verlangen sich zu unterrichten herbeigelockt werden ; und daß endlich bei derlei Anstalten dennoch immer diese Schätze der Natur dem auswärtigen oder entfernten Gelehrten verborgen bleiben ; so wird man sich leicht überzeugen , daß der Hauptzweck , welcher die Errichtung öffentlicher Naturalienkabinete veranlasset hat , in so lang verfehlet werde , bis diese nicht durch eine vollständige Beschreibung aller einzelnen Theile derselben allgemein bekannt gemacht und

## An den Leser.

auf diese Art gleichsam in die Hände eines jeden, der solche benützen kann, gebracht werden.

Unsere erhabene Monarchinn, deren weiseste Regierung sich durch eine unumschränkte Sorgfalt für alles, was zum Unterrichte und zur Aufklärung ihrer Unterthanen beitragen kann, vorzüglich auszeichnet, hat aus diesen Beweggründen die öffentliche Bekanntmachung des k. k. Naturalienkabinetts, dessen Entstehung und Daseyn wir Allerhöchst Ihrem verewigten Gemahl verdanken, anzubefehlen, und diese Arbeit — wieder meine Verdienste — mir aufzutragen geruhet, an welche sowohl ich, als die zur Vervollkommnung und Verschönerung

die-

dieses Werks ausersehenen Künstler unverzüglich Hand angelegt haben; so daß wir im kurzen den ersten Band der Beschreibung des **K.K. Naturalienkabinetts zu Wien** herauszugeben, im Stande seyn werden.

Vielleicht würde ich aber meiner Pflicht und der allerhöchsten Absicht nicht ganz Genüge leisten, wenn ich mich bloß auf jene kostbare Ausgabe, die ihres höhern Preises wegen nicht gemeinnützig genug werden dürfte, einschränken sollte. In dieser Rücksicht habe ich das gegenwärtige, minder kostbare Verzeichniß entworfen, welches jenen, die dieses Cabinet selbst zu besehen Gelegenheit haben, zu einem



## An den Leser.

Handbuche dienen, den von dieser Hauptstadt entfernten Naturforschern aber immer noch einen zureichenden Begriff von den darinn befindlichen Seltenheiten geben kann.

Da ich in diesem Verzeichnisse bloß diejenigen natürlichen Körper, welche sich wirklich in diesem Kabinete befinden, anführen darf, so folgt aus diesem Umstande, daß ich solches nach keinem eigenen Systeme, welches immer sehr unvollkommen ausgefallen seyn würde, ordnen konnte, sondern hiezu eines der schon bekannten Systeme wählen mußte, wodurch ich zugleich der unvermeidlichen Schöpfung neuer

Bez

Benennungen , welche das Studium der Naturgeschichte so sehr erschweren , auswich.

Bei diesem ersten Theile , welcher das Verzeichniß der Konchylien enthält , habe ich nach einer sorgfältigen Prüfung der meisten Konchylien Werke das Linneische System gewählt , weil es , was man auch immer dagegen einwenden mag , unter den bisher bekannten , das vollständigste ist , die unterscheidenden Kennzeichen der Geschlechter , Abtheilungen und Arten — so viel es sich in einem künstlichen Systeme , welches sich bloß auf die Gehäuse der Schalthiere gründet , thun läßt — an richtigsten und bündigsten angiebt , und diesen

## An den Leser.

seinen Vorzug in so lang behaupten wird; bis uns nicht die Abdansone, Bastere, und Otto Müllere der künftigen Zeiten, mit dem Scharfsinn dem Beobachtungsgeist und der Genauigkeit eines Swammerdams, Bradley, Poupart, und Reaumur ausgerüstet, die vollständige Beschreibung der Gestalt, Theile und Lebensart eines jeden Schalthieres liefern werden, um alsdenn ein natürliches, oder der Natur sich mehr näherndes Ronchyliensystem zu erbauen.

So pünktlich ich nun in dieser Beschreibung der Ronchylien, der Linneischen Ordnung und Eintheilung nachgegangen bin, so habe ich dennoch meinem Führer nicht so knechtlich folgen

gen

gen wollen, daß ich mir nicht hätte erlauben sollen, die meisten Bestimmungen seiner Geschlechter und Arten deutlicher zu erklären, und — wenn ich mich so was zu sagen erlauben darf — vielleicht zu verbessern. Auch wagte ich es die Benennungen der einzelnen Theile der Muscheln anständiger auszudrücken; dann berichtigte ich die von Linne angeführten Figuren, ließ die zweideutigen hinweg, und ergänzte dieselben aus den neuern Konchyliologen, ohne mich durch die deutsche Ausgabe des Linneischen Natursystems, und durch die Linneischen Register in dem Knorr'schen Konchylienwerke, und in dem vierten Bande des Schröter'schen

## An den Leser.

rischen Journals für die Liebhaber des Steinreichs und der Konchyliologie irre führen zu lassen.

Diejenigen Konchylien, welche in dem Binneischen Systeme nicht enthalten sind, beschrieb ich nach dieses berühmten Systematikers Methode, ordnete sie in jene Familien, wohin er sie vermuthlich selbst gesetzt haben würde, erklärte sie durch eine weitläuftigere Beschreibung ihrer Kennzeichen, und berief mich auf die Abbildungen, welche wir in der Beschreibung des k. k. Kabinetts sowohl von diesen als von allen jenen, die bisher in keinem Konchylienswerke

## An den Leser.

werke gemälet, oder etwan nicht gut gemälet sind, liefern werden.

Endlich habe ich die holländischen, französischen und englischen Trivialnamen aus den bessern Schriftstellern einer jeden Nation hinzugefügt, und die in diesem Verzeichnisse enthaltenen Geschlechter, Unterabtheilungen, Arten und Abarten mit einem nach alphabetischer Ordnung hinzugesetzten Buchstaben bezeichnet, um denjenigen, welche dieses Kabinet besuchen, die Auffindung der Stücke, die sie etwann vorzüglich zu sehen wünschen, zu erleichtern.

Nach diesem Plane werde ich in der Beschreibung der übrigen Theile dieser kais. Sammlung

lung

## An den Leser.


lung fortschreiten ; deren baldige Vollendung ich — ungeachtet meiner übrigen Beschäftigungen — um so gewisser versprechen darf, da mir diese Arbeit durch die freundschaftliche Mitwirkung des Hrn. Helbling von Hirzenfeld — eines Mannes der von einem seltenen Hange zur Naturgeschichte hingerissen, diese Wissenschaft, in welcher er sich die ausnehmendsten Kenntnisse erworben hat, sein einziges Geschäft seyn läßt, trefflich erleichtert wird.





# EXPLICATIO

## CITATIONVM ABBREVIATARVM.



### Erklärung der angeführten Verkürzungen.



*Adans. Seneg.* Histoire naturelle du Sénégal. Coquillages par M. Adanson, avec des figures. a Paris 1757. 4.

*Argenv. Conch. Zoom.* L'histoire naturelle éclaircie dans une des ses partie principales la Conchyliologie, augmentée de la Zoomorphosie; nouvelle edition, avec des figures en taille douce, par M. (Argenville) a Paris 1757. 4.

*Aldrov. Test.* Ulyssis Aldrovandi de exanguibus. Libri quatuor &c. cum figuris, Bononiae 1642. fol.

*Bast. Subf.* Jobi Basteri Opuscula subseciva, Tomus I. & II. cum Figuris, Harlemi 1762. 1765.

*Bell.*

# EXPLICATIO

*Bell. aq. Petr. Bellonii de aquatilibus, cum figuris*  
*Parif. 1553. fol.*

*Berlin. Mag. (Hrn. D. Martini) Abhandlung von*  
*Erdschnecken mit Kupfern im II. und III. Ban-*  
*de des berlinifchen Magazins. Berlin 1766. 8.*

— — (Ebendef.) *Abhandl. von Conchylien der füßen*  
*Wäffer, mit Kupfern im IV. Bande des Ber-*  
*linifchen Mag. 1767.*

*Bonan. Mus. Kirch. Museum Kircherianum a Philip-*  
*po Bonnano S. I. cum figuris, Romae 1709.*  
*fol.*

*Brown. Hift. Jam. The civil and natural history*  
*of Jamaica with figures, by Patrik Browne.*  
*London 1756. fol.*

*Chem. Naturf. Herrn Paf. Chemnitz Abhandlung*  
*von dem innern Wunderbau mancher Schne-*  
*cken, mit einer ausgemalten Kupfertafel im*  
*IX. Stücke des Naturforschers. Halle 1776. 8.*

*Column. purp. Fabii Columnae opusculum de Pur-*  
*pura cum figuris. Kiliae 1675. 4.*

*Da Cost. Elem. Elements of Conchology by Emanuel*  
*Mendes Da Costa with seven illuminated Pla-*  
*tes. London 1776. m. 8.*

*Dav.*

# CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Dav. Cat. syst.* Catalogue systématique , & raisonné de Curiosités de la nature , & de l'art , qui composent le cabinet de M. Davila. avec figures en taille douce. Tome I. a Paris 1776. 8.

*Ellis. Transact.* An Account of several rare species of Barnacles in a Letter from. John Ellis. with figures, in the philosophical Transactions. Vol. L. Part. II. for the Year 1758. Wittenberg. 1771. 4.

*Fav. Dictionnaire* d'histoire naturelle, qui concerne le testacées ou les coquillages de Mer , de terre , & d'eau-douce par M. l'Abbé Favart d'Herbigny. Tome I. — III. a Paris 1775. 8.

*Geof.* Traité sommaire des coquilles tant fluviatiles, que terrestres, qui se trouvent aux environs de Paris par M. Geoffroy. a Paris 1767. 12.

*Gev. Belust.* Monatliche Belustigungen im Reiche der Natur an Conchylien und Seegewächsen mit illuminirten Kupfern. Hamburg 1755. gr. 4. mit deutsch und französischen Text.

*Ginan. adr.* Opere postume del Conte Giuseppe Ginanni Ravennate con figure. Tomo II. in Venezia 1757. fol.

*Gualt.*

## EXPLICATIO

*Gualt. Test.* Index testarum conchyliorum , quae  
adservantur in Museo Nicolai Gualtieri cum  
tabulis aeneis. Florentiae 1742. fol.

*Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm.* Georg. Sebast.  
Helblings Beiträge zur Kenntniß neuer und  
seltener Conchylien mit Kupfertafeln , im IV.  
Bande der Abhandlungen einer Privatgesellschaft  
in Böhmen. 1778. gr. 8.

*Hill. Hist. of. Anim.* An History of Animals illustra-  
ted with figures. by John Hill. London 1752.  
fol.

*Klein Meth. Ostr.* Jac. Theod. Klein Tentamen  
methodi ostracacologicae cum figuris. Lugd.  
batav. 1753. 4.

*Knor. Del. Nat.* Deliciae naturae , von Georg  
Wolfg. Knorr , mit deutschen und französischen  
Text und ausgemalten Kupfertafeln. I. Theil.  
Nürnberg 1766. gr. fol.

*Knor. Vergn.* Vergnügen der Augen und des Ge-  
müthes in Vorstellung einer Sammlung von  
Schnecken und Muscheln , mit ausgemalten  
Kupfertafeln I. — VI. Theil. Nürnberg. 1757 —  
1772. 4.

CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Koelr. nov. com. petr.* Descriptio tubiporae maris albi indigenae, auctore J. T. Koelreuter cum tabulis aeneis in nouis commentariis academiae scientiarum petropolitanae. Tom. VII. Petropoli 1761. 4.

*Linn. S. N. Car.* a Linné Systema naturae, editio duodecima. Holmiae 1766. Tom. I. m. 8.

*Linn. It. vvestg.* Karl von Linne Reisen durch einige schwedische Provinzen II. Theil, welcher die Reise durch Westgothland enthält. mit Kupfern. Halle 1765. gr. 8.

*List. angl.* Martini Lister, Historiae animalium angliae tres tractatus, unus de araneis, alter de cochleis tum terrestribus tum fluuiatilibus, tertius de cochleis marinis. cum figuris. Londini 1678. 4.

*List. Hist. Conch.* Martini Lister, Historiae conchyliorum liber I — IV. Volumina duo cum tabulis aeneis, Londini 1685 — 1688. fol.

*Mart. berlin.* Beschaeft. Konchyliologische Rhapsodien von Friedr. Heinr. Wilh. Martini; im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, mit gemalten Kupfern. Berlin 1776. gr. 8.

Ebendesselben — Zwoschalige Konchylien überhaupt beschrieben; mit ausgemalten Kupfern im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1777. gr. 8.

\*\*\*

*Mart.*

## EXPLICATIO

*Mart. Konch. Kab.* Neues systematisches Konchylienkabinet von Friedr. Heintz. Wilh. Martini, I — IV. Band mit illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1769 — 1778. 4.

*Müll. Linn. Naturf.* Von Linne vollständiges Natursystem aus dem Lateinischen von Phil. Ludw. Stenius Müller mit Kupfern. VI. Th. 1. Band. Nürnberg 1775. gr. 8.

*Müll. Hist. Verm.* Vermium terrestrium & fluviatilium succincta historia auctore Othon. Friderico Müller. Volumen II. Havniae 1774. 4.

*Müll. Zool. dan.* Zoologiae danicae icones editae ab Othone Friderico Müller. Fasciculus I. Hafn. 1777. fol.

*Murr. Fund. Test.* Fundamenta testaceologiae auctore Adolpho Murray. Upsaliae 1771. 4.

*Mus. Caes. Vindobon.* Museum Caesareum Vindobonense jussu MARIAE THERESIAE Augustissimae edidit Ignatius Eq. a Born latine & germanice cum tabulis pictis. Beschreibung des kais. kön. Naturalienkabinetts auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserinn Königin herausgegeben von Ignaz Edlen von Born, mit ausgemalten Kupfertafeln, deutschen und lateinischen Text. Wien 1779. fol.

*Mus.*

# CITATIONVM ABBREVIATARVM.

*Mus. Olear.* Adami Oleari Museum gottorpiense.  
cum figuris. Schleßv. 1674. 4.

*Mus. Tessin.* Museum Tessinianum opera Comit-  
tis Car. Gust. Tessin. latine & suecice, cum  
tabulis aeneis Havniae. 1753. fol.

*Mus. Worm.* Museum Wormianum seu Historia  
rerum tam naturalium, quam artificialium &c.  
adornata ab Olao Worm, cum iconibus. Lugd.  
batav. 1655.

*Petiv. Gaz.* Jacobi Petiveri Opera ad historiam  
naturalem spectantia. containing Gazophyla-  
cium naturae & artis &c. with figures. Vo-  
lume I. London 1712 — 1767. fol.

*Petiv. amb.* Aquatiliū animalium amboinae &c.  
icones & nomina with their latin, englisch,  
and native names, and figures by James Pe-  
tiver, London 1713. fol.

*Planc. Conch.* Jani Planci de conchis minus notis.  
Venetiis 1739. 4.

*Reaum. Mem. de Paris.* De différentes manieres  
dont plusieurs especes d'animaux de mer s'attr-  
achent au sable, aux pierres & les uns aux au-  
tres par M. de Reaumur — Decouverte d'une

## EXPLICATIO

nouvelle teinture de Pourpre &c. avec figures, par le meme, dans l'histoire de l'academie royale de sciences de l'année 1711. a Amsterdam 1715. 12.

*Regenf. Samml.* Sammlung von Muscheln, Schnecken und andern Schalthieren auf Befehl Seiner Königl. Majestät von Dänemark 2c. mit deutschen und lateinischen Text, und illuminirten Kupfertafeln gezeichnet und gestochen, von Franz Michael Regensfuß. Kopenhagen 1758. Regalsolio. Ou Recueil de coquillages, de Limaçons, & de crustacés par ordre de Sa Majesté le Roi de Danemark gravés en taille douce, & illuminés de couleurs naturelles par Franc. Mich. Regensfuß, avec le text françois & allemand. Coppenhague 1758. fol. royal.

*Rondel. Test.* Guil. Rondelerii universae aquatiliū historiae pars altera, cum figuris, folio transverso. Lugd. 1555. fol.

*Rumph. amb.* Georg Ebeh. Rumph's amboinische Raritätenkammer von den steinschalichten Thieren, mit Kupfertafeln, aus dem Holländischen übersetzt von Ph. Ludw. Statins Müller, und mit Zusätzen vermehret von Joh. Hieron. Chemnitz. Wien 1766, fol.

*Schlott.*



*Schlott. Act. helv.* Obseruatio physica de cochleis quibusdam, nec non de turbinibus nonnullis &c. Philipp. Jac. Schlotterbeccii, cum figuris aeneis in actis helveticis physico medicis. Volum. V. Basil. 1762. 4.

*Schroet. Erd'.* Versuch einer systematischen Abhandlung über die Conchylien um Thangelstadt von Joh. Sam. Schröter m. K. Berlin 1771. 8.

*Seb. Thes.* Lucupletissimi rerum naturalium thesauri descriptio (idiomate latino & belgico) cum iconibus Albert. Seba. Tomus III. Amstelod. 1757. fol. Regal.

*Spengl. Berlin. Beschaeft.* Beschreibung einer besonders schönen Korallenmuschel mit einer ausgemalten Abbildung. im II. Bande der Beschäftigungen der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Berlin 1775. 8.

*Ebendesselben.* Beschreibung einer seltenen Dünnmuschel mit ausgemalten Figuren, im III. Bande derselben Beschäftigungen. Berlin 1776. 8.

*Swammerd. Bibl. nat. Jo.* Swammerdam Biblia naturae seu historia insectorum in classes redacta, idiomate latino & belgico, cum tabulis aeneis. Lugdun. bat. 1737 — 1738. fol.

EXPLIC. CITAT. ABBREVIATARVM.

*Valent. Abb.* Franz Valentyns Abhandlung von Schneckenmuscheln und Seegewächsen um Amboina aus dem Holländischen übersetzt von Phil. Ludw. Stätius Müller mit Kupfern. Wien 1773. fol.

*Walch. Naturf.* Beschreibung einiger Conchylien von Emanuel Walch, mit ausgemalten Figuren im achten Bande des Naturforschers. Halle 1776. 8.



# PARTEſ CONCHARVM

## NONNVLLAE EXPLICATAE.

---

### E r f l ä r u n g

einiger Benennungen der Theile an Muschel-  
ſchalen.



**C**ARDO, Pars ambitus, vbi  
valvae coherent.

**D**as Schloß iſt derjenige  
Theil des Umfanges, an wel-  
chem die Klappen aneinander  
paſſen.

**L**ATVS cardinis, ANTI-  
CVM ; huicque oppoſitum  
POSTICVM vocatur.

Die Seite am Schloſſe  
heißt die vordere ; die entge-  
gengengeſetzte die hintere Sei-  
te.

**L**IGAMENTVM, Hymen  
*Linn.* Membrana cartilaginea  
valvas connectens.

Das Band iſt die knorpe-  
lige Haut, welche die Klap-  
pen mit einander verbindet.

**A**REA ANTICA. *Vulva*  
*Linn.* Regio extra liga-  
mentum ; quae ſi introrſum  
declivis ſit SINVS audit.

Die Vorderfläche iſt die  
Gegend außer dem Bande  
und heißt, wenn ſie einwärts  
abhängig iſt eine Vertiefung.

**LABIA EXTERNA** *Labia Linn.* ea vocantur, quae extra ligamentum locata sunt.

Die äußeren Lefzen heißen diejenigen welche außer dem Bande stehen.

**LABIA INTERNA**, *Nymphae Linn.* sunt labella intra ligamentum, & cum eo devincta.

Die inneren Lefzen heißen diejenigen kleineren Lefzen, welche inner dem Bande stehen, und mit demselben verbunden sind.

**VMBONES**, *Protuberantiae ventricosae valvae cuiusvis extra cardinem.*

Die Backen sind die häufigen Erhöhungen einer jeden Klappe außer dem Schlosse.

**APEX**, *Nates Linn.* *Protuberantiae cuiusvis finis attenuatus.*

Die Spitze ist das Ende in welches sich jede verdünnte Nase verlängert.

**RIMA**, *Hiatus a ligamento tectus.*

Die Spalte ist die Oefnung, welche von dem Bande gedeckt wird.

**AREA POSTICA** aut **AREOLA**, *Anus Linn.*

Die Hinterfläche heißt die der Vorderfläche entgegengesetzte Seite.



# GENERA TESTACEORVM.

METHODO LINNEANA.

## Geschlechter der Schalthiere nach Linneischer Ordnung.

### MVLTIVALVIA.

### Vielflappige.

	Pag.		Seite.
A. Chiton.	1.	A. Die Käfermuschel.	1.
B. Lepas.	2.	B. Die Meereichel.	2.
C. Pholas.	7.	C. Die Steindattel.	7.

### BIVALVIA.

### Zweiflappige.

D. Mya.	10.	D. Die Klafmuschel.	10.
E. Solen.	13.	E. Die Messerscheide.	13.
F. Tellina.	17.	F. Die Tellmuschel.	17.
G. Cardium.	27.	G. Die Herzmuschel.	27.
H. Mastra.	39.	H. Die Korbmuschel.	39.
I. Donax.	40.	I. Die Stumpfmuschel.	40.
K. Venus.	43.	K. Die Venusmuschel.	43.
L. Spondylus.	63.	L. Die Klappmuschel.	63.
M. Chama.	65.	M. Die Gienmuschel.	65.
N. Arca.	72.	N. Die Arche.	72.

O. Ostrea.

	Pag.		Seite.
O. Ostrea.	80.	O. Die Muschel.	80.
P. Anomia.	101.	P. Die Bastardmuschel.	101.
Q. Mytilus.	106.	Q. Die Mießmuschel.	106.
R. Pinna.	115.	R. Die Steckmuschel.	115.

### VNIVALVIA.

		Einschalige.	
A. Argonauta.	119.	A. Der Segler.	119.
B. Nautilus.	121.	B. Die Kammer Schnecke.	121.
C. Conus.	123.	C. Die Zutenschnecke.	123.
D. Cypraea.	155.	D. Die Porzellanschnecke.	155.
E. Bulla.	183.	E. Die Blasenschnecke.	183.
F. Voluta.	195.	F. Die Faltenschnecke.	195.
G. Buccinum.	228.	G. Das Kinkhorn.	228.
H. Strombus.	264.	H. Die Flügelschnecke.	264.
I. Murex.	282.	I. Die Stachelschnecke.	282.
K. Trochus.	330.	K. Die Kräuselschnecke.	330.
L. Turbo.	345.	L. Die Mondschnecke.	345.
M. Cornu. *	371.	M. Die Hornschnecke *	341.
N. Helix.	372.	N. Die Schnirkelschnecke.	372.
O. Nerita.	410.	O. Die Schwimmschnecke.	410.
P. Haliotis.	427.	P. Die Ohrschnecke.	427.
Q. Patella.	430.	Q. Die Napf schnecke.	430.
R. Dentalium.	448.	R. Die Zahnschnecke.	448.
S. Serpula.	452.	S. Die Röhrenschnecke.	452.

TE-

\* Vide tab. huius indicis.

\* Sieh die Tafel dieses Verzeichnisses.

# TESTACEA.

## Schalthiere.

### Ordo primus. Erste Ordnung.

#### Multivalvia.

#### Vielflappige.

##### A. Chiton.

##### A. Die Käfermuschel,

*Linn. Syst. Nat. Gen. 300.*

Valvae plures longitudinaliter digestae, dorso incumbentes.

Die Schale bestehet aus mehreren, nach der Länge des Rückens hintereinander liegenden Klappen.

##### A. 1. Chiton squamosus.

##### A. 1. Die schuppige Käfermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 5.*

Testa octovalvi carinata; valvulis oblique angulatis, striatis, corio squamoso.

Die acht Klappen der Schale sind oben keilförmig, der Quere nach eckig, und gestreift, mit einer schuppigen Haut.

*Petiv. Gaz. t. I. f. 3. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

##### A. 2. Chiton cinereus.

##### A. 2. Die kleine Käfermuschel.

A

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 8.*

Testa oſtivalui obtuſe ca- Die etwas flache aſchengraue  
rinata, planiuſcula, cinerea. Schale hat einen ſtumpfen Rü-  
cken, und beſtehet aus acht  
Klappen.

*Inſidens oſtreae eduli L.*

Sie ſitzt auf einer gemeinen Muſchel.

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. II.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. Lepas.

B. Die Meereichel.

*Linn. Syſt. Nat. Gen. 301.*

Valvae plures inaequa- Die feſtſitzende Schale  
les, per paria oppoſita beſtehet aus mehrern un-  
affixae, gleichen, einander paar-  
weiſe entgegen geſetzten  
Klappen.

B. 1. Lepes Balanus.

B. 1. Die groſſe Meer-  
eichel.

*Linn. S. N. Sp. 10.*

*Belg. Zee puiſten. Gall. Gland de Mer Tulipe. Dav. Angl. The com-  
mon engliſch Barnacle. Ellis.*

Testa conica truncata, val- Die kegelförmige oben abge-  
uis longitudinaliter ſulcatis; ſtuzte Schale hat nach der Längs-  
areis interjectis transuerſe ſtria- ge gefurchte Klappen, und in  
tis. die Quere geſtreifte Zwischen-  
flächen.

Opera

DSI





Operculum valvulis quatuor,  
binis conniuentibus, unguicula-  
tis, altioribus; binis transuerse  
falcatis, minoribus.

Der Deckel besteht aus vier klei-  
nen Klappen, deren zwei, die un-  
ter einem Winkel zusammenstoßen,  
klauenförmig und höher; zwei aber  
in die Quere gefurchet, und klei-  
ner sind.

Inſidet Murici deſpecto.

Sie ſißt auf einer nordiſchen  
Spindel feſt.

*Liſt. Hiſt. Conch. l. 3. f. 286.*

*Ellis. Tranſact. angl. 1758. t. 34. f. 17.*

*Baſter. Subs. t. 12. f. 7 — 10.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

B. 2. *Lepas balanoides.* B. 2. Die Seepocke.

*Linn. S. N. Sp. 11.*

*Belg. Zee pocke. Gall. Glands de mer rayés. Dav. Angl. The nar-  
row mouth'd grey Balanus Hill.*

Testa conica truncata, va- Die kegelförmige abgeſtuzte  
luis glabris, operculis obtusis. Schale hat glatte Klappen,  
und ſtumpfe Deckeln.

*Liſt. angl. t. 5. f. 41.*

— *Hiſt. Conch. l. 3. f. 287.*

*Klein. Meth. Oſtrac. t. 12. f. 94. 95.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. D.*

*Hill. Hiſt. of. Anim. 11. Pl.*

*Da Coſt. Elem. Pl. 1. f. 12.*



B. 3. *Lepas Tintinabulum*.

B. 3. Die Meertulpe.

*Linn. S. N. Sp. 12.*

*Belg.* Tulpen; *Rumph. Angl.* The great wide mouth'd Balanus.  
*Hill. Gall.* Gland de mer *Turban. Dav.*

Testa conica, gibba, areis  
transuerse striatis.

Die kegelförmige ungleiche  
Schale hat in die Quere ge-  
streifte Zwischenflächen.

α coloris rosei.

α rosenfarbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β ex rosea violacea.

β rosenfarbig und violett.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 285.*

*Rumph. amb. t. 41. f. A.*

*Gualt. Test. t. 106. f. H.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. 34. Pl. 8. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 26. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 11.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 6. f.*

— — *V. 30. t. 1. f.*

B. 4. *Lepas Diadema*.

B. 4. Die Wallfischpoche.

*Linn. S. N. Sp. 13.*

*Belg.* Zeefcheiling. *Rumph. Angl.* The wrinkled. Star-Cake. *Petiv.*  
*Gall.* Pou de Baleine. *Dav.*

Testa



Testa subcylindrica, valvis Die etwas walzenförmige  
longitudinaliter sulcatis, costis Schale hat nach der Länge ge-  
decussatim, areis transverse furchte Klappen, mit kreuz-  
striatis, weise durchschnittenen Ribben,  
und in die Quere gestreiften  
Zwischenflächen.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 288.

Petiv. amb. t. 1. f. 11.

Rumph. amb. Rarit. K. t. 14. f. H.

Gualt. Test. t. 160. f. Q.

Mus. Caes. Vindobon.

B. 5. Lepas testudina-  
ria.

B. 5. Die Schildkrö-  
tenpode.

Linn. S. N. Sp. 14.

Belg. Schildpa de Luis. Rumph. Angl. The tortoise-wart Barnacle.  
Ellis. Ital. Ballano, Gin.

Testa suborbiculari plano-  
convexa laevi, intus lamellis  
ferrulatis; areis excavatis,  
transverse fulcatis.

Die scheibenrunde, unten fla-  
che, oben erhabene und platte  
Schale hat inwendig gezähnel-  
te Blättchen, und ausgehöhl-  
te nach der Quere gefurchte  
Zwischenflächen.

Operculum valvis sex, binis ho-  
rizontalibus, quatuor erectis, ob-  
tusis, conniuentibus, rima supera  
longitudinali.

Der Deckel besteht aus sechs  
kleinen Klappen, davon zwei wa-  
recht, vier stumpfe aber, auf-  
richtet gegen einander geneigt stehen,  
und in die Höhe eine nach der Län-  
ge laufende Spalte bilden.



*Bonan. Mus. Kirch. cl. I. f. 36.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 9.*

*Rumph. amb. 40. t. K.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 2. 3.*

*Gualt. Test. t. 106. f. M. N. O.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 12. f. 99.*

*Ellis. Trans. angl. 1758. t. 34. f. 12. 13.*

*Ginan. adr. II. t. 30. f. 175.*

*Knor. Vergn. III. 30. t. 3. 4. f.*

B. 6. *Lepas anatifera*,

B. 6. Die Aentenbrut.

*Linn. S. N. Sp. 18.*

*Holl. Eende Schulpe. Angl. The goose Schell. Hill. Gall. Conque anatifere Dav. Ital. Conca anatifera, Gin.*

Testa compressa quinqueval-  
ui laeui, affixa intestino mem-  
branaceo.

Die zusammengedrückte  
Schale bestehet aus fünf glat-  
ten Klappen, und sihet Mittels  
einer darmförmigen Haut fest.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 544.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 2.*

*Mus. Wormian. p. 256.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 282.*

*Planc. Conch. t. 5. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 106. f. A. D.*

*Seb. Tbes. III. t. 16. n. I. a, b.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. II.

Ginan, adr. II. t. 30. f. 182.

Knor. Vergn. II. 30. | t. 4. 5. f.

Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 10. t. 8. f.

Da Cost. Elem. I. Pl. f. II.

## C. Pholas.

## C. Die Steindattel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 302.

Testa binaluis, lata, Die Schale ist zweyflap-  
utrinq. diuarcata, accessio- pig, breit, an beiden En-  
riis prope cardinem; car- den klafend, mit einigen  
dinis margo replicatus, Nebenschalen am Schlosse.  
ligamento nexus interme- Das Schloß hat einen  
dio. außwärts übergeschlagenen  
Saum, und ein darzwi-  
schen liegendes Band.

### C. I. Pholas Dautilus.

### C. I. Der Steinbohrer.

Linn. S. N. Sp. 20.

Belg. Steen - Scheede. Angl. The oblong withe Pidak Hill. Gall.  
Dail. Ital. Ballano. Ginan.

Testa lata, ventricosa, pli- Die bäuchige Schale ist nach  
cis transuersis, striisque lon- ihrer gestreckten Breite gefal-  
A 4 gitu-



gitudinalibus decussata, post- ten, der Höhe nach kreuzweise ge-  
ce reticulata. streifet, hinterwärts netzförmig.

*Aldrov. Test. l. 3. p. 455. f. 3.*

*Rond. Test. t. 23. f. 2.*

*Bonon. Recr. cl. 2. f. 25. 26. 27.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 276.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 10, 11.*

*Gualt. Test. t. 105. f. A. B. C. D.*

*Seb. Thes. III. t. 16. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. II. Pl.*

*Ginan. adr. II. t. 31. f. 184.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 3.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**C. 2. Pholas costatus.**

**C. 2. Der geribbte  
Steinbohrer.**

*Linn. S. N. Sp. 21.*

*Belg. Everiger Gapper. Angl. The deeply furrowed Pholas. Hill.  
Gall. La grande Pholade de l'Amerique. Favart.*

Testa lata ventricosa trans-  
verse striata, costis longitudi-  
nalibus, extimis acutis remo-  
tioribus.

Die Schale ist in die Brei-  
te gestreckt, bänchig, in die  
Quere gestreifet, mit nach der  
Länge laufenden Ribben, deren  
äusserste scharf sind, und etwas  
von einander entfernt stehen.


*List.*



*List! Hist. Conch. l. 3. f. 277.*

*Gualt. Test. t. 105. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. 4. f.*



*C. Schütz.*



# Ordo secundus. Zweyte Ordnung.

Bivaluia.

Zwenklappige.

D. Mya.

D. Die Klamuschel.

*Linn. S. N. Gen. 303.*

Testa bivalvis, altera extremitate hians; cardinis dente primario crasso. Die zwenklappige Schale klappt an einem Ende; der Hauptzahn des Schlosses ist dick.

D. 1. Mya Glycimeris.

D. 1. Die bäuchige Klamuschel.

Testa umbonata, extremitatibus oblique truncatis, dense antice crassissimo, longitudine ligamenti, Die bäuchige Schale hat schiefe stumpfe Seitenende, und einen sehr dicken Vorderzahn nach der Länge des Bandes.

*Aldrov. Test. l. 9. p. 473. 474.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 258.*

*Gualt. Test. t. 9. f. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subovata umbonata laevis, pone apices utrinque coarctata, und glatte Schale ist an den Spitzen beiderseits ausgehölet. Die Seitenende sind schief und stumpf. Der Vorderzahn ist sehr dick, fast von der Länge des Bandes: der

in-





incurvatis, retro quos series crenularum extenditur. Color pallido griseus.

Hinterzahn ist kleiner, liegt unter den einwärts gekrümmten Spitzen, hinter welchen eine Reihe kleiner Kerbe ausläuft; ihre Farbe ist lichtgrau.

D. 2. *Mya pictorum*. D. 2. Die Mahlermuschel.

Linn. S. N. Sp. 28.

Gall. Moule des peintres. Angl. The Pearl River Muscle. Da Cost. Ital. Concha de Pictori. Ginan.

Testa lata, convexa, cardinis dente primario crenulato, laterali elongato, quovis in altera testa duplicato.

Die Schale ist breit, eiförmig, und bänchig, der Hauptzahn ist gekerbt, der Nebenzahn verlängert, und an einer Klappe doppelt.

Bonon. Recr. cl. 2. f. 40. 41.

List. angl. t. 2. f. 30.

— Hist. Conch. l. 2. f. 146. 147.

Swammerd. Bibl. nat. t. 10. f. 6, 7.

Gualt. Test. t. 7. f. E.

Berlin. Magaz. IV. 12. t. 66. 67. f.

Ginan. adriat. II. t. 4. f. 17.

Da Cost. Elem. 7. Pl. 12. f.

D. 3. *Mya margaritifera*. D. 3. Die Flußperlmuschel.

Linn,



*Linn. S. N. Sp. 29.*

*Gall. Telline fluviatile. Dav.*

Testa lata, ovata, planiuscula, infra coarctata, dente mig, etwas platt gedrückt, primario crasso, lateralibus am Unterrande eingebogen; der elongatis. Hauptzahn dick und die Neben- zähne verlängert.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 149.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 47.*

*Berlin. Magaz. IV. 12. r. 65. f.*

*Knor. Vergn. IV. 25. t. 2. f.*

D. 4. Mya Vulsella.

D. 4. Der Bartkneifer.

*Linn. S. N. Sp. 31.*

*Be'g. Baardnyper. Rumph.*

Testa elongata linguiformi, Die Schale ist der Höhe cardine terminali concavo ro- nach zungenförmig verlängert; undato, das Schloß bildet am Unter- ende eine rundliche Höhlung.

*Rumph. amb. n. 46. t. A.*

*Gualt. Test. t. 90. f. H.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. 3.*

*Knor. Verg. V. 2. t. 1. — 3. f.*



Habitu a congeneribus diversissima, utrisque linnæalis prior.

Dem Ansehen nach unterscheidet sich diese von allen ihren Nebenarten, sie gehöret auch mit mehr Recht unter das Geschlecht der Auster des Linne.

## E. Solen.

## E. Die Messerscheide.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 104.*

Testa bivalvis, aequalis, latissima, utrinque hians. Cardinis dens unus reflexus aut duplex, non insertus testae oppositae.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen, welche in die Breite sehr verlängert sind, und an beiden Enden klaffen. Der Zahn des Schloßes ist zurückgebogen, oft doppelt, und heißet nicht in die entgegen gesetzte Klappe ein.

## E. 1. Solen. Vaginā.

## E. 1. Die Rinne.

*Linn. S. N. Sp. 33.*

*Belg. Orgelpypen. Rumph. Angl. The thick Razor - Shell. Hill. Gall. Manche de Couteau. Day. Ital. Languetti.*

Testa



Testa lineari, recta; cardine prope extremitatem alteram truncatam unidentato.

Die Schale ist gleichbreit und gerad, nahe am abgerumpften Ende mit einem einzfachen Zahne versehen.

*List. Hist. Conch.* V. 3. f. 256.

*Rumph. Amb.* 45. f. M.

*Gualt. Test.* t. 95. f. D.

*Argenv. Conch.* Pl. 24. f. K.

*Hill. Hist. of. Anim.* Pl. 10.

*Klein. Meth. Ostrac.* t. 11. f. 65.

*Knor. Vergn.* I. 28. t. 3. f.

*Ginan. adriat.* II. t. 27. f. 170.

*Da Cost. Elem.* Pl. 7. f. 8.

E. 2. Solen Siliqua.

E. 2. Das Messerheft.

*Linn. S. N. Sp.* 34.

*Belg.* Messerhecht. *Angl.* The little Strait Razor. *Hill.* Gall. Manche decouteau lemelle. *Venet.* Cappa lunga. *Bonon.* Pefche cancella.

Testa lineari recta, extremitatibus rotundatis, cardine pone alteram bidentato.

Die Schale ist gleich breit, und gerad, die Ende sind rundlicht, an einem davon ist das Schloß mit zween Zähnen versehen.

*Bell.*



*Bell. aq. t. 414. f. 2.*

*List. angl. t. 5. f. 37.*

— *Hist. Conch. l. 2. 255. f.*

*Bonan. Regr. cl. 2. f. 57.*

*Planc. Conch. t. 3. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 95. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Müll. Linn. N. S. VI. 1. B 11. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

### E. 3. Solen Ensis.

### E. 3. Die Erbsenschote.

*Linn. S. N. Sp. 35.*

*Belg.* Beu Idoublet. *Angl.* The blucifch crooked Razor. *Hill. Gall.* Manche de couteau courbée. *Day.*

*Testa lineari subarcuata,* Die Schale ist gleichbreit,  
*extremitate utraque rotunda-* etwas gekrümmt, an beiden  
*ta, cardine pone alteram bi-* Enden rundlich, an deren ei-  
*dentato.* nem das Schloß mit zweern  
 Zähnen versehen ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 257. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. L.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Knor. Vergn. VI. 7, t. 1. f.*



E. 4. *Solen radiatus*.

E. 4. Die blaue Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp. 38.*

*Belg.* De violetblauwe. Zonnestraal. *Rumph. Gall.* Le soleil le vant.  
*Dav. Angl.* The violet - purple papyraceus *Solen.* *Hill.*

Testa lineari recta, subdiaphana, laevi, costa cardinis obliqua, depressa.

Die Schale ist gleich breit, gerad, halb durchsichtig und glatt. Die Rippe inner dem Angel lauft schief, und ist plattgedrückt.

*Violacea radiis quatuor albis.*

Violettfarbig mit vier weissen Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 266.*

*Rumph. amb. 45. t. E.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 91. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. P.*

*Knor. Delic. I. t. B. III. f. 9.*

— *Vergn. I. 6. t. 5. f.*

E. 5. *Solen strigilatus*.

E. 5. Die rosenrothe Strahlscheide.

*Linn. S. N. Sp. 39.*

*Belg.* Roose - roodt Zonnestraal. *Angl.* The thick red *Solen.* *Hill.*  
*Gall.* Lanterne rouge rayonnée de blanc.



Testa lineari recta, crassa, Die Schale ist gleichbreit,  
 convexa, lineis oblique in- gerad und dick, die Klappen  
 sculptis, costa cardinis nulla. gewölbt, mit schiefen ausge-  
 schnittenen Linien, ohne Aus-  
 gelippe.

Rosea, radiis duobus albis.

Rosenfarbig mit zween weißen  
 Strahlen.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 77.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 260.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 19. f. 2.*

*Knor. Vergn. VI. 5. t. 4. f.*

## F. Tellina.

## F. Die Tellmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 305.*

Testa bivalvis antice Die zweiflappige Schale  
 hinc inflexa; dentes late- le ist am Vorderrande um-  
 rales alterius testae plani. gebogen. Die Seitenzäh-  
 ne sind an einer Klappe  
 platt.

F. I. Quatae crassiusculae.

F. I. Mit epförmigen dicken  
 Schalen.

F. I. 1. Tellina lingua felis. F. I. 1. Die Katzenzunge.

*Linn. S. N. Sp. 45.*

B

Belg.



Belg. Katetonge Rumph. Gall. Le Chagrin Day.

Testa lata subouata, scabra Die Schale ist breit, eyrund,  
squamis fornicatis quincuncia- und mit hohlen ins Gevierte  
libus. stehenden Schüppchen besetzt.

Rumph. amb. t. 45. f. G.

Gualt. Test. t. 76. f. B.

Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 62.

Knor. Vergn. II. 2. t. 1. f.

F. I. 2. Tellina rugosa. F. I. 2. Die runzelichte  
Tellmuschel.

Testa subouata lata, ru- Die etwas eyförmige breite  
gis membranaceis transuersis, Schale hat häutige nach der  
rima hiantes. Quere laufende Runzeln, und  
eine klaffende Spalte.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata, subouata, scabra, Die Schale ist breit, etwas eyförmig, und durch querlaufende erhabene  
membranis eleuatis rugosis trans- dünne Runzeln raub. Die Spalte klaf-  
uersis. Rima hians. Labra promi- fet. Die Lippen ragen hervor. Die  
nula. Apices acuti contingui, an- Spitzen sind dünn, vorwärts gekrüm-  
trorsum recurui. Ligamentum in- met, und berühren einander. Die Lip-  
uestiens labra, alterumque retro pen werden von dem Bande bedec-  
apices tenuius. Color totius testae ket, ein anderes dünneres Band  
albus. läßt sich hinter den Spitzen wahr-  
nehmen. Die Farbe der ganzen  
Schale ist weiß.

F. I. 3. Tellina virgata. F. I. 3. Der gestreifte  
Sonnenstrahl.

Linn.





*Linn. S. N. Sp. 46.*

*Belg. Zonnenstraal. Rumph. Angl. Rayed Tellin. Petiv. Gall. Telline radiée Dav.*

Testa lata subouata, antice Die breite etwas eysförmige,  
angulata, lineis eleuatis trans- und vorne eckige Schale hat  
uersis, radiis rubentibus. erhabene Querlinien, und ro-  
the Strahlen.

*Rumph. amb. t. 45. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 19.*

*Argenv. Conch. Pl. 25. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 21. t. 4. f.*

— — — *IV. 25. t. 1. f.*

F. I. 4. Tellina angu-  
lata.

F. I. 4. Die eckige Tell-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 47. ?*

Testa lata subouata, striis Die breite etwas eynlange,  
transuersis recuruatis, antice vorne schiefeckige Schale hat  
oblique angulata, labris pro- erhabene zurückgekrümmte  
minulis, dentibus lateralibus Querstreife, hervorragende  
nullis. Rippen, und keine Seitenzäh-  
ne.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 241.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



F. I. 5. Tellina Gari.

F. I. 5. Die Bacassan-  
muschel.*Linn. S. N. Sp. 48.**Belg. Bacassendoublet Rumph. Gall. Tellina bariolée de violet , & de blanc. Argenv.**Testa lata subaequilatera, striis transuersis deflexis, latis prominentibus, dentibus lateralibus nullis.*

Die breite beinahe gleichseitige Schale hat zurückgebogene Querstreife, und keine Seitenzähne.

*Violacea , radiis pallidis.*

Violettblau mit blassen Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 261.**Rumph. amb. t. 45. f. D.**Argenv. Conch. Pl. 22. f. 7.**Mus. Caes. Vindobon.*

F. I. 6. Tellina anomala.

F. I. 6. Die unächte  
Tellmuschel.*Testa subouata lata, ventricosa, longitudinaliter rugosa, striis transuersis utrinque scabra, limbo antico intus violaceo.*

Die etwas ensförmige breite bäuchige Schale ist der Länge nach runzelicht, und durch Querstreife an den Seitenenden rauh, inwendig am Vorderande violet.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.*

— — — VI. II. t. 2. f.

Testa subovata lata ventricosa, antice utrinque obsolete carinata. Sulci longitudinales undulati, lris transversis prope extremitates exasperati. Apices umbonati incurvati. Ligamentum crassius ante apices, & retro hos tenuius alterum. Dentes primarii duo, alter bifidus, laterales nulli. Limbus internus praefertim anticus violaceus.

Die Schale ist etwas eysförmig, breitet und bückig, an beiden Seiten vorne mit einer stumpfen Ecke versehen. Nach der Länge herab laufen runzelichte Furchen, welche von Querstreifen durchkreuzet den Seitenenden ein raues Ansehen geben. Die Spitzen sind aufgeblasen und einwärts gekrümmet. Vor den Spitzen ist das gewöhnliche dicke Band, und hinter denselben noch ein anderes dünneres. Das Schloß hat zween Hauptzähne, deren einer zweispaltig ist. Die Seitenzähne fehlen. Der innere Rand ist besonders vorne violett.

*α pallide lutescens intus lutea.*

*α blaßgelb, inwendig gelb.*

*β alba apicibus violaceis, intus tota violacea.*

*β weiß, mit violeten Spitzen und gleichfarbiger Höhlung.*

*γ violacea, alboradiata intus violacea, albaque.*

*γ Violett mit weißen Strahlen, mit blau und weiß gefleckter innerer Höhlung.*

*δ alba, cavitate & apibus miniatis.*

*δ weiß mit menigfarbiger Höhlung und Spitzen.*

**F. II. Ovatae compressae.**

**F. II. Mit eyrunden platgedrückten Schalen.**

**F. II. 1. Tellina albida.**

**F. II. 1. Die blaßrothe Tellmuschel.**

*Linn. S. N. Sp. 50. ?*



Testa lata ovali laevi, sub- Die breite eiförmige Schale  
tus transverse inaequaliter sul- le ist glatt, unten mit unglei-  
cata, labiis prominentibus, den- chen Quersfurchen, die Lippen  
tibus lateralibus obsoletis. ragen hervor, die Seitenzäh-  
ne sind undeutlich.

Knor. Vergn. IV. 3. t. 4. f.

— — V. 9. t. 3. f.

F. II. 2. *Tellina punicea*.

F. II. 2. Die dunkelro-  
the Tellmuschel.

Testa lata ovali, sub aequi-  
latera, glabra, striis trans-  
versis approximatis.

Die breite eiförmige glän-  
zende Schale ist beinahe gleich-  
seitig, und mit gedrängt an-  
einander stehenden Querstreifen  
überzogen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis lata complanata, la-  
teribus utrinque subaequalibus. Api-  
ces enues breues. Labia testata.  
Dentes primarii, & laterales se-  
cundum characterem generis. Co-  
lor pallide incarnatus, prope api-  
ces & in superficie interna puni-  
ceus.

Die Schale ist breit, lein-  
förmig, und platgedrückt, an den Seiten  
beinahe gleichlang. Die Spitzen  
sind kurz und fein. Die Lippen  
bedeckt. Die Hauptzähne haben wie  
die Seitenzähne das gemeine Merk-  
mal dieses Geschlechtes. Die Far-  
be ist an der Oberfläche fleischroth,  
an den Spitzen und inwendig dun-  
kelroth.

F. II. 3. *Tellina pla-  
nata*.

F. II. 3. Die scharf-  
randige Tellmuschel.

Linn. S. N. Sp. 52.

Testa



Testa lata, ovata, compressa, transuersim substriata, marginibus acutis. Die breite eysförmige Schale ist platt gedrückt, der Quere nach sehr fein gestreift, an den Rändern scharf.

*Gualt. Test. t. 89. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. II. 4. Tellina radiata. F. II. 4. Der glatte Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 54.*

*Belg* Een roode witsdraalige Tellmossel. *Angl.* The tulip tellina. *Da Cost. Gall.* Telline rayée de couleur de chair. *Favart. Roman.* Capparozole. *Venet.* Capparole.

Testa lata substriata glabra, labris hiantibus, arcuola lanceolata. Die breite Schale ist feinst gestreift und glänzend, mit hervorstehenden Lippen und einer lanzettförmigen Hinterfläche.

Cavitas citrina. Apices rosei. Fasciae saepe radiantes roseae. Die Farbe der inneren Fläche ist schwefelgelb, die Spizen und öfters auch die Strahlen sind rosenroth.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 240.*

*Gualt. Test. t. 89. f. J.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 28. f. 8. t. 22. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 1. f.*

— — — IV. 2. t. 24. f.

— — — Del. nat. I. t. B. III. f. 3.

*Da Cost. Elem. Pl. 6. Fig. 11.*

B 4

F. II. 5.



F. II. 5. *Tellina ro-* F. II. 5. Das Schind-  
strata. chen.

*Linn. S. N. Sp. 55.*

*Belg* Banket Hammetjes. *Angl.* Wedge Muscle. *Petiv.* Gall. Pince de Chirurgien *Dav.*

*Testa* ovata antice angulato Die eiförmige Schale hat  
rostrata, transuersim subtilis- vorne einen verlängerten eckig-  
sime striata. gen Schnabel, und ist der  
Quere nach sehr fein gestreift.

α *Flava, rostro breuiore.*

α gelb, mit kürzerem Schnabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β *incarnata, rostro longiore.*

β fleischfarbig, mit längerem Schna-  
bel.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 225.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 88. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. O.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 5. f.*

F. II. 6. *Tellina inae-* F. II. 6. Die Bastard-  
quivaluis. telline.

*Linn. S. N. Sp. 56.*

*Belg.* Platzydige Telline.

Testa



Testa lata ouata rostrata, Die breite eynlange schnabel-  
 valua altera plana, dentibus förmige Schale hat eine ganz  
 lateralibus nullis. flache Klappe, und keine Sei-  
 tenzähne.

*Spengl. berlin. Beschaeft. III. 7. t. 25 — 28. f.*

F. II. 7. Tellina incar-  
 nata.

F. II. 7. Der kleine  
 Sonnenstrahl.

*Linn. S. N. Sp. 58.*

*Belg. Rood Juffertje.*

Testa lata ouata rostrata Die Schale ist breit eynlang  
 complanata, apicibus acutis, und schnabelförmig, mit fei-  
 pallido radiata. nen Spitzen und weißen Strah-  
 len.

*List. angl. app. t. I. f. 8.*

*Gualt. Test. r. 88. f. M.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. Suborbiculatae.

F. III. Mit rundlichen Schalen.

F. III. 1. Tellina Re-  
 mies.

F. III. 1. Die Sand-  
 telline.

*Linn. S. N. Sp. 62.*

*Belg. Remies. Rumph.*



Testa subrotunda , crassa, Die rundliche dicke Schale  
transuersim tenuissime striata, ist nach der Quere sehr fein  
rima patula. gestreift , und mit einer klaf-  
fenden Spalte versehen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 102.*

*Rumph. amb. t. 43. f. 7.*

*Mus Caes. Vindobon.*

F. III. 2. Tellina sco-  
binata.

F. III. 2. Die schuppige  
Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 64.*

*Gall. La guillochée. Dav.*

Testa orbiculari , scabra, Die scheibenrunde Schale  
squamis lunatis in quincun- ist wegen der mondfarbigen ins  
eem digestis. Gevierte stehenden Schüppchen  
rauh anzufühlen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 143.*

*Gualt. Test. t. 76. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 3. f.*

F. III. 3. Tellina car-  
naria.

F. III. 3. Die Fleisch-  
linse.

*Linn. S. N. Sp. 66.*





Testa orbiculata, striis obliquis, deorsum reflexis, undulatis.

Die scheibenförmige Schale hat eingeschnittene schiefe und rückwärts herabgebogene wellenförmige Streifen.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 176.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. III. 4. Tellina balthica.

F. III. 4. Die dreneckige Tellmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 68.*

Testa triangulo rotundata, laevi, transuersim subtilissime striata, incarnata.

Die Schale ist dreneckig, rundlicht, glänzend, in die Quere sehr fein gestreift, von fleischrother Farbe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. Cardium.

G. Die Herzmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 306.*

Testa bivaluis, aequalis, dentibus cardinis mediis binis, alternatis; lateralibus remotis insertis.

Die Schale bestehet aus zween gleichen Klappen; an dem Schlosse stehen zween wechselweise Mittelzähne, mit entfernten einbeißenden Seitenzähnen.

G. I.



G. 1. Cardium costatum. G. 1. Die geribbte Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 73.*

*Belg.* Geribte Venus doublet. *Rumph.* *Angl.* The exotic Heart Cockle. *Hill.* Gall. Conque exotique. *Dav.*

Testa lata ventricosa, costis longitudinalibus, carinatis, concavis. Die breite und bäuchige Schale ist nach der Länge herab mit kielförmigen hohlen Rippen besetzt.

*Column.* purp. t. 27.

*List.* Hist. Conch. l. 3. f. 164.

*Rumph.* amb. 48. t. 6. f.

*Gualt.* Test. t. 72. f. D.

*Argenv.* Conch. Pl. 23. f. A.

*Adans.* Seneg. Pl. 18. f. 2.

*Hill.* Hist. of. Anim. Pl. 10.

*Knor.* Vergn. I. 28. t. 2. f.

G. 2. Cardium Cardissa. G. 2. Das Menschenherz.

*Linn. S. N. Sp. 74.*

*Belg.* Venus hart. *Angl.* human Heart-Cockle. *Hill.* Gall. Coeur de Venus. *Dav.*

Testa cordata, valvis compressis carinatis, apicibus inflexis contiguis. Die herzförmige Schale hat flachgedrückte kielförmige Klappen, mit eingerollten nahe aneinander stehenden Spitzen.

α Ca-



$\alpha$  Carina valvularum integra.

$\alpha$  mit ganzem Riele.

$\beta$  Carina valvularum crenata.

$\beta$  mit gekerbtem Riele.

*Bonan. Recr. el. 2. f. 49.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 155. 156.*

*Rumph. amb. t. 42. f. E. —*

*Gualt. Test. t. 84. f. B. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. 1. 10. f. 39.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — VI. II. t. 1. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 3. Cardium retu-  
fum.

G. 3. Das Nabelherz.

*Linn. S. N. Sp. 75.*

Testa cordata oblique cari-  
nata, sinu politico lunari in-  
truso.

Die herzförmige und schief  
gekielte Schale hat hinter den  
Spitzen eine tief eingedrückte  
mondförmige Höhlung.

Valva solitaria.

Eine einzelne Klappe.

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 4. Cardium imbri-  
catum.

G. 4. Das schuppige  
Herz.

Testa



Testa cordato trilatera, inter sulcos longitudinales tenuis transuersa & dense squamulosa.

Die herzförmige dreiseitige Schale ist nach der Länge mit feinen Furchen, und dazwischen in die Quere mit dicht aneinander liegenden Schüppchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 152.*

*Gualt. Test. t. 83. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata trilateralis. Valvae utrinque angulatae longitudinaliter sulcatae, sulcis tenuibus, inter quos squamulae, undique arcuatae, & dense imbricatae locantur. Marg. crenatus, anticus serratus. Color testae niueus, squamularum citrinus.

Die Schale ist herzförmig und dreiseitig. Die Klappen sind an beiden Seiten eckig erhoben, nach der Länge herab laufen linienförmige Furchen, zwischen welchen sich allenthalben bogenförmig gedrängt aneinanderstehende Schüppchen befinden. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Schale ist von schneeweiß, die Schüppchen von zitronengelber Farbe.

G. 5. Cardium Hemiacardium.

G. 5. Das dreiseitige Herz.

*Linn. S. N. Sp. 76.*

*Holl. Driezydig Venus hart. Gall. Coeur triangulaire Dax. Angl. Strawberry Heart Cockle. Petiv.*

Testa cordata subtrilatera, valuis angulatis, sulcis tenuibus excavato punctatis, utrinque transuersa tuberculatis.

Die Klappen der herzförmigen beinahe dreiseitigen Schale sind eckig, mit tief punktierten dünnen Furchen, und in die Quere stehenden Körnern besetzt.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. H.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 83. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 2. f.*

G. 6. Cardium me-  
dium.

G. 6. Das Mittelherz.

*Linn. S. N. Sp. 77.*

Testa subcordata, valvis, Die Klappen der einiger-  
longitudinaliter sulcatis, an- maßen herzförmigen Schale  
gulatis, laevibus. sind nach der Länge gefurchet,  
eckig und glatt.

*Knor. Vergn. V. 20. t. 5. f.*

G. 7. Cardium aculea-  
tum.

G. 7. Das Nagelherz.

*Linn. S. N. Sp. 78.*

*Belg. gedornte Nageldoublet. Angl. Coeur de boeuf. epineux Dav.*  
*Angl. The Oxheart Cockle. Hill.*

Testa subcordata costis spi- Die einigermaßen herzför-  
noso ciliatis. mige Schale ist mit spizen  
Dörnern besetzt.

α Spinis fornicatis compressis.

α Mit hohlen zusammengebrückten  
Dörnern.

β Spinis fornicatis crassis inflexis.

β Mit hohlen dicken umgebogenen,  
oder nagelförmigen Dörnern.

*Aldrov.*



*Aldrov. Test. l. 3. p. 452.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 96. 97.*

*Gualt. Test. t. 72. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. B.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 1. f.*

G. 8. *Cardium tuber-  
culatum.*

G. 8. Das knotige  
Herz.

*Linn. S. N. Sp. 81.*

*Angl. Grain Cockle Petiv.*

Testa subcordata fulcata,  
costis obtusis transverse stria-  
tis, extus nodosis.

Die etwas herzförmige ge-  
furchte Schale hat stumpfe, in  
die Quere gestreifte, und au-  
ßen knotige Rippen.

*Rumph. amb. t. 48. f. 11.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 7.*

*Knor. Vergn. V. 30. t. 2. f.*

G. 9. [*Cardium Ico-  
fardia.*

G. 9. Das Ziegelherz.

*Linn. S. N. Sp. 82.*

*Belg. Nagelschulp. Rumph. Gall. Cœur. de boeuf tuilé. Argenv.  
Ang. The rough Oxheartshell. Hill.*

Testa



Testa subcordata sulcata,  
squamis fornicatis erectis.

Die einigermaßen herzför-  
mige Schale ist gefurchet, und  
mit aufgerichteten hohlen  
Schuppen besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 95.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 160.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. 10. Pl.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 56. f.*

G. 10. Cardium Une-  
do.

G. 10 Die rothe Erd-  
beere.

*Linn. S. N. Sp. 84.*

*Belg. Aardbesie. Rumph. Angl. The red Straw - Berry. Gall. La Fraise rouge. Argenv.*

Testa subcordata trilatera  
obtuse angulata, multifulca-  
ta, lunulis transuersis colora-  
tis sparlis.

Die etwas herzförmige und  
dreiseitige Schale hat an ih-  
ren Klappen stumpfe Ecken,  
viele Furchen, und zerstreute  
gefärbte Querschüppchen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 375.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 151.*



*Rumph. amb. t. 44. f. F.*

*Gualt. Test. t. 83. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 25. f.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 3. f.*

— — VI. 3. t. 4. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 8. f.*

G. 11. *Cardium magnum.*

G. 11. Die große Herzmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 86. ?*

Testa subcordata ventricosa sulcata, costis angulatis posticis transuersis, striatis.

Die etwas herzförmige, bäuchige und gefurchte Schale hat eckige Ribben, deren hintere mit nach der Quere laufenden Streifen besetzt sind.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 158.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. 12. *Cardium leucostomum.*

G. 12. Das gelbmündige Herz.

Testa subouata sulcata, costis anticis muricatis, posticis transuersim crenatis, areola lanceolata,

Die etwas ensförmige gefurchte Schale ist an den Vorderribben rauh, an den Hinterribben nach der Quere gekerbt, ihre Hinterfläche ist ensförmig.

*List.*





List. Hist. Conch. l. 3. f. 168.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subouata crassa, sulcis 33. longitudinalibus. Costae compressae angulatae, posticae muricatae, anticae squamulis dense imbricatae; sulci intermedii transuersum striati. Margo crenatus, antice serratus. Areola plana lanceolata, qua ab adfinibus differt. Limbus aurantii coloris.

Die Schale ist dick, einigermassen herzförmig, mit 33 nach der Länge laufenden Furchen besetzt. Die Rippen sind etwas flach gedrückt und eckig; die hinten stehenden sind rauh, die vordern mit ziegelförmigen Schüppchen dicht besetzt. Die Zwischenfurchen sind in die Quere gestreift. Der Rand ist gekerbt, vorne sägeförmig. Die Hinterfläche ist platt und lanzettförmig, wodurch sie sich besonders unterscheidet. Der innere Rand ist pomeranzensfarbig.

G. 13. Cardium flauum.

G. 13. Das gelbe Herz.

Linn. S. N. Sp. 87.

Testa subouata, longitudinaliter obsolete sulcata, margine crenato.

Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge schwach gefurchet, und am Rande gekerbt.

Mus. Caes. Vindobon.

G. 14. Cardium laevigatum.

G. 14. Das glatte Herz.

Linn. S. N. Sp. 88.



Testa subouata glabra, Die etwas eysförmige Scha-  
striis longitudinalibus, obso- le ist glatt, und mit matten  
letis, Streifen nach der Länge besetzt.

*Gualt. Test. t. 82. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 4. f.*

— — — *V. 10. t. 7. f.*

G. 15. Cardium aeoli-  
cum.

G. 15. Die Ost- und  
Westmuschel.

*Belg. Oost en West-Doulet.*

Testa subouata sulcis tenui- Die etwas eysförmige Scha-  
bus longitudinalibus, plicis- le ist mit dünnen Furchen nach  
que transuersis obtusis postice. der Länge, und rückwärts mit  
stumpfen Quersalten besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 91.*

*Knor. Vergn. V. 26. t. 2. f. 27. t. 3. f.*

Testa subouata umbonata glabra, Die Schale ist einigermaßen ey-  
longitudinaliter sulcata, postice pli- förmig, bäuchig und glatt, nach  
cis transuersis, complanatis, fur- der Länge gefurchet, und hinten  
sum imbricatis. Margo anticus cir- mit platt gedrückten aufwärts  
ca ligamentum laevis. Labia retro ziegelförmig gestellten Falten verse-  
apices crassa prominentia. Color hen. Der Borderrand ist neben  
albo roseoque varius. dem Bande glatt. Hinter den Spiz-  
zen ragen dicke Lippen hervor. Die  
Farbe ist weiß mit Rosenroth ver-  
menget.

G. 16.



G. 16. *Cardium latum*. G. 16. Die breite Herzmuschel.

Belg. Blaafagtig Hart. Gall. Coeur enflé.

Testa lata ovali, longitudinaliter sulcato striata, utrinque scabra, margine antico serrato, Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge gefurchet und gestreifet, an beiden Enden rauh, und am Vorderrande sägeförmig.

Knor. Vergn. VI. 7. t. 6. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa lata ovalis, longitudinaliter sulcato striata. Costae anticae posticaeque acutae, muricatae, mediae obtusae laeves, interstitiis duplicato striatis. Umbones tenuissime striati, antrorsum subcarinati; Apices incurvi laeves. Cardo, dentibus generis characterem exhibens; Limbus striatus. Margo anticus acute ferratus. Die breite eysförmige Schale ist nach der Länge mit Furchen und Streifen besetzt. Die vordern und hintern Ribben sind scharf und rauh, die mittleren stumpf und glatt, mit zweifach gestreiften Zwischenräumen. Die Wölbungen sind sehr zart gestreifet und vorwärts einigermassen keilförmig. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt und glatt. Das Schloß hat an den Zähnen das dem Geschlechte eigenthümliche Kennzeichen. Der innere Rand ist gestreift. Der Vorderrand hat scharfe sägeförmige Ausschnitte.

α alba, luteo maculata.

α weiß und gelb gefleckt.


β alba, rubro maculata.

β weiß mit rothen Flecken.

G. 17. *Cardium pectinatum*. G. 17. Die kammbähnliche Herzmuschel.

C 3

Testa



*Testa rotundata complanata,* Die rundliche etwas flach  
*costis triangularis, lateribus mu-* gedrückte Muschel hat dreieckig-  
*ricatis.* ge Rippen, und rauhe Seiten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa suborbiculata profunde sul-*  
*cata Costae triangulae transuersim cre-*  
*natae; extimae squamulis fornicatis*  
*scabrae. Margo crenatus, anticus ser-*  
*vatus Superficies externa albida,*  
*maculis dispersis fuscis. Cavitas*  
*longitudinaliter sulcata, alba.*

Die Schale ist einigermassen schei-  
 benrund, tiefgefurchet. Die Rippen  
 sind dreieckig in die Quere gekerz-  
 bet, die äußern davon sind durch  
 hohle Schüppchen rauh. Der Rand  
 ist gekerbet, vorne sägeförmig. Die  
 äußere Fläche ist weiß mit zerstreuten  
 braunen Flecken. Die innere  
 Höhlung aber ganz weiß und nach  
 der Länge gefurchet.

G. 18. *Cardium rusticum.*

G. 18. Das Hahnen-  
 herz.

*Linn. s. N. Sp. 91.*

*Belg. Bonte Kokhaan. Gall. Le Coq bigarré.*

*Testa subcordata, umbona-*  
*ta, antiquata, sulcis remotis*  
*longitudinalibus, transuersim ru-*  
*gosis.*

Die etwas herzförmige häu-  
 tige Schale hat Ansätze, und  
 nach der Länge laufende von  
 einander entfernte Furchen, die  
 in die Quere runzelicht sind.

*α alba, fasciis ferrugineis.*

*α weiß, mit rothbraunen Bändern.*

*β niuea.*

*β schneeweiß.*

*Aldrov. Test. l. 3. p. 480.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 166.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. K.*

*Gualt. Test. t. 71. f. M.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 24. f. 12. t. 77. 78. f.*

*Knor. Vergn. VI. 8. t. 3. f.*

## H. Mastra.

## H. Die Korbmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 307.*

**Testa** bivaluis aequi- Die Schale hat zwei  
ualuis. Cardinis dente gleiche Klappen. Der ge-  
medio complicato, cum faltene Mittelzahn des  
adjecta foueola; dentibus Schlosses hat neben sich  
lateralibus remotis infer- ein Grübchen, und etwas  
tis. entfernte einbeißende Sei-  
tenzähne.

## H. 1. Mastra Spreng- leri.

## H. 1. Die sprengleri- sche Korbmuschel.

*Linn. L. N. Sp. 94.*

**Testa** cordato triangulari, Die herzförmige dreiseitige  
laevi, area complanata, utrin- glatte Schale hat eine flache  
que carinata. an beiden Seiten keilförmige  
Vorderfläche.



Gualt. Test. t. 85. f. F.

Knor. Vergn. VI. 34. t. I. f.

H. 2. *Mastra glauca*.

H. 2. Die fahle Korbmuschel.

Testa subouata umbonata,  
apicibus laeuissimis, lateribus  
undique striatis.

Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an den Spizen glatt,  
und an den Seiten allenthal-  
ben gestreift.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subouata tenuis, conuexa,  
apicibus glabris. Area, areolaeque  
indistincta, tenuiter striata. Val-  
uae solitariae dens primarius  
complicatus, laterales elongati.  
Color sordide albidus.

Die eysförmige Schale ist dünn,  
bäuchig, gegen die Spizen zu glatt.  
Die Vorder- und Hinterflächen sind  
undeutlich und gestreift. Der Haupt-  
zahn der einzelnen Klappe ist zusam-  
men gelegt, die Seitenzähne lang  
auslaufend. Die Farbe schmutzig  
weiß.

*Valua solitaria.*

Eine einzelne Klappe.

I. *Donax*.

I. Die Stumpfmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 308.*

Testa bivaluis, margi-  
ne antico obtusissimo. Den-  
tibus insertis, marginali po-  
stice solitario, subremoto.

Die zweyklappige Scha-  
le hat einen stumpfen  
Vorderrand. Die Zähne  
am Schlosse sind einbeiß-  
end, der hintere Seiten-  
zahn stehet einzeln, und  
entfernet.

I. I.



I. 1. Donax Scortum.

I. 1. Das Dreneck.

*Linn. S. N. Sp. 102.**Gall. Came coupée. Dav. Angl. The violet and white Chama Hill.*

Testa cordato triangulari; Die Schale ist herzförmig,  
 area explanata lacui, utrin- dreiseitig, die Vorderfläche  
 que carinata, striis transuer- ausgebreitet und glatt, und an  
 sis alternatim excurrentibus. beiden Seiten kielförmig. Die  
 Querstriehe verlängern sich  
 wechselweise.

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 220.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. L.**Petiv. Gaz. t. 19. f. 11.**Hill. Hist of. Animal. Pl. 9.**Müll. Linn. Natursyst. VI. 1. B. 11. t. 5. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

I. 2. Donax pubescens.

I. 2. Die stachelichte  
Stumpfmuschel.*Linn. S. N. Sp. 103.*

Testa cordato triangulari Die herzförmige dreiseitige  
 decussatim striata, area ex- Schale ist kreuzweise gestreift,  
 planata utrinque carinata, spi- die Vorderfläche platt, und  
 nisque canaliculatis armata. beiderseits kielförmig, mit rin-  
 nenförmigen Stacheln besetzt.



*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 3. Donax Trunculus.      I. 3. Das Stümpchen.

*Linn. S. N. Sp. 105.*

*Belg. Stombje. Gall. La Tronquée.*

Testa cuneiformi, antice      Die keilförmige Schale ist  
oblique truncata, laevi, lim-      vorne schief abgestumpft, und  
bo crenato.      glatt, am inneren Rande ge-  
kerbet.

*List. angl. t. 5. f. 35.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 47.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 217.*

*Gualt. Test. t. 88. f. 0.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 1.*

*Klein Meth. Ostr. t. 11. f. 61.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. 4. Donax denticulata.      I. 4. Die Säge.

*Linn. S. N. Sp. 107.*

*Belg. Zaagertjes. Gall. La Scie. Dav.*

Testa cuneiformi, striata,      Die keilförmige Schale ist  
antice obtusissima, transverse gestreifet,      vorne gerade abge-  
ru-





rugosa , limbo denticulato.

stumpft und nach der Quere  
runzelicht , am inneren Rande  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 219.*

*Petiv. Gaz. t. 18. f. 4.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 3, 4, 5. f.*

I. 5. *Donex cuneata.*

I. 5. Der Keil.

*Linn. S. N. Sp. 108.*

Testa cuneiformi compres-  
sa lacui, antice rugosa, mar-  
gine integerrimo.

Die keilförmige Muschel ist  
platt gedrückt und glatt, am  
Rande ganz.

*Knor. Vergn. V. 7. t. 3. f.*

K. *Venus.*

K. Die Venusmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 309.*

Testa bivalvis, aequi-  
valvis, sinu longirudina-  
li; areola vestigiata. Car-  
dinis dentes tres appo-  
ximati, laterales diuergen-  
tes,

Die Schale , welche  
aus zweien gleichen Klap-  
pen bestehet , hat vorne  
eine längliche Vertiefung,  
und eine eingedrückte Hin-  
terfläche. Am Schlosse  
stehen drey Zähne nahe  
beisammen , deren äussere  
auswärts laufen.

K I.



K. I. Testae subcordatae, antice muricatae.

K. I. Herzförmige vorne rauhe Schalen.

K. I. I. Venus Dione.

K. I. I. Die ächte Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 112.*

*Belg. De rechte Venus - Schulp mit Hair, Rumph. Angl. The Maiden Muscle Pet. Gall. Conque de Venus a pointes Dav.*

Testa subcordata, cingulis elevatis membranaceis, area utrinque spinosa. Die etwas herzförmige Schale hat erhabene blätterige Kei-  
fe und eine mit Stacheln be-  
setzte Vorderfläche.

*Bonan. Mus. Kirch. el. 2. f. 121.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 140.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 4.*

*Petiv. Gaz. t. 31. f. 9.*

*Olear. Mus. p. 29. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 76. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 4. t. 3, 4. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 9.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 16. 17.*

*Müll. Linn. Naturfyst. VI. I. B. 11. t. 6. f.*

K I. 2.



K. I. 2. Venus Paphia.

K. I. 2. Das alte Weib.

*Linn. S. N. Sp. 113.*

*Belg.* Gerimpelde, oude Wyfs - schulp. *Rumph.* *Angl.* The old Woman. *Hill. Gall.* La Vieille ridée, *Argenv.*

Testa subcordata, cingulis Die etwas herzförmige Scha-  
 crassis, antice attenuatis. le hat dicke Reife, die sich  
 vorne verdünnen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 75.**Rumph. amb. t. 48. f. 5.**Gualt. Test. t. 85. f. A.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.**Regenf. Samml. I. 7. t. 11. f.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Knor. Vergn. II. 28. t. 2. f.*

— — VI. 6. t. 2. f.

K. I. 3. Venus Marica.

K. I. 3. Die Bastard-  
 venus.*Linn. S. N. Sp. 114.**Belg.* De gestreepte Kousdoublet.

Testa rotundata, decussata, Die rundliche Schale ist  
 striis elevatis, antice lamel- mit erhabenen, vorne blätteri-  
 losis, areola carinata circum- gen Streifen durchkreuzt, die  
 scripta, Hinterfläche ist kielförmig er-  
 haben, und eingesägt.

*Mus.*



*Mus Caes. Vindobon.*

K. I. 4. Venus Dysera. K. I. 4. Die Dünnribbe.

*Linn. S. N. Sp. 114.*

*Gall. La Levantine Argenv.*

Testa subcordata, cingulis Die etwas herzförmige Scha-  
remotis membranaceis, lim- le hat dünne erhabene in die  
bo crenulato. Quere laufende Ribben, und  
am inneren Rande kleine Ker-  
ben.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 114. 115.*

*Petiv. Gaz. t. 24. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 10. f. 48, 49.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 3. f.*

K. II. Testae subcordatae, antice  
inermes.

K. II. Herzförmige vorne unbe-  
wafnete Schalen.

K. II. 1. Venus verru-  
cosa.

K. Die warzige Venus-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 116,*

*Gall. Cloniffe. Dav.*



Testa subcordata umbonata, cingulis arctis membrana-  
naceis verrucosis, limbo cre-  
nulato.

Die etwas herzförmige häu-  
chige Schale mit blätterigen  
warzenförmigen Ribben und  
gedrängt stehenden Keifen be-  
setzt, am inneren Rande mit  
feinen Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 122.*

*Gualt. Test. t. 75. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 2. Venus circi-  
nata.

K. II. 2. Die gereifte  
Venus.

Testa subcordata, mem-  
branis transuersis arctis, areo-  
la impressa ouata, limbo in-  
tegro.

Die fast herzförmige Scha-  
le ist mit häutigen Querringen  
umgeben, mit einer eysförmig-  
en eingedrückten Hinterfläche  
und ganzem Rande.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa figura V. Dionis subcorda-  
ta, umbonata transuersis eleuatis im-  
bricatis arctis. Sinus utrinque labia-  
tus, labiis subaequalibus. Areola  
cordata impressa. Limbus integer-  
rimus. Color pallide roseus, radiis  
obsoletis albis.

Die herzförmige häuchige Schale  
hat die Gestalt der achten Venus-  
muschel. Sie ist der Quere nach  
mit erhabenen ziegelförmiggestellten,  
hintereinander stehenden Ringen  
umgürtet. Die vordere Vertiefung  
ist beiderseits mit einem beinahe  
gleichgroßen Lefzen versehen. Die  
hintere Fläche ist eysförmig und ver-  
tieft. Der innere Rand ohne allen  
Einschnitt. Der Farbe nach ist  
sie blaßroth, mit matten weißen  
Strahlen.

K. II. 3.



K. II. 3. Venus cancellata.

K. II. 3. Die breitblättrige Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 118.

Testa subcordata complanata, cingulis erectis membranaceis remotis, antice elongatis, patentibus; limbo crenulato.

Die herzförmige plattgedrückte Schale ist mit erhabenen blättrigen Keifen umgeben, die sich vorne verlängern, und ausbreiten; der innere Rand ist fein gekerbt.

Gualt. Test. t. 88. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 4. Venus sinuata.

K. II. 4. Die ausgefehlte Venusmuschel.

Testa subcordata, transverse inaequaliter sulcata, sinu antico lato declivi, limbo crenulato.

Die fast herzförmige Schale hat ungleiche Quersfurchen, eine vertiefte Vorderfläche, und einen innwendig feingekerbten Rand.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 131.

Knor. Vergn. V. 14. t. 2. 5. f.

Testa subcordata complanata glabra, sulcis transuersis inaequalibus. Sinus anticus latus introrsum decliuis. Arcola plana. Limbus cre-

Die Schale ist einigermaßen herzförmig, plattgedrückt und glatt, der Quere nach mit ungleichen Furchen versehen. Die vordere

nula



nulatus. Color pallidus fusconebulosus, radiis obsoletis pallidis.

Vertiefung ist breit und einwärts abhängig. Die Hinterfläche ist eben. Der innere Rand fein gekerbt. Die Farbe braun nebelicht, mit matten bleichen Strahlen.

K. II. 5. Venus flexuosa.

K. II. 5. Die schiefe Venusmuschel.

Linn. S. N. Sp. 121.

Testa cordato triangula, transuersim sulcata, area sinuosa utrinque carinata, areola plana.

Die herzförmige dreneckige in die Quere gefurchte Schale hat eine ebene Hinterfläche, und eine vertiefte Vorderfläche, die beiderseits mit einer erhabenen Ecke begrenzt ist.

Rumph. amb. t. 43. f. O.

Mus. Caes. Vindobon.

K. II. 6. Venus Buccardium.

K. II. 6. Das unächste Ochsenherz.

Testa cordata solida laeui, areolae excauatae vestigio indistincto, limbo integro.

Die herzförmige dichte glatte Muschel ist an der Hinterfläche ausgehöhlet ohne deutlichen Eindruck, und am inneren Rande glatt.

D

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa cordata solida, laevis, transuersim tenuissime striata, undique umbonata; retro apices recurvatos contiguos concava, vestigio nec intruso, nec circumscripto. Dentes generi proprii, crassi.

Die dicke herzförmige glatte nach der Quere sehr fein gestreifte Schale ist allenthalben bündig; hinter den rückwärts gebogenen Spitzen, die einander berühren, ausgehöhlet, ohne deutlichen Eindruck oder Einsassung. Die Zähne sind dick und nach der Art des Geschlechtes beschaffen.

K. II. 7. Venus Chione.  
ne.

K. II. 7. Die Spiel-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 125.*

*Belg. De Speel doublet. Gall. Came marquée de verges.*

Testa cordata glabra, transuersim obsolete sulcata, pallide radiata, arcola plana.

Die herzförmige glatte nach der Quere schwach gefurchte Schale ist mit blassen Strahlen und einer kleinen platten Hinterfläche versehen.

*Gualt. Test. t. 86. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. C.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. I. f.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. I. f.*

K. II. 8. Venus maculata.

K. II. 8. Die Algamus-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 126.*

*Belg.*





*Belg.* D'achaat - gaaper. *Angl.* The Agate chama. *Hill.* Gall. Came truitée. *Dav.*

*Testa cordata glabra, maculis dispersis inaequalibus; ale hat zerstreute ungleiche Flecken, und eine keilsförmig eingefaßte Hinterfläche.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 106.*

*Gualt. Test. t. 76. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 17. f. 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 16. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 5. f.*

—— — V. 20. t. 4. f.

K. II. 9. Venus Meretrix.

K. II. 9. Die Brauns-lippe.

*Linn. S. N. Sp. 127.*

*Gall.* La Gourgandine. *Argenv.* *Angl.* The Smooth egg, truncated Chama *Hill.*

*Testa cordata laevi, antice complanata fusca, labris hiantibus.* Die herzförmige glatte Schale ist vorne plattgedrückt braun und mit weit hervorragenden Lippen versehen.



*Argenv. Conch. Pl. 21. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. VI. 6. t. 3. f.*

**K. II. 10. Venus mac-** **K. II. 10. Die Korbvenus.**  
**troides.**

*Belg. Gestraalde Kwaker. Gall. Quacre rayonné.*

*Testa triangula umbonata* Die dreyeckige bäuchige glat-  
*laeui, utrinque complanata;* te Schale ist beiderseits platt-  
*cardinis dente laterali remoto.* gedrückt, und am Schlosse  
mit einem entfernten Seiten-  
zähne versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 85.*

*Knor. Vergn. V. 15. t. 2. f.*

— — — *VI. 10. t. 5. f*

*Testa, similis Mastrae stultorum*  
*Z; triangula subaequilatera laevis,*  
*transuersim tenuissime striata, utrin-*  
*que prope apices complanata, pla-*  
*nis subaequalibus. Apices incurui.*  
*Dentes primores tres, structura con-*  
*generum, quibus accedit postice*  
*lateralis remotus. Color testae*  
*extus fulvus, radius albis; apicem*  
*violaceus.*

Die Schale, welche die Gestalt des  
Strahlkorbes hat, ist dreyeckig, beina-  
he gleichseitig und glatt, in die Quere  
fein gestreift, an den Seiten nächst den  
Spitzen mit zweien fast gleich groß-  
en platten Flächen versehen. Die  
Spitzen krümen sich einwärts. Drey  
Mittelzähne sind am Schlosse von  
gewöhnlicher Gestalt, ausser wel-  
chen hinten ein entfernter Seiten-  
zahn steht. Die Schale ist außen  
braunroth mit weißen Strahlen,  
an den Spitzen violett.

**K. II.**



K. II. 11. Venus paradoxa.

K. II. 11. Die blaustreifige Aftervenus.

Testa triangula, solida, utrinque complanata, labris prominentibus.

Die dreysseitige dichte beiderseits zusammengedrückte Schale ist mit hervorragenden Lippen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ponderosa, triangula, laevis, utrinque complanata. Labra porrecta crassa. Dentes cardinis primarii duo, lateralis utrinque unus brevis solidus. Color testae albus, lateribus radiisque latis violaceis.

Die Schale ist schwer, dreyeckig, und glatt, an beiden Seiten platt gedrückt. Die dicken Lippen ragen hervor. Am Schlosse sind zween Mittelzähne, und beiderseits ein dicker Nebenzahn. Die Schale ist weiß, mit breiten Strahlen, die Seitenflächen von violetter Farbe.

K. II. 12. Venus castrensis.

K. II. 12. Die Lagermuschel.

*Linn. S. N. Sp. 129.*

*Belg. De griekische A Doublet. Rumph. Angl. The zizzag Chama. Hill. Gall. L'écriture greque.*

Testa triangulo rotundata, umbonata glabra, characteribus angulatis picta, areola circumscripta plana.

Die rundliche, dreyeckige, bäuchige glatte Schale ist mit eckigen Zierathen bemalt, und mit einer platten eingefassten Hinterfläche versehen.



*Bonan. Recr. el. 3. f. 376.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.*

*Rumph. amb. t. 42. f. K.*

*Gualt. Test. 1. 82. f. H.*

*Regensf. Samml. I. 1. t. 3. f. 4. t. 41. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 4. f.*

— — II. 20. t. 2. f.

— — VI. 6. t. 5, 6. f.

K. II. 13. Venus Me-  
röe.

K. II. 13. Die weitlip-  
pige Venusmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 131.*

*Gall. Le Zig - zog. Dav.*

Testa lata subovata com-  
pressa, transversim striata; sinu  
antico dilatato hiant; limbo  
crenato.

Die breite etwas eiförmige  
flachgedrückte in die Quere ge-  
streifte Schale ist vorne mit ei-  
ner erweiterten klaffenden Ver-  
tiefung versehen, und inwendig  
am Rande mit Kerben besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 321.*

*Argenv. Supp. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. VI. 7. t. 2, 4. f.*

K. II. 14. Venus un-  
dulata,

K. II. 14. Die wellen-  
förmige Venus.

Testa



Testa ovali lata, striis transuersis undulatis, planis utrinque lanceolatis.

Die ensförmige breite Schale ist der Quere nach mit runzelichten Streifen, und beiderseits mit lanzetförmigen Flächen versehen.

*Petiv. Gaz. t. 105. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. 4. f.*

Testa ovalis complanata lata, glabra, striis transuersis undulatis, ad apices utrinque longitudinaliter complanata, planis laeuius lanceolatis. Dentes cardinis duo bifidi, tertius indiuisus. Color albus, venis angulatis fulvis, planorum venis transuersis undulatis, rubro purpureis.

Die Schale ist plattgedrückt, breit, glatt, mit wellenförmigen nach der Quere laufenden Streifen umgeben, nächst den Spizen beiderseits nach der Länge flach gedrückt, mit glatten lanzetförmigen Flächen. Am Schlosse sind zweien zweispaltige Zähne, der dritte äußere ist spizig und ungetheilt. Die Farbe ist weiß mit braungelben winkelförmigen Adern, über die Quere der Flächen laufen wellenförmige purpurrothe Adern.

K. II. 15. Venus Calipyga.

K. II. 15. Die weißbackige Venus.

Testa ouata latiuscula, transuerse inaequaliter striata, lineis picta angulatis, areola ovali.

Die ensförmige breite Schale ist der Quere nach mit ungleichen Streifen besetzt, mit winkelförmigen Linien bemalt, und an der Hinterfläche ensförmig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata latiuscula parumper complanata, striis transuersis inaequalibus, picta lineis angulatis, sursum conuergentibus, fuscis. Areola oualis, impressa, striata. Color lutescens; characteribus angulatis fuscis. Umbones nivi.

Die herzförmige etwas breite Schale ist einigermaßen flachgedrückt, und in die Quere ungleichförmig gestreift. Die winkelförmigen Linien, mit welchen sie bemalet ist, laufen aufwärts zusammen. Die Hinterfläche ist eysförmig, eingedrückt und gestreift. Die Schale gelblich, die Winkelzüge braun, und die Wölbung schneeweiß.

K. II. 16. Venus deflorata.

K. II. 16. Die Blauslippe.

Linn. S. N. Sp. 132. ?

Testa lata umbonata ouali, longitudinaliter rugosa, limbo antico intus violaceo.

Die breite bäuchige eysförmige Schale ist der Länge nach runzelig, und am innwendigen Vorderrande violett.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 17. Venus fimbriata.

K. II. 17. Die Wafelmuschel.

Linn. S. N. Sp. 133.

Belg. Wafelyser Rumph. Angl. Honeycomb Cockle. Pet. Gall. La Tricotée. Dav.

Testa lata, umbonata ouali, longitudinaliter striata, transuersa sulcata, margine crenato.

Die breite bäuchige eysförmige Schale ist nach der Länge gestreift, in die Quere gefurchet, und am Rande mit Kerben versehen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 3. f. 172.*

*Rumph. amb. t. 43. f. F.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 75. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 18. Venus reticulata.

K. II. 18. Die Gittervenus.

*Linn. S. N. Sp. 124.*

*Gall. Le Rézeau blanc. Dav.*

Testa subcordata umbonata longitudinaliter striata, cingulis eleuatis membranaceis, limbo crenulato.

Die fast herzförmige bäuchige Schale ist der Länge nach gestreift, mit erhabenen häufigen Keifen, und am inneren Rande mit Kerben versehen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 273.*

*Gualt. Test. t. 77. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 10. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 10. t. 1. f.*

K. III. Orbiculatae antice inermes. k. III. Scheibensförmige, vorne unbewafnete Venusmuscheln.



K. III. 1. Venus tige-  
rina.

K. III. Die Tiegerzunge.

*Linn. S. N. Sp. 136. 141.*

*Belg. De wilde Tyger - tong, Rumph. Angl. Checker-grained  
cockle, Petiv.*

Testa orbiculata decussatim  
striata, areola impressa, corda-  
ta.

Die scheibenförmige Schale  
ist kreuzweise gestreift, und  
mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*Nucæ, imbo præsertim postico  
roseo.*

Weiß, und am inneren Rande  
besonders hinten rosenfärbig.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 69. .*

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 174.*

*Rumph. amb. t. 43. f. H.*

*Petiv. amboin. t. 18. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 2. t. 1. f.*

— — — VI. 37. t. 2. f.

K. III. 2. Venus con-  
centrica.

K. III. 2. Die Gürtel-  
venus.

*Angl. The girdled Heart Cockle. Petiv.*

Testa orbiculata laevi, striis  
transuersis concentricis, areo-  
la impressa cordata.

Die scheibenförmige glatte  
Schale ist mit gleichabstehen-  
den Zirkelfurchen besetzt, und  
mit einer eingedrückten herz-  
förmigen Hinterfläche versehen.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 3. f. 99. 102. 104.*

*Petiv. Gaz. t. 16. f. 1. t. 93. f. 15. 18.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbicularis solida, laevis, sulcis transuersis circularibus concentricis. Apices breues recurui. Areola cordiformis impressa. Limbus integerrimus. Color totius testae niueus.

Die scheibenförmige dicke glatte Schale, hat concentrische Quersurken. Die Spitzen sind kurz und rückwärts gebogen. Die Hintersfläche ist herzförmig und vertieft. Der Rand glatt. Die Farbe der ganzen Schale schneeweiß.

K. III. 3. Venus prostrata.

K. III. 3. Die Zirkelscheibe.

*Linn. S. N. Sp. 137.*

Testa orbiculata transuersa striata, antice membranaceo scabra, areola ovata impressa.

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist vorne durch erhabene Häute rauh, an der Hintersfläche ensförmig eingedrückt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 4. Venus riularis.

K. III. 4. Die aderige Venus.

Testa orbiculata, transuersa striata, umbonibus complanatis rugosis, areola plana,

Die scheibenförmige in die Quere gestreifte Schale ist auf den flachgedrückten Wölbungen durch erhabene Adern runzelicht, und mit einer platten Hintersfläche versehen.

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata gibba, transuerse striata; Umbones complanati, rugis bifariam diuergentibus obsiti. Areola plana laevis. Color pallide luteus, areolae fuscus.

Die Schale ist scheibenrund, höckerig, in die Quere gestreift. Die Wölbungen platt gedrückt, und mit Runzeln besetzt, welche nach zweien Seiten auseinander laufen. Die Hinterfläche ist eben und glatt; Die Farbe bleich gelb, die Hinterfläche braun.

K. III. 5. Venus pensylvanica.

K. III. 5. Der Abrikos-  
sen Stein.

*Linn. S. N. Sp. 138.*

*Gall. La Jamaïque. Argenv.*

Testa rotundata, umbonata, membranis eleuatis transuersis, antice sulco utrinque longitudinali arcuato, areola impressa cordata.

Die runde bäuchige Schale ist in die Quere mit erhabenen Blättern umgeben, vorne beiderseits der Länge nach mit einer bogenförmigen Furche bezeichnet, an der Hinterfläche herzförmig eingedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 138.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f N.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. III. 6. Venus incrustata.

K. III. 6. Die punktirte  
Lagervenus.

*Linn. S. N. Sp. 139. ?*

*Belg.*



Belg. Het türkische Leger. Rumph. Angl. The türkische Campe.  
Gall. Le campement turque.

Testa rotundata glabra, striis Die rundliche glänzende  
conuergentibus excauato punc- Schale hat zusammenlaufende  
tatis, areola circumscripta tiefpunktirte Streifen, und  
laui. eine eingefasste glatte Hinter-  
fläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 146.

Regenf. Samml. I. 1. t. 4. f.

K. III. 7. Venus exo- K. III. 7. Die Strahl-  
lera. scheibe.

Linn. S. N. Sp. 142.

Belg. Slet.

Testa lentiformi, transuer- Die linsenförmige in die Quer-  
sim striata, albida, obsolete re gestreifte weißlichte Schale  
radiata, areola cordata. hat schwache Strahlen und ei-  
ne herzförmige Hinterfläche.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 98.

Gualt. Test. t. 75. f. F. G.

Adans. Seneg. Pl. 16. f. 4.

Mus. Caes. Vindobon.

K. III. 8. Venus pecti- K. III. 8. Die Kamme-  
nata. venus.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 144.*

*Belg.* Scherfje. *Rumph.* *Angl.* Crofs Cockle *Petiv.* *Gall.* L'Amande *Dav.*

*Testa rotundata, solida, Die rundliche dicke Schale*  
*longitudinaliter anticeque ob-* *le ist der Länge nach, und vor-*  
*lique costata, costis decussa-* *ne in die Quere geribbet, über*  
*tis, limbo crenato.* *die Ribben gestreifet, und am*  
*inneren Rande gekerbet.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 148. 149.*

*Rumph. amb. t. 42. f. D.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 72. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. P.*

*Knor. Vergn. VI. 3. t. 3. f.*

*K. IV. Latæ, antice subangulatae, K. IV. Breite, vorne etwas eckig*  
*inermes.* *ge, und unbewafnete Venusmuscheln.*

*K. IV. 1. Venus litte-*  
*rata.*

*K. IV. 1. Die dicke*  
*Schildmuschel.*

*Linn. S. N. Sp. 147.*

*Belg.* De langaagtige Letter-Schulp. *Rumph.* *Angl.* The arabian  
*Shell, Hill. Gall.* L'écriture arabique. *Argenv.*

*Testa lata ouata, antice an-* *Die breite, eiförmige, vorne*  
*gulata, striis transuersis undu-* *eckige Schale hat wellenförmige*  
*latis.* *ge Querstreifen.*

*Picta.*



Picta saepe lineis angulatis.

Defters mit linienförmigen Win-  
felzügen bemalt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 67.*

*Rumph. amb. t. 43. f. B.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 2.*

*Valent. Abb. 13. t. 6. f. 14. t. 10 — 13. f.*

*Gualt. Test. t. 86. f. E. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 21. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 39. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 4. f.*

— — II. 28. t. 4. f.

## L. Spondylus.

## L. Die Klappmuschel.

*Linn. S. N. Gen. 310.*

Testa inaequalis, car- Die Schale besteht aus  
dinis dentibus duobus cras- ungleichen Klappen, am  
sis, cum scrobiculo inter- Schloße sind zweien dichte  
medio. Zähne, zwischen eine Gru-  
be.

L. I. Spondylus Gae-  
deropus,

L. I. Die gezackte Klapp-  
muschel.

*Linn.*



Linn. S. N. 151.

Belg. Getackte Lazarus-Klappen. Angl. The great prickly Oyster  
Hill. Gall. Nuitre epineuse.

Testa subaurita spinosa, apic-  
um altero longiore setto.

Die stachelichte Schale ist  
einigermassen mit Ohren, und  
einer längeren abgesetzten Spitze  
versehen.

$\alpha$  valvis foliaceo spinosis.

$\alpha$  mit blätterichten und dornigen  
Klappen.

$\beta$  valvis spinosis, spinis elongatis,  
obtusis.

$\beta$  mit dornigen Klappen, deren Dör-  
ner lang und stumpf sind.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 20. 21.

Rumph. amb. t. 47. f. E.

Petiv. amb. t. 20. f. 6.

Gualt. Test. t. 100. 101. f. A, B. t. 99. f. F. G.

Argenv. Conch. Pl. 21. f. B. G. I. M.

Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 37.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Seb. Test. III. t. 88. f. 1—11. t. 89. f. 4—8.

Knor. Vergn. V. 9. t. 1. f. 13. t. 1. f.

— VI. 9. t. 1. f.

— Delic. nat. I. t. B. IV. 1. f.



L. 2. Spondylus plicatus.

L. 2. Die Faltenklappe.

Linn. S. N. Sp. 153.

Testa subspinosa, transuerse plicata.

Die Schale ist einigermaßen dornig, und in die Quere gefalten.

α crocea,

α safranfarbig.

Gualt. Test. t. 99. f. E.

Knor. Vergn. III. 6. t. 1. f.

— — VI, 12. t. 3. f.

β lutea.

β gelb.

Knor. Vergn. I. 6, t. 3. f.

M. Chama.

M. Die Siemmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 311.

Testa bialuis absque labris. Cardinis dens callosus, gibbus, insertus fossulae obliquae.

Eine zweiflappige Schale ohne Lippen. Das Schloß hat einen höckerigen schwielenförmigen Zahn, der sich in ein entgegengesetztes Grübchen versenket.

E

M. I.



M. 1. Chama cor.

M. 1. Die Narren-  
kappe.*Linn. S. N. Sp. 154.**Belg. Zotskap. Gall. Coeur de Boeuf. Day. Ital. Bucardia. Ginan.*

Testa cordata subglobosa, Die herzförmige, einigermas-  
 laeui, apicibus recurvatis, sen fuglichte glatte Schale, hat  
 rima lanceolata hiant. schnirkelförmig zurückgerollte  
 Spitzen, und eine lanzetförmige  
 klappende Vorderspalte.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 88.**List. Hist. Conch. l. 3. f. III.**Rumph. amb. t. 48. f. 10.**Gualt. Test. t. 71. f. E.**Seb. Thes. III. t. 86. f. 1.**Ginan. adr. II. t. 19. f. 129.**Knor. Vergn. VI. 8. t. 1. f.*

M. 2. Chama Gigas. M. 2. Das Waschbecken.

*Linn. S. N. Sp. 155.**Belg. Fonteinbak. Angl. The wife of the Nail - Scalop. Gall.  
 La Fautiere, Argenv.*

Testa





Testa lata, plicata, fornicato squamosa; limbo polito hiant, crenato.

Die breite gefaltene Schale ist mit hohlen Schuppen besetzt, und an der stumpfen Hinterfläche mit einer gekerbten Oefnung versehen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 83. 84.*

*Rumph. amb. t. 42. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 92. f. A, G. t. 93. f. B.*

*Argenw. Conch. Pl. 23. f. E.*

*Klein Meth. Ostr. t. 1. f. 53.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 48. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. III. 1. f.*

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 4. f.*

*Murray. Fund. Test. t. 2. f. 19. 20.*

M. 3. Chama Hippopus.

M. 3. Der Pferdefuß.

*Linn. S. N. Sp. 156.*

*Belg. Paardenoetje. Rumph. Angl. The Horse hoofs. Gall. Feuille de Chou. Argenw.*



Testa plicata, squamis spinosis muricata, margine postico obtusissimo, clauso, dentato. Die gefaltene Schale ist mit dornigen Schüppchen besetzt, die stumpfe Hinterfläche ist geschlossen und am Rande gezähnt.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 81. 82.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 187. 188.*

*Rumph. amb. t. 42. f. C.*

*Petiv. amb. t. 18. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 93. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 1, 2. f.*

—— — VI. 9. t. 3. f.

*Da Cost. Elem. 7. Pl. 10. f.*

M. 4. *Chama antiquata.* M. 4. Die Seenuß.

*Linn. S. N. Sp. 157.*

Testa subcordata, sulcis longitudinalibus, striisque transuersis. Die fast herzförmige Schale ist nach der Länge gefurchet, und in die Quere gestreift.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 98.*

*Gualt. Test. t. 71. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 16. f. 2.*

*Knor. Vergn. II. 20. t. 3. f.*

M. 5.



M. 5. Chama calycu-  
lata.

M. 5. Die Eichelmu-  
schel.

*Linn. S. N. Sp. 160.*

*Gal. Coeur allongé. Dav.*

Testa lata gibba, subtus  
coarctata, sulcis longitudina-  
libus crenulatis.

Die breite höckerige Scha-  
le ist unten eingebogen, und  
nach der Länge mit gekerbten  
Furchen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 184. 185.*

*Gualt. Test. t. 90. f. F.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

M. 6. Chama phreni-  
tica.

M. 6. Die nierenför-  
mige Gienmuschel.

Testa reniformi, sulcis lon-  
gitudinalibus striisque trans-  
uersis, margine postico ser-  
rato, excurrente.

Die nierenförmige nach der  
Länge gefurchte, und in die  
Quere gestreifte Schale hat  
einen rückwärts hervorragenden  
sägeförmigen Hinterrand.

*Valent. Abb. 16. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. II. 23. t. 7. f.*

Testa reniformis, antice lata, ro-  
undata, postice angustata, supra  
arcuata, infra coarctata; sulci lon-

Die Schale ist nierenförmig, vor-  
ne breit und rundlich, hinten schmal,  
oben bogenförmig erhoben, unten



itudinales, transversim striis decussati. Areae, areolaeque vestigium nullum. Apices subterminales recurui. Margo anticus complanatus, inferior introrsum excavatus, retrorsum in formam lobi excurrent, limbo crenato. Dentes duo crassi, posticus brevis, anticus elongatus curvatus. Ligamentum validum crassum, exviridi flavoque resplendens. Color rufus, postice prope apices] albus. Cavitas alba, limbo externo fusco.

eingedrückt. Die nach der Länge laufenden Furchen sind mit Querstreichen durchgezogen. Weder am Vorder- noch am Hinterrande zeigt sich eine merkliche Fläche. Die Spitzen sind rückwärts gekrümmt, und stehen nahe an dem einen Ende. Der Vorderrand ist flach gedrückt, der untere einwärts ausgehöhlet, und verläuft sich rückwärts in einen lappenförmigen Fortsatz. Der innere Rand ist gekerbet. Am Schlosse sind zween starke Zähne, davon der vordere kürzer, der hintere verlängert und gekrümmt ist. Das dicke starke Band hat im Bruche einen grüngelben Glanz. Die Schale ist außen braunroth, hinter den Spitzen weiß. Die Höhlung weiß, am äußeren Rande braun.

M. 7. Chama Lazarus.

M. 7. Die Muskatensblüthe.

Linn. S. N. Sp. 164.

Belg. Foelie Bladeren. Gall. Gateau feuilleté.

Testa lamellis patentibus, laceris, apice altero oblique subspirali.

Die Schale ist mit ausgebreiteten krausen Blättern besetzt, mit einer schiefen und fast schnirkelförmigen Spitze.

Rumph. amb. t. 48. f. 3.

Seb. Thes. III. t. 89. f. 5, 6, 9, 11.

Knor. Vergn. I. 8. t. I. f.

Mus. Caes. Vindobon.

M. 7.



M. 8. Chama gryphoides.  
des.

M. 8. Die Felsengien-  
muschel

*Linn. S. N. Sp. 165,*

*Belg.* The ockergeele Oester. *Gall.* Huître écailleuse a feuilles de couleur de citron. *Argenv.*

Testa orbiculari muricata, Die scheibenrunde rauhe  
valva altera planiore, altera Schale hat eine flache, und  
productiore subspirali. eine beinahe schnirkelförmig ver-  
längerte Schale.

*Bonap. Recr. cl. 2. f. 22.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 47. 53.*

*Gualt. Test. t. 101. f. C — I.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.*

*Regenf. Samml. l. 4. t. 44. f.*

*Knor. Vergn. l. 21. t. 2. f.*

—— — VI. 16. t. 1. f.

M. 9. Chama Arcinella.  
nella.

M. 9. Der dornige  
Pferdhuf.

*Linn. S. N. Sp. 167.*

*Belg.* Rotz doublet,



Testa spinosa, sulcis longitudinalibus, excavato punctatis; areola postica papillosa, intrusa. Die stachelige Schale ist nach der Länge mit höhlspunktirten Furchen besetzt, und hinten mit einer warzigen eingedrückten Fläche versehen.

Knor. Vergn. IV. 14. t. 1. f.

— — VI. 36. t. 1, 2. f.

## N. Arca.

## Die Arche.

Linn. Syst. Nat. Gen. 312.

Testa bivalvis, cardine articulo, dentibus numerosis, alternatim infertis. Die zweiflappige Schale hat an dem Schlosse eine Reihe vieler wechselweise ineinander passender Zähne.

N. I. Margine integro; apicibus recurvis. N. I. Mit ganzen Rande und zurückgekrümmten Spitzen.

N. I. 1. Arca tortuosa. N. I. 1. Die gedrehte Arche.

Linn. S. N. Sp. 168.

[ Belg. Gedraaide Oester. Rumph. Angl. Twisted Lighter. Petiv. Gall. La Bistournée. Dav.

Testa inaequivalvi, oblique parallelipeda, striata, valvula sinistra carinata, apicibus recurvis, margine integro. Die Schale hat die Gestalt eines gedrehten Parallelepipedums. Die Klappen sind gestreift, davon die linke eine fischförmige Schneide hat. Die Spitzen sind rückwärts gerollt, der Rand ganz.



*Rumph. amb. t. 47. f. K.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 95. f. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 3. f.*

N. II. Margine integro, apicibus N. II. Mit ganzem Rande, und  
inflexis. einwärts gekrümmten Spizen.

N. II. I. Arca Noae. N. II. I. Die Arche  
Noah.

*Linn. S. N. Sp. 169.*

*Belg. De rechte Noachs - Ark. Rumph. Angl. Noahs - Lighter Petiv.  
Gall. L'Arche de Noe. Dav.*

Testa transuersa, nauculari, Die Schale ist gestreckt, hat  
rhombea, striata, antice com- eine schiefartige rautenförmige  
pressa, retusa, apicibus in- Gestalt, ist gestreift, vorne zu-  
curuatis remotissimis, margi- sammengedrückt und stumpf.  
ne integro, subtus hiantes. Die Spizen sind einwärts ge-  
rollet, von einander weit entfer-  
net; der Rand ganz und unten  
klappend.

*Aldrov. Test. l. 3. t. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 32.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 208. 209.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 10.*



*Rumph. amb. t. 44. f. P.*

*Gualt. Test. t. 87. f. H. H. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 23. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 73. f.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. V, 2. f.*

— *Vergn. I. 16. t. 1. 2. f.*

*Martin. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 5. f.*

N. II. 2. Arca barbata. N. II. 2. Die Bartar-  
che.

*Linn. S. N. Sp. 170.*

*Belg. Arcke Noachs Soort. Mus. Oud. Angl. The coated Muscle.*  
*Hill. Gall. Amande à cils. Dav. Ital. Cozze, Bonan.*

Testa transuerfa, striis bar- Die Schale ist gestreckt, an  
batis, apicibus incuruis ap- den Streifen langharig; die Spi-  
proximatis, margine integro, zen sind einwärts gerollt, und  
subtus hiantes. aneinander genähert, der Rand  
ganz, und unten klappend.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 79.*

*Gualt. Test. t. 91. f. F.*

*Mus. Tessin. t. 6. f. 1.*

*Argenv. Conch. Pl. 22. f. M.*

*Ginan. adr. II. t. 23. f. 160.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 9.*

*Knor.*





*Knor. Verg. II. 27. t. 7. f.*

*Murr. Fund. Testac. t. 2. f. 22.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 8. f.*

N. III. Margine crenato, apicibus recurvatis. N. III. Mit gekerbtem Rande, und eingerollten Spitzen.

N. III. I. Arca antiquata.

N. III. I. Die Bastart-  
arche.

*Linn. S. N. Sp. 174.*

*Belg. Maagt Bloem. Rumph. Angl. Virgin Ark. Petiv. Gall. Coeur en Arche de Noe. Favart.*

Testa oblique cordata, sulcato striata, area cardinis rhomboidali, antrorsum elongata.

Die Schale ist schiefherzförmig, mit gestreiften Furchen besetzt, die Angelfläche rautenförmig, vorne lang zugespitzt.

<sup>a</sup> Testa transversim striata, antrorsum angulata, compressa, area cardinis plana.

<sup>a</sup> Die Schale ist über die Quere gestreift, vorne eckig und zusammengedrückt. Die Angelfläche eben.

*Bonap. Recr. cl. 2. f. 73.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 70.*

*Gualt. Test. t. 87. f. B.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 3. 4. f.*



- β Testa costis decussatim striatis, β Die Ribben sind kreuzweise gestreift, der Vorderrand ist etwas antice subexcurrente, rotundata, verlängert und rundlicht, die area introrsum declivi. Schloßfläche gegen die Mitte abhängig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 44. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 17. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 87. f. A. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 18. f. 8.*

*Murray. Fund. Testac. t. 2. f. 15.*

*Mart. Berl. Beschaeft. III. 6. t. II. f.*

N. III. 2. Arca rhombea.

N. III. 2. Das Rauteuförbchen.

Testa cordata, multisulcata, costis mediis transuersim striatis, apicibus incuruatis remotis, area cardinis rhombea. Die herzförmige Schale hat viele Furchen, die Ribben sind in die Quere gestreift, die Spizen einwärts gerollt, und die Angelfläche rautenförmig.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 75.*

*Knor. Vergn. IV. 14. t. 2. f.*

Testa cordata, aequialuis, longitudinaliter sulcata, costis 26. intermediis transuersim striatis. Apices incuruato recurui, remoti. Area Die Schale ist herzförmig, gleich klappig, nach der Länge gefurchet, mit 26. Ribben, davon die mittleren in die Quere gestreift sind.



interjecta plana, vere rhombea, lineis incilis rhomborum concentricorum figuram exacte referentibus; ligamentum membranaceum aream obtegens, incisuras lineares explens. Sutura cardinis intus armata dentibus minutis, diagonalem aream majorem constituit.

Die Spitzen sind einwärts gerollt, etwas zurückgekrümmt, und von einander entfernt. Die dazwischen liegende Angelfläche ist genau rautenförmig, auf welcher gleichfalls rautenförmige in einander liegende Linien ausgeschnitten sind. Das häutige Band bedeckt die ganze Angelfläche und versenket sich in die ausgeschnittenen Rautenlinien. Die Naht des Engels bildet die größere Diagonallinie, und ist inwendig mit einer Reihe kleiner Zähne besetzt.

N. III. 3. Arca decussata.

N. III. 3. Die gefleckte Ruchenmuschel.

Linn. S. N. 177.

Gall. Furie flamboyante; Favart.

Testa orbiculari conuexa, glabra, sulcis longitudinalibus, striisque transversis obsoletis, fusco maculata, apicibus incurvis, limbo acute crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, glänzend, mit schwarzen Furchen der Länge nach, und feinen Streifen über die Quere besetzt; auf der Oberfläche braun gefleckt. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt. Der innere Rand hat scharfe Kerben.

Habitus A. pilosae, cujus forte varietas.

Sie hat die Gestalt der Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 82.

Bonan. Rœr. cl. 2. f. 60.

Knor.



*Knor. Vergn. VI. 14. t. 4. f.*

N. IV. Margine crenato, apicibus inflexis.

N. IV. Mit gekerbten Rande und einwärts gekrümmten Spitzen.

N. IV. 1. Arca Pectunculus.

N. IV. 1. Die gestrahlte Kuchenschel.

*Linn. S. N. Sp. 180.*

Belg. Geribde Poffer - doublet. oreilles. Dav. Angl. Spotted Ark.

Mus. Leers. Gall. Petoncle sans

Testa orbiculari, complanata, sulcata, radiata, transuersim rugosa, apicibus incuruis, area decliui lanceolata, limbo plicato.

Die Schale ist rund und etwas platt, mit strahligen Furchen und nach der Quere laufenden Rinzelsstreifen. Die Spitzen sind einwärts gekrümmt, die Angelfläche schmal, gegen die Mitte abhängig; der innere Rand gefalten.

*Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 129.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 73.*

*Knor. Vergn. V. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 3, 4. f.*

N. IV. 2. Arca pilosa.

N. IV. 2. Die Samtmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 182.*

Belg. See Noot. Angl. Cockle with heavy streaks. Petiv. Gall. Noix de Mer Argeny. Ital. Musculo hirsuto. Mus. Moscard,

Testa



Testa rotunda, umbonata, longitudinaliter tenuissime striata, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund, bauchig, der Länge nach sehr feinst gestreift, die Spizen einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

$\alpha$  holosericea, fusca.

$\alpha$  mit sammtartigen Ueberzug, von brauner Farbe.

$\beta$  glabra, fulva.

$\beta$  mit glatter gelbbrauner Schale.

*Bonap. Recr. cl. 2. f. 80.*

*Petiv. Gaz. t. 95. f. 7.; t. 74. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 73. f. A.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 4. f.*

*Mart. Berlin. Beschaeft. III. 6. t. 1. f.*

#### N. IV. 3. Arca scripta.

#### N. IV. 3. Die gezeichnete Kuchenmuschel.

Testa orbiculari convexa laevi, lineis angulatis fulvis picta, apicibus incuruis, limbo crenato.

Die Schale ist rund und gewölbt, von glatter, und mit gelbbraunen Winkelzügen bemahlter Oberfläche. Die Spizen sind einwärts gekrümmt, der innere Rand gekerbet.

*List. Hist. Conch. 1. 3. f. 80.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa conuexa laevis, striis longitudinalibus tenuissimis, ut in A. pilosa, cujus forte varietas est. Area declivis, angustata; Cardo rectus linearis. Dentes intus 20 in arcum digesti, extimi utrinque crassiores. Ambitus orbicularis. Limbus crenatus.

Die Schale ist gewölbt, und der Länge nach wie die Sammtmuschel, davon sie vielleicht eine Abänderung ist, sehr zart gestreift. Die Schloßfläche ist einwärts abhângig, und schmal. Die Schloßlinie gerade. Inner derselben stehen 20 Zähne in bogenförmiger Stellung. Der Umfang ist zirkelrund. Der innere Rand gekerbt.

## O. Ostrea.

## O. Die Muschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 313.

Testa bivalvis, subaurita; Cardo edentulus, fossula media excavata ovali, striis lateralibus transversis.

Die zweyflappige Schale ist einigermaßen gekrümmt. Das Schloß ist ohne Zahn, in der Mitte mit einem ausgehohlten schalenförmigen Grübchen, an den Seiten mit Querstreifen versehen.

O. I. Pectines auricularis aequalibus.

O. I. Rammuscheln mit gleichseitigen Ohren.

O. I. I. Ostrea maxima.

O. I. I. Die Pilgrimsmuschel.

Linn. S. N. Sp. 185.

Belg.



*Belg.* St. Jacobs Schulp. *Rumph.* *Angl.* St. James Shell. *Gall.*  
*Conque de St. Jacques bariolée.* *Argenv.* *Ital.* Capa santa.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichseitige Schale  
 roduntatis , longitudinaliter hat rundliche nach der Länge  
 striatis, gestreifte Schalen.

*List. angl. t. 5. f. 29.*

— *Hist. Conch. l. 3. f. 163.*

*Gualt. Test. t. 98. f. A. B.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 1, 2. f.*

—— — II. 14. t. 1. f

O. I. 2. Ostrea Jaco- O. I. 2. Die Jakobs-  
 baea. muschel.

*Linn. S. N. Sp. 186.*

*Belg.* Spaanische St. Jacobs doublet. *Gall.* Coquille de St. Jacques  
 d' Espagne.

Testa inaequivalui , radiis Die ungleichklappige Scha-  
 rectangulis , longitudinaliter le hat geradwinklichte, nach  
 sulcatis. der Länge gefurchte Strahlen.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 3, 4.*

*Gualt. Test. t. 99. f. B.*

*Ginan. adr. II. 1. 16. f. 123.*

F

*Regenf.*



*Regenf. Samml. I. 7. t. 3. f.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. I. f.*

O. I. 3. Ostrea Ziczac.

O. I. 3. Die Neptunsdose.

*Linn. S. N. Sp. 187.*

*Belg. Joppe doublet.*

Testa inaequali, radiis (18) complanatis, plicis le hat (18) plattgedrückte Strahlen, mit gedoppelten Falten am inneren Rand.

*Regenf. Samml. I. II. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 19. t. 3. f. 20. t. I. f.*

O. I. 4. Ostrea Pleuronectes.

O. I. 4. Die Kompassmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 190.*

*Belg. Kompass-Schulp. Angl. The thin Scallop. Hill. Gall. L'Eucenail. Dav.*

Testa aequali orbiculata laevi, radiis internis (24) geminatis. Die gleichklappige scheibensrunde glatte Schale, hat innerwendig (24) gepaarte Strahlen.

Color operculi rufus, fornicis albus. Der Deckel ist braunroth; die gewölbte Klappe weiß.

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 45. f. A. B.*

*Petiv. Gaz. t. 49. f. 13.*

—— *amboin. t. 17. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 73. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. G.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 9. f. 30.*

*Hill. Hist of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 3. 4. f.*

O. I. 5. Ostrea Radula. O. I. 5. Die Jägertasche.

*Linn. S. N. Sp. 191.*

*Belg. Jaegers Weytasch. Angl. Common Amboina Scallop. Petiv. Gall. Gibeciere en Manteau.*

Testa subaequali ovali, Die einigermaßen gleichklappe  
radiis (12) conuexis decus- pige eysförmige Schale hat  
sacina striatis, auriculis aequa- (12) erhabene kreuzweis ge-  
libus, streifte Strahlen, und gleiche  
große Ohren.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 44. f. A.*

*Petiv. amboin. t. 17. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 9. t. 4. f.*



O. I. 6. Ostrea Plica.

O. I. 6. Der gewölkt  
Mantel.*Linn. S. N. Sp. 192.**Angl. The little yellow Scallop. Hill.*

Testa aequivalui glabra, Die gleichklappige glatt  
radiis (6) conuexis glabris, Schale hat (6) erhabene kreuz-  
decussatim striatis. weis gestreifte Strahlen.

*Rumph. amb. t. 44. f. O.**Argenv. Conch. Pl. 24. f. C.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.**Knor. Vergn. V. 10. t. 5. 6. f.*O. II. Pectines auriculis inaequa-  
libus, altera excisa, scabra.O. II. Rammuschel mit unglei-  
chen Ohren, deren eines ausge-  
schnitten und rauh ist.

O. II. 1. Ostrea Pallium.

O. II. 1. Der Königs-  
mantel.*Linn. S. N. Sp. 193.**Belg. Königs-Mantel. Angl. The Ducal Mantle Scallop. Gall.  
Manteau ducal.*

Testa aequivalui rotundata,  
radiis 12. obtusis striata, squa-  
misque imbricata.

Die gleichklappige rundliche  
Schale hat 12. stumpfe, ge-  
streifte, und mit ziegelförmig-  
gen Schuppen bedeckte Strah-  
len.

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 44. f. B. C.*

*Gualt. Test. t. 71. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. 7*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 59. f.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 2. f.*

—— — II. 21. t. 1, 2. f.

—— — V. 27. t. 2. f.

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 1. f.*

O. II. 2. *Ostrea nodosa.* O. II. 2. Die Korallen-  
muschel.

*Linn. S. N. Sp. 194.*

*Belg, Koraal - doublet. Rumph. Gall. La Coralline. Dav. Angl.*  
*The Coral Scallop. Hill.*

*Testa aequivalui, radiis* Die Strahlen der gleichklap-  
*convexis, sulcatis, nodoso* pigen Schale sind erhaben, ge-  
*articulatis.* streifet, und mit knotigen Bu-  
cheln unterbrochen.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 24.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 48. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 91. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 24. f. F.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 10.

Knor. Vergn. IV. 13. t. 5. f.

Spengl. berlin. Beschaeft. II. 13. t. 12. f.

O. II. 3. Ostrea elongata.

O. II. 3. Der lange Mantel.

Testa ovato elongata, longitudinaliter striata, radiis (8) transuersim rugosis, auricula altera minima.

Die eysförmige verlängerte und der Länge nach gestreifte Schale hat (8) in die Quere gerunzelte Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata, elongata, planiuscula subpellucida; striae eleuatae longitudinales; costae 8. transuersim rugosae. Margo repandus plicatus. Auriculae inaequales supra muricatae, altera minima. Color pallide incarnatus.

Die Schale ist eysförmig, verlängert, flach und halb durchsichtig. Nach der Länge laufen erhabene Streifen. Die acht Rippen sind runzelicht. Der Rand ist ausgeschwemmt und gefalten. Die ungleichen Ohren, deren eines sehr klein ist, sind oben raub. Von blasser fleischrother Farbe.

O. II. 4. Ostrea sulcata.

O. II. 4. Der gefurchte Mantel.

Testa aequiualui rotundata, longitudinaliter striata, radiis

Die gleichklappige rundliche Schale ist nach der Länge ges



(12), auriculis subaequalibus. streifet, mit (12.) strahligen Niben und einigermaßen ungleichen Ohren versehen.

α albo fuscoque maculata,

α Weiß und braun gefleckt,

β tota flava.

β ganz gelb.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subpellucida rotundata, connexa, aequivalvis, striis arcuatis longitudinalibus; Costis duodecim radiatis. Auriculæ fere aequales latæ.

Die Schale ist rundlich, bündig und halb durchsichtig; die Klappen von gleicher Größe, mit gedrängten nach der Länge laufenden Streifen besetzt. Die Ohren sind bet nahe gleich und breit.

O. II. 5. Ostrea cinnabarina.

O. II. 5. Der bandirte Mantel.

Belg. Gebänderde Mantel. Gall. Manteau bandé.

Testa aequivalvi, radiis numerosis inaequalibus, transversim rugulosis.

Die gleichklappige Schale ist mit sehr vielen ungleichen, und in die Quere gestreiften Strahlen versehen.

Gualt. Test. t. 73. f. C.

Regenf. Samml. I. 3. t. 36. f. 4. t. 38. f.

Knor. Vergn. V. 15. t. 1. f.



Testa rotundata, magna, conuexiuscula, aequivaluis, longitudinaliter multifulcata; Radii numerosi inaequales, striis transversis undulatis decussati; Auricula altera latior, antice excisa, margine ciliato. Color extus cinnabarinus, cingulis aliquot pallidis.

Die rundliche große, etwas bäuchige und gleichklappige Schale ist der Länge nach gefurchet. Die bäuchigen Strahlen sind ungleich, und mit wellenförmigen Querstreifen durchkreuzet. Ein Ohr ist breiter, vorne ausgeschnitten, und am Rande rauh. Die ganze Schale ist auswendig zinnoberroth mit blassen Querstreifen.

O. II. 6. Ostrea miniata.

O. II. 6. Der menningrothe Mantel.

Testa inaequivalui multistriata scabra, auriculis subaequalibus.

Die ungleichklappige Schale hat sehr viele raube Streifen, und beinahe gleiche Ohren.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, striis longitudinalibus numerosis muricatis. Valvae inaequales, altera plana, altera conuexa, excrecentiis transversis lameloso laceris. Auriculae subaequales, altera excisa margine ciliato. Color albus maculis confluentibus miniatis.

Die rundliche Schale ist der Länge nach mit rauhen Streifen versehen. Die Klappen sind ungleich, deren eine flach, die andere erhaben, und in die Quere mit krausen Blättern besetzt ist. Die Ohren sind beinahe gleich, eines ausgeschnitten, und am Rande rauh. Die Farbe ist weiß mit zusammenfließenden menningfarbigen Flecken.

O. II. 7. Ostrea varia.

O. II. 7. Der bunte Mantel.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 199.*

*Belg. Gellipelte Mantel. Gall. Manteau pointillé.*

Testa aequalivalui, radiis (30) fabris, auricula altera minima. Die gleichklappige Schale hat (30) rauhe Strahlen, und ein sehr kleines Ohr.

α cinnabarina, maculis albidis violaceisque. α zinnoberfarbig mit weißen und violeten Flecken.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 2. f.*

β atro violacea.

β schwarz violet.

γ alba nebulis violaceis.

γ weiß mit violeten Flecken.

δ lutescens, fuscoque varia.

δ gelblich, und braun gefleckt.

*Gualt. Test. t. 74. f. R.*

*Knor. Vergn. II. 18. t. 3. f.*

— — V. 11. t. 3. f.

O. II. 8. Ostrea glabra, O. II. 8. Der glatte Mantel.

*Linn. S. N. Sp. 201.*

Testa aequalivalui, radiis (10) laevis, planiusculis, striis internis eleuatis, duplicatis. Die gleichklappige Schale hat (10) glatte etwas flache Strahlen, und innwändig erhabene gedoppelte Streifen.

F 5

α flava



$\alpha$  flava.

$\alpha$  gelb.

$\beta$  nigra.

$\beta$  schwarz.

Gualt. Test. t. 73. f. H.

Regenf. Samml. I. 1. t. 10. f.; 8. t. 15. f.

Knor. Vergn. I. 8. t. 5. f.

O. III. 9. Ostrea maculata.

O. III. 9. Der gefleckte Mantel.

Testa aequivalui, longitudinaliter striata, radiis (10) conuexis.

Die gleichklappige Schale ist nach der Länge gestreift, und mit (10) erhabenen Strahlen versehen.

Regenf. Samml. I. 3. t. 30. 31. f.

Knor. Vergn. II. 18. t. 5. f.

Testa aequivaluis conuexa glabra, longitudinaliter striata; Costae (10) conuexae. Auriculae subaequales. Color supra ex albo fuscoque nebulosus.

Die gleichklappige bäuchige glatte Schale ist der Länge nach gestreift. Die (10) Strahlrippen sind erhaben. Die Ohren fast gleich. Die Farbe ist weiß, und braun wollicht.

O. II. 10. Ostrea coarctata.

O. II. 10. Das Schüsselfchen.

Testa conuexa glabra, radiis (6) conuexis, margine coarctato.

Die bäuchige glatte Schale hat (6) erhabene Strahlen und einen eingesakten Rand.





Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Knor. Vergn. II. 21. r. 5. f.

Testa convexa tenuis glabra, longitudinaliter obsolete striata. Radii (6) convexi crassi. Margo deorsum flexus undique coarctatus; Limbus crenulatus. Auriculæ inaequales; hinc distincta ab O. Plica.

Die bühliche dünne glatte Schale ist der Länge nach mit matten Streifen versehen. Die (6) Strahlen sind erhaben und dick. Der Rand ist mit einer Stulpe eingefast und innwändig gekerbt. Die Ohren sind ungleich, wodurch sich diese Art von dem gewölkten Mantel unterscheidet.

O. II. 11. Ostrea solaris.

O. II. 11. Der goldgelbe Mantel.

Testa rotundata glabra, radiis (20) convexis, sulcis longitudinaliter striatis.

Die rundliche glatte Schale hat (20) erhabene Strahlen, und nach der Länge gestreifte Zwischenfurchen.

Valua solitaria.

Eine einzelne Klappe.

Mus. Caes. Vindobon.

Valua complanata rotundata, radiis (20) convexis laevibus, sulcis interradiis obsolete striatis. Auriculæ subaequales? Color vividissimus aurantiacus.

Die Klappe ist rund und flach gedrückt, die (20) Strahlen sind erhaben und glatt. Die Zwischenfurchen matt gestreift. Die Ohren etwas ungleich. Die Farbe ist ein lebhaftes goldgelb.

O. II. 12. Ostrea opercularis.

O. II. 12. Die scharfrichtige Kammuschel.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 136. 202.

Belg. Oranje Mantel. Gall. Manteau d'Orange.

Testa rotundata, radiis (20) Die rundliche Schale hat  
carinatis, decussatim striato (20) kiefelförmige, und durch  
scabra, operculo conuexiore. Querstreife durchkreuzte Strah-  
len; und einen etwas bäuchig-  
en Deckel.

Knor. Vergn. II. 3. t. 2. 3. f.

Regenf. Samml. I. 2. t. 17. f.

O. II. 13. Ostrea Nu-  
cleus.

O. II. 13. Der Stein-  
fern.

Testa aequivalui, radiis (20) Die gleichklappige, beider-  
conuexis glabris, valua utra- seits bäuchige Schale hat (20)  
que conuexa. erhabene glatte Rippen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotunda aequivaluis costis  
elevatis (20), sulcis intermediis  
latis transverse sulcatis. Auriculae  
subaequales. Valua utraque umbo-  
nata, albo fuscoque nebulosa.

Die rundliche gleichklappige Schale hat (20) erhabene Strahlrippen, und breite nach der Quere gestreifte Zwischenfurchen. Die Ohren sind beinahe gleich. Beide Klappen bäuchig, von weiß und braun gemischter Farbe.

O. II. 14.

O. II. 14. *Ostrea gibba*.

O. II. Die gewölbte Dose.

*Linn. S. N. Sp. 203.**Belg. Adama Doublet.*

Testa aequivalui, radiis  
(24) subangulatis, sulcis  
intermediis decussatim striatis,  
valva utraque conuexa.

Die gleichklappige, beider-  
seits bänchige Schale hat (24)  
einigermaßen eckige Strahlen,  
die mit Querstreifen durchkreuz-  
et sind.

*Brown. Hist. of. Fam. t. 40. f. 10.**Regenf. Samml. I. 2. t. 16. f.**Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.*

— — — II. 5. t. 4. f.

O. II. 15. *Ostrea py-  
xidata*.O. II. 15. Die gefurch-  
te Dose.

Testa inaequivalui, radiis  
(32) conuexis laevis. Val-  
ua altera plana.

Die Schale, welche aus  
einer bänchigen, und einer fla-  
chen Klappe bestehet, hat (32)  
erhabene glatte Strahlen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, radiis (32) con-  
uexis laevis. Valva una plana,  
altera conuexa, prope auriculam  
excisam ciliata. Color albus, fu-  
sco carneoque variegatus.

Die ründliche Schale hat (32)  
erhabene glatte Strahlen. Eine  
Klappe ist flach, die andere bän-  
chig und nächst dem ausgeschnitte-  
nen Ohre rauh. Weiß mit  
fleischrothen Flecken.

O. II.



O. II. 16. Ostrea undata.

O. II. 16. Die wellenförmige Tasche.

Testa aequivalui ovata, radiis (18) convexus, sulcis transuersim striatis.

Die gleichklappige Schale hat (18) erhabene Strahlen, mit nach der Quere gestreiften Zwischenfurchen.

*Knor. Vergn. II. 4. t. 2. 3. f.*

Valvae solitariae ovatae, radiis (18-20) convexus glabris, striis transuersis intercostalibus. Color albus, maculis transuersis undatis sulcis.

Die einzelnen Klappen haben (18-20) erhabene Strahlen, und in die Quere gestreifte Zwischenfurchen. Die Farbe ist weiß mit wellenförmigen braunen Querflecken.

O. III. Petines cardine subobliquo, auriculis breuibus, acutis.

O. III. Rammuscheln mit etwas schiefen Schloße, und kurzen spitzigen Ohren.

O. III. 1. Ostrea fasciata.

O. III. 1. Die Eismuschel.

*Linn. S. N. Sp. 204.*

Testa aequivalui gibba, radiis (20) tenuibus scabris, cardine obliquo, auriculis acutis.

Die gleichklappige höckerige Schale hat (20) dünne rauhe Strahlen, ein schiefes Schloß, und spitzige Ohren.

*Gualt.*



Gualt. Test. t. 74. f. E. E. ?

Mus. Caes. Vindobon.

O. III. 2. Ostrea Lima, O. III. 2. Die Feile.

Linn. S. N. 206.

Belg. Rasp. Doublet. Rumph. Angl. Grater Scallop. Petiv. Gall. Ratifsoir. Argenv.

Testa aequivalui, antice com- Die gleichflappige vorne  
planata, radiis (22) forni- flachgedrückte Schale hat (22)  
cato squamosis, cardine ob- mit rinnenförmigen Schuppen  
liquo, auriculis inaequalibus. besetzte Strahlen, ein schiefes  
Schloß, und ungleiche Ohren.

List. Hist. Conch. t. 3. f. 14.

Rumph. amb. t. 44. f. D.

Petiv. amb. t. 8. f. 4.

Argenv. Conch. Pl. 24. f. E.

Knor. Vergn. VI. 34. r. 3. f.

O. III. 3. Ostrea bul- O. III. 3. Die Bla-  
lata, sentasche.

Testa ovata aequivalui um- Die gleichflappige ensörmie-  
bonata, sulcis longitudinali- ge bäuchige Schale hat (22)  
bus (32); cardine transuer- nach der Länge laufende Furs-  
so, auriculis aequalibus. chen, einen schiefen Rand, und  
gleiche Ohren.

Mus.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa oblongo ovata, tumida, Die eiförmig längliche aufgeblä-  
fulcis (32) longitudinalibus. Um- sene Schale hat (32) nach der  
bones attenuati in apices breves re- Länge laufende Furchen. Die Ab-  
curuos. Cardo transversus. La- bungen verdünnen sich in kurze,  
cuna media lata. Auriculae utrin- rückwärts gekrümmte Spitzen. Das  
que acutae aequales, Color albus. Schloß steht schief. Die Höhlung

in der Mitte derselben ist breit.  
Die Ohren sind spitzig, und einan-  
der gleich. Von weißer Farbe.

O. III. 4. Ostra scabra. O. III. 4. Die raube  
Tasche.

Testa ovata complanata, Die eiförmige zusammen-  
striis longitudinalibus deorsum gedrückte Schale hat nach der  
scabris, auriculis inaequali- Länge laufende abwärts raube  
bus, altera emarginata. Strahlen, und ungleiche Oh-  
ren, deren eines eingesäumt ist.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 13.*

*Knor. Vergn. VI. 38. t. 5. f.*

Testa ovata compressa; striae lon- Die eiförmige zusammengebrückte  
gitudinales numerosae, deorsum Schale ist nach der Länge mit sehr  
ad tactum scabrae. Cardo subobli- vielen Nutzfalten besetzt, und hinab-  
quus. Auriculae inaequales, mino- wärts rauh anzufühlen. Das Schloß  
re emarginata, inter quas testa steht etwas schief. Die Ohren sind  
hiat. Color niveus. ungleich, deren kleineres eingesäu-  
met ist, zwischen welchen die Scha-  
le klapet. Von schneeweißer Farbe.



O. IV. Rudes. Ostreac,

O. IV. Hauße, eigentliche Muftern.

O. IV. 1. Ostrea Mal-  
leus.O. IV. 1. Der polni-  
sche Hammer.*Linn. S. N. Sp. 207.**Belg. Mes hamer. Rumph. Angl. The Hammer - Oyster. Hill. Gall.  
Le Marteau. Dav.*Testa rudi flexuosa trilo-  
ba, lobis transuersis opposi-  
tis,Die rauhe gedrehte Schal-  
le besteht aus drey Lappen, des-  
sen zweien einander entgegen  
gesetzt sind.*List. Hist. Conch. l. 3. f. 54.**Rumph. amb. t. 47. f. A.**Petiv. amb. t. 20. f. 10.**Gualt. Test. t. 96. f. D. E.**Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 14.**Seb. Thes. III. t. 91. f. 4. 5. t. 93. f. 12.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Argenv. Conch. Pl. 19. f. H.**Knor. Vergn. III. 4. t. 1. f.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 2. t. 2. f.*O. IV. 2. Ostrea Fo-  
lium.O. IV. Das Lorbeer-  
blatt.*Linn. S. N. Sp. 209.**Belg. Laurier-blad. Angl. The tree Oyster. Hill. Gall. La Feuille  
du Laurier.*

G

Testa



Testa ovata, margine obtuse plicato, valvae planioris rachi spinosa amplexicauli.

Die eyrunde am Rande stumpf gefaltene Schale hat an der flächeren Klappe eine stachlichte klauenförmige Mittelribbe.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 32.*

*Rumph. amb. t. 47. f. A.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 22.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 2. f.*

O. IV. 3. Ostrea cristata.

O. IV. 3. Die Kammer-auster.

Testa rotundata, lamellis imbricatis, margine obtuse plicato, dentato, apice altero porrecto.

Die rundliche Schale ist mit Blättchen ziegelförmig besetzt, am Rande stumpf, und zahnförmig gefalten. Eine Schloßspitze raget hervor.

*Gualt. Test. t. 104. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequalius membranis imbricatis rugosis. Margo repandus, obtuse plicato dentatus. Apex valvae alterius parvior longior, prominens. Cardinis tendo medius latus conicus. Color albus, maculis dispersis nigris.

Die Schale welche aus ungleichen Klappen bestehet, ist mit runzelichten Blättern ziegelförmig besetzt. Der Rand ausgeschweifet, mit stumpfen zahnförmigen ineinander beißenden Falten. Die Spitze der aufstehenden Schale ist verlängert, und in die Höhe gestreckt. In der Mitte des Schloßes ist ein breiter ziegelförmiger Knorpel. Die Farbe ist weiß mit zerstreuten schwarzen Flecken.

O. IV. 4.



O. IV. 4. *Ostrea edulis*.O. IV. 4. Die gemei-  
ne Auster.*Linn. S. N. Sp. 211.**Belg. Oester. Angl. Oyster. Gall. Huitre. Ital. Ostrea. Gin.**Testa subrotunda complana-  
ta, membranis undulatis im-  
bricata, valvula altera plana  
integerrima.*Die rundliche plattgedrückte  
Schale ist mit runzelichten  
Blättern ziegelförmig bedeckt;  
mit ganzem Rande an der fla-  
chen Klappe.*List. angl. t. 4. f. 21.**Bonan. Recr. cl. 2. f. 70.**List. Hist. Conch. l. 3. f. 195. 196.**Gualt. Test. t. 102. f. B.**Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. 21.**Ginan. adr. II. t. 18. f. 127.**Brst. subf. I. t. 8. f. 12.**Knor. Vergn. III. 24. t. 2. f. 25. t. 2. f.*O. IV. 5. *Ostrea denti-  
culata*.O. IV. 5. Die gezäh-  
nelte Auster.*Testa rotundata foliacea,  
valva altera plana parasitica,  
cardine utrinque denticulato.*Die rundliche blätterige  
Schale hat eine flache aufstü-  
zende Klappe, und an beiden  
Seiten des Schloßes kleine  
Zähnen.

G 2

*Mus.*



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa inaequivalvis, valva altera convexa subovata glabra, altera explanata, rotunda, majore, parasitica. Cartilago latissimus nitidus, Latera postica utrinque acute denticulata, inferenda foucolis testae oppositae.

Die Klappen der Schale sind ungleich, deren eine etwas bäuchig eiförmig und glatt, die andere aber, welche aufsteht, ist flachgedrückt, rundlich und größer. Der Knorpel ist sehr breit und glänzend. An den Seiten des Schloßes ist beiderseits eine Reihe kleiner spitziger Zähne, die in die Grübchen der entgegen gesetzten Schale einbeißen.

O. IV. 6. *Ostrea cucullata.*

O. IV. 6. Die Runzelschappe.

Testa inaequivalvi plicato rugosa, margine dentato, intus striato; valva majore cucullata.

Die ungleiche Schale ist gefalten, und runzelicht, der Rand gezähnt, und inwändig gestreift, die größere Klappe kappenförmig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa solida ponderosa, plicis longitudinalibus, rugisque transuersis inaequalis. Valvae inaequales; altera cucullata, rudi, apice porrecto, postice longitudinaliter secto; altera minore plana. Margo utriusque obtuse dentatus. Limbus striis distantibus eleuatis geminis. Color extus atro violaceus.

Die dicke schwere Schale ist der Länge nach mit breiten Falten, und in die Quere mit Runzeln besetzt. Die Klappen sind ungleich, die eine kappenförmig, rauh, mit hervorstechender stumpfen Spitze, die hinten flach abgeschnitten ist; die andere ist kleiner und flach. Der Rand beider Klappen hat stumpfe Zähne. Am Innerrande sind erhabene paarweis stehende Streifen. Die Farbe ist auswändig dunkelviolett.

O. IV.



O. IV. 7. Ostrea Ehip-  
pium.

Ö. IV. 7. Der polni-  
sche Sattel.

*Linn. S. N. Sp. 215.*

*Belg.* Poolische Zadel. *Angl.* Flat Pearl Oyster. *Petiv. Gall.* Seile  
de Pologne.

Testa aequivalui rotundata  
compressa membranacea, car-  
dine transversim sulcata.

Die rundliche glatt gedrück-  
te häutige Schale hat gleiche  
Klappen, und ein in die Quere  
gefurchtes Schloß.

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 47. f. B.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 4.*

*Seb. Thes. t. 90. f. 10.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 6. f. 6.*

*Müll. Linn. Naturfyst. VI. 1. B. 13. t. 1. f.*

*Mart. Berl. Beschaeft. III. 7. t. 22. f.*

P. Anomia.

P. Die Bastardmu-  
schel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 314.*



Testa inaequivalvis, val-  
ua altera planiuscula, car-  
dinis cicatricula lineari.

Die Schale hat unglei-  
che Klappen, deren eine  
etwas flach ist, und eine  
kleine linienförmige Narbe  
am Schlosse.

P. 1. Anomia Ehip-  
pium.

*Linn. S. N. Sp.* 218.

*Gall.* Pelure d'oignon. *Argenv.*

Testa suborbiculata rugoso  
plicata, valua planiore per-  
forata.

Die rundliche mit Runzeln  
und Falten besetzte Schale hat  
eine flache durchbohrte Klappe.

*List. Hist. Conch.* 2. 3. f. 38.

*Argenv. Conch. Pl.* 19. f. C.

*Ginani, adr. II. t.* 27. f. 172.

*Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 12. t.* 3. f.

P. 2. Anomia Cepa.

P. 2. Die Zwibelschale.

*Linn. S. N. Sp.* 219.

*Belg.* Paarſche Bernſteen Oeſter. *Gall.* Huitre électrique.

Testa subrotunda amethy-  
stina, valua superiore conue-  
xa, inferiore perforata.

Die rundliche Schale ist  
amethystfärbig, ihre obere Klap-  
pe bäuchig, die untere durch-  
bohret.

*Knor. Vergn. VI. 9. t.* 5. f.

P. 3.

P. 3. *Anomia electrica.*P. 3. Die Bernstein-  
auster.*Linn. S. N. Sp. 220.**Belg.* Bernstein - Oester.  
*Huitre d'ambre jaune.**Angl.* Small Amber Oyster. *Petiv. Gall.*Testa subrotunda laevi fla-  
ua, valua altera conuexa  
gibbosa.Die rundliche glatte gelbe  
Schale hat eine bäuchige hö-  
ckerige Klappe.*Rumph. amb. t. 47. f. L.**Knor. Vergn. V. 25. t. 6. f.*P. 4. *Anomia truncata.*P. 4. Die gestumpfte  
Bastardmuschel.*Linn. S. N. Sp. 229.*Testa suborbiculata, obsole-  
te striata, cardine truncato,  
limbo denticulato.Die rundliche feingestreifte  
Schale ist am Schloße abge-  
stumpft, am inneren Rande  
aber gezähelt.*List. angl. l. 9. f. 50.**Mus. Caes. Vindobon.*P. 5. *Anomia caput*  
*serpentis.*P. 5. Der Schlangenz-  
kopf.*Linn. S. N. Sp. 236.**Gall. Le scarabée Dar.*



Testa ovata striata, valvae  
alterius apice longiore perforato,  
margine crenulato.

Die eysförmige gestreifte Schale hat an der einen Klappe eine längere durchbohrte Spitze, und am Rande feine Kerben.

*Colum. purp. p. 22. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 96. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

P. 6. *Anomia vitrea.*

P. 6. Die Glasbohrmuschel.

*Gall. La Poullete. Dav.*

Testa ovata convexa laevi,  
valvae alterius apice incurvato  
pertuso, margine integerrimo.

Die eysförmige bäuchige glatte Schale ist an der schnabelförmigen Spitze der einen Klappe durchbohret, und am Rande ganz.

Ob plicarum defectum à *Terebratula* Linnaei distinguenda.

Sie muß wegen ihrer ungefalteten Oberfläche von der Bohrmuschel des Linne unterschieden werden.

*Argenv. Conch. Suppl. Pl. 3. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 30. t. 4. f.*

*Da Cost. Elem. 6. Pl. 3. f.*

Testa



Testa ovata laevis tenuissima, instar membranae pellucida. Valvae conuexa conuexae absque striis, aut plicis. Valva superior ovata, postice in apicem incurvata prominentem & pertusum; Foramen repletum ligamento filiformi. Valva inferior rotunda, postice gerens callos. Margo tenuis, clausus, integerrimus, anticus retusus. Color albus.

Die Schale ist eiförmig glatt, von der Dünne einer feinen Haut, und durchsichtig. Beide Klappen sind bäumig, ohne Streifen und Falten. Die obere ist eiförmig, und verlängert sich in eine gekrümmte oder schnabelförmige hervorstehende durchbohrte Spitze, in deren Oefnung sich ein fadenförmiges Band befindet. Die untere Klappe ist rund, und hinten mit zweien Schwellen versehen. Der Rand ist dünn, geschlossen, ganz, und vorne stumpf. Die ganze Schale weiß.

### P. 7. Anomia Placenta.

### P. 7. Die Fensterscheibe.

Linn. S. N. Sp. 241.

Belg. Transparent. Angl. The chinese pellucid Oyster. Da Cost. Gall. Vitre chinoise. Dav.

Testa orbiculata complanata foliacea, cardinum callis linearibus adnatis.

Die scheibenrunde plattgestrichelte schieferige Schale hat am Schlosse zwei wulstartige angewachsene Erhöhungen.

„ valvis planis.

„ mit flachen Klappen.

Gualt. Test. t. 104. f. B.

Seb. Thes. t. 90. f. 8, 9.

Knor. Vergn. II. 24. t. I. f.

Da Cost. Elem. 7. Pl. 13. F.



β valuis flexuoso bilobis.

β mit lappenförmig gefaltene Klappen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. Mytilus.

Q. Die Mießmuschel.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

Testa biualvis, cardinis linea excavata, longitudinali, edentula.

Die zweiflappige Schale hat am Schlosse einen vertieften langen Streif ohne Zahn.

Q. I. Parasitici, unguibus affixi.

Q. I. Angewachsene mittelst ihres klauenförmigen Fortsatzes.

Q. I. 1. Mytilus Crista Galli.

Q. I. 1. Der Hahnenkamm.

*Linn. S. N. Sp. 243.*

Belg. Haanekam. Rumph. Engl. Curry Comb Oyster Pet. Gall. Oreille de Cochon. Dav.

Testa angulato plicata, dorso limboque punctato scabris, valua spinosa parasitica.

Die eckiggefaltene Schale ist auf dem Rücken und an dem inneren Rande mit erhabenen Punkten besetzt, und an einer Klappe stachelig und angewachsen.

Rumph.





*Rumph. amb. t. 47. f. D.*

*Petiv. amb. t. 20. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. D.*

*Gualt. Test. t. 104. f. C.*

*Knor. Verg. IV. 10. t. 3, 5. f.*

—— ——— *V. 16. t. 1. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. f. 8.*

Q. I. 2. *Mytilus Hyo-*

Q. I. 2. *Der Blätter-*

*ris.* *famm.*

*Linn. S. N. Sp. 244.*

*Belg. Getakte Haane Kam. Rumph. Angl. Great Finger Oyster.*  
*Pet. Gall Crete de Coq. Dav.*

*Testa plicata, transuerse rugosa, valuis fornicato spinosis, limbo laeui.* Die gefaltene und der Que-  
re nach runzelichte Schale ist  
auf beiden Klappen mit rin-  
nenförmigen Stacheln besetzt,  
und am inneren Rande glatt.

*Rumph. amb. t. 47. f. C.*

*Petiv. Gaz. t. 20. f. 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. H.*

*Gualt. Test. t. 103.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 2. f.*

Q. I. 3.

Q. I. 3. *Mytilus Frons.*Q. I. 3. Das Kamm-  
blatt.*Linn. S. N. Sp. 245.**Belg.* Gekamd Laurierblad, *Angl.* The Hogs Ear Oyster. *Hill.*  
*Gall.* La Feuille. *Dav.*

*Testa angulato plicata, val-* Die eckig gefaltene in die  
*uis transuersim rugosis, lim-* Quere gerunzelte Schale ist  
*bo alterius punctato scabro.* am inneren Rande mit erha-  
 benen Punkten versehen.

*Argenv. Conch. t. 19. f. D. ?**Gualt. Test. t. 104. f. D.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.**Knor. Vergn. IV. 8. t. 3. f.*Q. II. *Plani subauriti.*Q. II. Platte, mit unvollkom-  
menen Ohren.Q. II. 1. *Mytilus mar-*  
*garitiferus.*Q. II. 1. Die Perlmut-  
ter.*Linn. S. N. Sp. 246.**Belg.* Perle moer-Schulp. *Rumph.* *Angl.* Pearl Oyster. *Pet. Gall.*  
*Mere* Perle *Dav.*

*Testa compressa rotunda-* Die plattgedrückte rundliche  
*ta subaurita, tunicis membra-* und einigermaßen mit Ohren  
*naceis imbricata, cardine* versehene Schale ist mit ziegel-  
*transuersim elongato.* förmigen Blättern bedeckt,  
 und mit einem in die Quere  
 verlängerten Schlosse versehen.

Color



Color tunicarum sordide viridescens, radiis latis albis. Specimenis unius valua ponderosa crassa, spithamam diametro excedens, margaritam fouens adnatam praegrandem.

Die Farbe der Blätter ist schmutzgrün, mit breiten weißen Strahlen. Die Klappe eines Stückes ist schwer, dick, im Durchmesser mehr denn eine Spanne lang und enthält eine sehr große angewachsene Perle.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 1.*

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 56, 57, 58.*

*Rumph. amb.. t. 47. f. F.*

*Gualt. Test. t. 84. f. E. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 20. f. A.*

*Knor. Vergn. II. 25. t. I. f.*

*Müll. linn. Naturf. VI. I. B. 13. t. 2, 3. f.*

Q. III. Ventricosiusculi.

Q. III. Etwas bäuchige.

Q. III. I. Mytilus lithophagus.

Q. III. I. Die Steinhuschel.

*Linn. S. N. Sp. 248.*

*Belg. Steen Mossel. Angl. Stone Peirce. Pet. Gall. La Datte. Dav.*

Testa subcilindrica, extremitatibus rotundatis, apicibus recurvis.

Die einigermaßen walzenförmige Schale hat rundliche Seitenende, und zurückgekrümmte Endspitzen.

Epidermis decidua, castanea, saepe transuersim striata.

Die Oberhaut fällt ab, ist von kastanienbrauner Farbe, und öfters in die Quere gestreift.

*List.*



*List. angl. t. 8. f. 37.*

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 46. f. F.*

*Petiv. amb. t. 19. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 90. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. L.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 2. *Mytilus exustus.*

Q. III. 2. Die geferbte  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 251.*

Testa ovata, elongata, decussatim striata, limbo crenulato.

Die eysförmige verlängerte Schale ist in die Quere gestreift, und am Rande mit feinen Kerben versehen.

Color extus roseus.

Von rosenfarber Oberfläche:

*List. Hist. Conch. l. 3. f. 206.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 3. *Mytilus edulis.*

Q. III. 3. Die gemeine  
Mießmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 253.*

*Belg. Mossel. Gall. Moule. Ital. Musculo. Gir.*

Testa



Testa ouato trilatera laeui  
violacea, antice carinata,  
apicibus acuminatis, terminali-  
bus bidentatis.

Die euförmige dreyseitige  
glatte Schale ist von viole-  
ter Farbe, vorne mit ei-  
ner kielförmigen Schneide, und  
an den Endspitzen mit zween  
Zähnen versehen.

α violacea, unicolor.

α violet, einfärbig.

β violacea, radiis rubris.

β violet, mit rothen Strahlen.

*List. angl.* l. 4. f. 28.

— *Hist. Conch.* l. 3. f. 200.

*Bonan. Recr. cl.* 2. f. 30.

*Gualt. Test. t.* 91. f. E.

*Ginan. adr.* II. t. 23. f. 168.

*Memoir. de Paris.* 1711. t. 3. f. 4, 5.

*Bast. Subf. t.* 11. f. 11.

*Regenf. Samml.* I. 12. t. 71. 72. f.

*Knor. Vergn.* IV. 15. t. 1. f.

Q. III. 4. *Mytilus pi-*  
*etus.*

Q. III. 4. Die gefärbte  
Mießmuschel.

*Gall. Moule arborifée. Dav.*

Testa ouata trilatera, grisea,  
laeui, antice carinata, apici-  
bus acuminatis terminalibus,  
bidentatis.

Die euförmige, dreyseitige,  
lichtgraue glatte Schale ist vor-  
ne mit einem kielförmigen Man-  
de, und an den Endspitzen mit  
zween Zähnen versehen.

α grisea



α grisea, unicolor.

α lichtgrau, einsärbig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

β grisea, lineis angulatis rufis.

β lichtgrau, mit rothbraunen Winkelzügen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

γ ex luteo virens, maculis late viridibus, lineis angulatis rufis.

γ gelblich grün, mit hellgrünen Flecken, und rothbraunen Winkelzügen.

*Knor. Vergn. IV. 15. t. 5. f.*

Testa ovato elongata laevis, antice carinata, postice complanata hians, ideoque trilatera, Apices terminales acuminati, dentibus duobus acutis validis, mutuo insertis, extus conspicuis. Cavitas variegante nitore replendens. Priori similis, qua tamen gracilior, colore insuper dentiumque structura praecipue distinguitur.

Die eiförmige verlängerte glatte Schale ist vorne kiefförmig erhoben, hinten flachgedrückt klaffend, und daher dreiseitig. Die Spitzen stehen an einem verdünnten Ende, wo sich zwei starke spitzige von außen sichtbare Zähne befinden. Die Höhlung hat einen bunten Glanz. Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber schwächer, und weicht davon durch die Verschiedenheit der Farbe und der Zähne vorzüglich ab.

Q. III. 5. *Mytilus unguicularus*.

Q. III. 5. Die Klauenmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 254.*

Belg.



Belg. De breede purpuragtige Mossel.

Testa ouato elongata lae- Die eysförmige verlängerte  
ui, valuis conuexis postice glatte Schale hat bäuchige hin-  
incuruatis, extremitatibus at- ten eingebogene Klappen; und  
tenuatis, denticulatis. zugespitzte gezähnelte Ende.

List. Hist. Conch. 1. 3. f. 201.

Gualt. Test. t. 91. f. E.

Regenf. Samml. I. 4. t. 47. f.

Q. III. 6. Mytilus bi-  
dens.

Q. III. 6. Die geribbte  
Miesmuschel.

Linn. S. N. Sp. 255.

Angl. Deep furrowed Cape Muscle, Petiv. Gall. Gueule de Sou-  
ris. Dav.

Testa ouato elongata, lon- Die eysförmige verlängerte  
gitudinaliter sulcata, apicibus nach der Länge gefurchte Schale  
terminalibus dentatis. le hat gezähnelte Endespitzen.

Petiv. Gaz. t. 57. f. 9.

Knor. Vergn. IV. 30. t. 3. f.

Q. III. 7. Mytilus Mo-  
diolus.

Q. III. 7. Die Papus-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 256.



Belg. Zand Mossel. Angl. The Caroline Muscle Hill. Gall. Moule de la terre des Papous. Day.

Testa ovato elongata laevi, Die eyrunde verlängerte  
postice coarctata, hiantē, api- glatte Schale ist hinten einge-  
cibus recurvis, subterminali- drückt und klappend, mit zu-  
bus, rückgebogenen nahe am Ende  
stehenden Spizen.

$\alpha$  margine cardinali obtuso.

$\alpha$  mit stumpfem Schloßrande.

$\beta$  margine cardinali excurrente, seu  $\beta$  mit auslaufendem, oder, vorne  
antrorsum angulato. zu, eckigem Schloßrande.

Liszt. Hist. Conch. l. 3. f. 198.

Petiv. Gaz. t. 71. f. 11.

— amboin. t. 19. f. 16.

Rumph. amb. t. 46. f. B.

Gualt. Test. t. 91. f. H.

Argenv. Conch. Pl. 22. f. C.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.

Adans. Seneg. Pl. 15. f. 1.

Knor. Vergn. IV. 15. t. 3. f.

Q. III. 8. Mytilus Hi-  
rundo.

Q. III. 8. Die Vogel-  
muschel.

Linn. S. N. Sp. 262.

Belg. Vogeltje. Angl. Flying Musclee. Petiv. Gall. L'hirondelle. Day.

Testa





Testa complanata laevi, Die plattgedrückte glatte  
 Valvis basi transuersa bilobis, Schale ist an dem nach der  
 lobo altero elongato. Quere stehenden Schloßrande

mit zween Flügeln versehen,  
 deren einer verlängert ist.

α castanea, fuscoque radiata.

α kastanienfärbig, mit braunen  
 Strahlen.

β viridis, radiis obsoletis ferrugi-  
 neis.

β grün, mit matten eisenrosthigen  
 Strahlen.

Bonan. Recr. cl. 2. f. 58.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 55.

Rumph. amb. t. 46. f. G.

Petiv. amb. t. 19. f. 9.

Argenv. Conch. Pl. 19. f. B.

Gualt. Test. t. 94. f. A. B.

Knor. Vergn. IV. 8. t. 5. f.

———— V. 10. t. 1, 2. f.

———— Del. nat. I. t. B. IV. f. 7.

R. Pinna.

R. Die Steckmuschel.

Linn. Syst. Nat. Gen. 316.

Testa bivalvis, valvis Die Schale hat zwei  
 coalitis, cardine edentu- aneinander verwachsene  
 lo. Klappen, und am Schloß-  
 se keine Zähne.

R. 1. *Pinna pectinata*.R. 1. Der geräucherte  
Schinken.*Linn. S. N. Sp. 264.**Testa fastigiata grisea gla-  
bra, obtuse sulcata, squamis  
fornicatis cylindricis.*Die graue Schale ist zu-  
gespitzt, glatt, mit stumpfen  
Furchen, und hohlen zylindri-  
schen Schuppen besetzt.*Gualt. Test. t. 79. f. A.**Seb. Thes. III. t. 91. f. 3.**Knor. Vergn. II. 26. t. 1. f.*—— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 3.*R. 2. *Pinna nobilis*.R. 2. Der edle Schin-  
ken.*Linn. S. N. Sp. 265.**Testa fastigiata sulcata ru-  
bicunda, squamis canalicula-  
to tubulosis.*Die zugespitzte gefurchte röth-  
liche Schale hat hohle rinnens-  
artige Schuppen.*Bonan. Recr. cl. 2. f. 24.**Argenv. Conch. Pl. 21. f. B.**Adans. Seneg. Pl. 15. f. 5.**Knor. Vergn. II. 26. t. 2. f.*

R. 3.



R. 3. Pinna muricata.

R. 3. Die gedornete  
Steckmuschel.

Linn. S. N. Sp. 266.

Belg. Gedoord Hammetje. Angl. Prickley Ham Muscle Petiv. Gall.  
Jamboneau épineux.

Testa striata albida, squa- Die gefurchte weißliche Scha-  
mis fornicatis, approximatis, le hat hohle, dünne, gedrängt  
acutis. stehende Schüppchen.

List. Hist. Conch. l. 3. f. 215.

Rumph. amb. t. 46. f. M.

Petiv. amb. t. 19. f. 14.

Gualt. Test. t. 79. f. D.

Knor. Vergn. VI. 20. t. 1. f.

R. 4. Pinna incurvata.

R. 4. Der lange Schin-  
ken.

Testa fastigiata, ouata, squa- Die eyförmige zugespizte  
mis fornicatis breuibus, ex- Schale ist mit kurzen hohlen  
tremite altera rotundata. Schuppen besetzt, und an ei-  
nem Ende rundlich.

Seb. Thes. t. 91. f. I.

Gualt. Test. t. 80.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ouata elongata grandis, ex- Die Schale ist eyförmig verlän-  
tremite una attenuata, altera gert, an einem Ende zugespizt, am  
rotundata, Valvae convexae super- andern rundlich, von beträchtlicher  
ficies externa vix manifeste striata, Größe. Die Klappen sind gewölbet  
testa squamulis fornicatis breuibus die äußere Oberfläche kaum merk-  
approximatis. Color praesertim ca- lich gestreift, und mit gedrängten  
H 2

uita-



uitatis carneus, Apices intus saepe margaritacei.

kurzen hohlen Schläppchen besetzt. Die Farbe besonders der Höhlung ist fleischroth. Die Spitzen haben inwendig oft einen Perlmutterglanz.

## R. 5. Pinna Vexillum.

## R. 5. Die Fahne.


Testa fastigiato triangula laevi, margine postico excurrente lobiformi.

Die zugespitzte dreyeckige glatte Schale hat einen lappenförmig ausgebreiteten Vorder- rand.

## Mus. Caes. Vindobon.

Testa fastigiata, conuexa, crassa, laevis. Valvae triangulae, extremitate una attenuata, opposita obtusa, lata; Margo posticus curvilineus, supra excurrente lobiformis. Color fuscus.

Die Schale ist zugespitzt, bäuchig, dick und glatt. Die Klappen sind dreyeckig, das eine End zugespitzt, das andre stumpf und breit. Der Hinterrand ist krummlinig, und oben zu lappenförmig ausgebreitet. Von brauner Farbe.





# Ordo tertius. Dritte Ordnung.

## Univaluia.

## Einschalige.

### A. Argonauta.

### A. Der Segler.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 317.*

Testa unilocularis, cym- Die einkammerige, na-  
biformis, membranacea, chenförmige, dünne Scha-  
spira inuoluta. le hat einen eingerollten  
Schnirkel.

### A. 1. Argonauta Argo.

### A. 1. Der papierne Segler.

*Linn. S. N. Sp. 271.*

*Belg. Docks huijnen. Rumph. Angl. The paper Nautilus. Hill.*  
*Gall. Nautilé papyracé. Argeny. Ital. Polpo Moscardino.*

Testa compressa, carina no-  
dulosa.

Die zusammengedrückte  
Schale hat einen knotigen Kiel.

“ carina tenui, testae rugis bi-  
furcatis.

“ mit schmalem Kieler und gabel-  
förmigen Runzeln.

*Belg. Docks - huijsje Rumph. Angl. The great brittle Saylor, Petiv.*  
*Gall. Nautilé papyracé à carene retrecie Ital. Moscarolo. Bonan.*  
*Germ. Der schmalkehlige Seegler.*



- List. Hist. Conch.* l. 4. s. 4. f. 7.  
*Rumph. amb. t.* 18. f. A.  
*Petiv. amb. t.* 10. f. 1.  
*Gualt. Test. t.* 11. f. A. B. t. 12. f. A.  
*Klein. Meth. Ostr.* 1. 1. f. 3.  
*Seb. Tbes. III. t.* 84. f. 5, 7.  
*Gev. Belust.* 2. t. 4, 5. f.  
*Argenv. Conch. Pl.* 5. f. A.  
 ——— *Zoom. Pl.* 2. f. 2.  
*Hill. Hist. of. Anim.* 7. Pl.  
*Knor. Vergn.* I. 2. t. 1. f.  
 ——— ——— VI. 31. t.  
 ——— *Delic. nat.* I. t. B. I. f. 3.  
*Mart. Konch. Kab.* I. 17. t. 157 f.  
*Da Cost. Elem. Pl.* 3. f. 6.

§ carina lata, obtuse serrata, cos- β mit breitem Riele und von eins-  
 tis rarioribus. ander entfernten Ribben.

† Belg. Breedkielde papiere Nautilus. Angl. The Course brittle Say-  
 lor. Petiv. Gall. Nautilé papyracé à large carene.

- List. Hist. Conch.* l. 4. f. s. 4. f. 6.  
*Rumph. amb. t.* 18. f. B.  
*Petiv. amb. t.* 10. f. 2. t. 22. f. 10.  
*Gualt. Test.* 1. 12. f. C.  
*Gev. Belust.* 2. t. 6, 7. f.



*Argenv. Conch. Pl. 5. f. B.*

*Seb. Thes. III, t. 84. f. 9 — 12.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 2. f.*

— *Del. nat. I, t. B. 1. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. I. 17. t. 158, 159. f.*

*Murray. Fund. Testac. t. 1. f. 8.*

## B. Nautilus.

## B. Die Kammerschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 318.*

Testa polythalamia, dissepimentis siphone communicante perforatis.

Die Scheidewände der vielkammerigen Schale sind mit einer gemeinschaftlichen Röhre durchbohret.

B. I. Nautilus Pompi-  
lius.

B. I. Der dicke Schif-  
boot.

*Linn. S. N. Sp. 273.*

*Belg. Parl - Slakke; Rumph. Angl. Thick Sail - Shell. Gall. Nautilé à cloisons. Argenv.*

Testa subrotunda compressa, apertura cordata, anfractibus obtectis, inuolutis, laevis.

Die rundliche zusammenge-  
drückte Schale hat eine herz-  
förmige Mündung und verborgene, eingerollte, glatte Windungen.



*Bonan. Recr. cl. I. f. 1, 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 4. f. 3, 4.*

*Rumph. amb. t. 17. f. A.*

*Valent. Abb. I. t. 4. f.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 9.*

— amb. t. 3. f. 7.

*Gualt. Test. t. 17. f. A, B.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. E.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. I. I. t. 1. f. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 18. t. 164. f.*

— — — — 19. t. 165, 166, 167. f.

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 16.*

B. 2. Nautilus Spirula.

B. 2. Das Posthorn.

*Linn. S. N. Sp. 279.*

*Belg. Posthoortje Rumph, Angl. The Rams Horn. Da Cost. Gall Corne d'Ammon.*

Testa inuoluta, tereti, anfractibus conspicuis, apertura orbiculari.

Die eingerollte walzenförmige Schale hat sichtbare Windungen, und eine runde Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 4. f. 2.*

*Bonan. Mus. Kirzb. cl. I. f. 39.*

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 20. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 19. f. E.*

*Swammerd. Bibl. nat. I, 7. t. 7. 8. f.*

*Gev. Belust. 3. t. 8. f. a. b.*

*Knor. Vergn. I, 2, t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 20. t. 184. 185. f.*

*Da Cost. Elem. Pl, 2. f. 19.*

## C. Conus.

## C. Die Zutenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 319.*

Testa conuoluta turbinata ; apertura longitudinalis edentula ; columella laevis.

Die zusammengerollte zutenförmige Schale hat eine nach der Länge herablaufende Mündung, ohne Zähne, und eine glatte Spindel.

C. I. Spira planiuscula.

C. I. Mit einem flachen Wirbel.

C. I. 1. Conus marmoreus.

C. I. 1. Die Herztute.

*Linn. S. N. Sp. 290.*

Testa



Testa conica, maculis sub-  
cordatis albis; spirae anfra-  
ctibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale hat  
herzähnliche weiße flecken, und  
rinnenförmig ausgefahlte Wir-  
belgewinde.

α nigrescens, maculis aggregatis.

α schwärzlich, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken,

Belg. Hart-Toot. Rumph. Angl. Tyger-Shell Hill. Gall. Tigre  
noir. Argenv.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 39.

Rumph. amb. t. 32. f. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. 11.

Valent. Abb. t. 3. f. 25. t. 7. f. 65. A.

Gualt. Test. t. 22. f. D.

Seb. Thes. III. t. 46. f. 1 — 4. 13 — 19.  
— — — t. 47. f. 1. t. 55. f. 23.

Adans. Seneg. Pl. 6. f. 1.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regenf. Samml. I. 5. t. 53. f.

Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 685. f.

β testa rufa, maculis aggregatis.

β rothbraun, mit nahe aneinander  
stehenden Flecken.

Belg. Root-Hart-Toot. Gall. Leopard rouge. Argenv.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 123.

Rumph. amb. t. 32. f. 1.

Valent.



*Valent. Abb. t. 5. f. 43.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 2. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. 0.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 17. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 686. f.*

7 testa nigra, maculis rarioribus. 7 schwarz, mit etwas zerstreuten  
Flecken.

*Belg. Schout by Nagt. Gall. Contre Ammiral*

*Valent. Abb. t. 2. f. 10. t. 5. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 46. f. 5 — 12. t. 47. f. 5. 6.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 687. 688. f.*

C. I. 2. Conus imperialis. C. I. 2. Die Kroutute.

*Linn. S. N. Sp. 291.*

*Belg. Kroon - Horn. Rumph. Angl. Crown - Stamper. Petiv. Gall.  
Couronne imperiale Argenv.*

Testa conica alba, fasciis ochraceis, lineisque articulat- Die kegelförmige weiße  
tis transuersis. Schale hat ochergelbe Bänder,  
und linienförmige unterbroche-  
ne Quergürteln.

Spi-



*Spirae anfractus coronati.*

Die Wirbelgewinde sind mit Knoten gekrönt.

*Rumph. amb. t. 34. f. H.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 22. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 18 — 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. F.*

*Knor. Vergn. II. II. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 690. 691. f.*

C. I. 3. *Conus fuscat-*  
*tus.*

C. I. 3. Die schwarz-  
braune Kroutute.

*Belg. Tueete Kron - hoorn. Angl. Blaauw's Stamper. Pet.*

Testa alba fusco maculata, Die weiße und braungefleck-  
lineis transuersis obscurioribus te Schale hat linienförmige  
interruptis. unterbrochene schwarzbraune  
Gürteln.

*Rumph. amb. t. 34. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 17.*

*Klein Meth. Ostr. t. 4. f. 84.*

*Seb. Thes. III. t. 3. f. 35.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. E.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 35. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 62. t. 692. 693. f.*



Testa obuerse conica fusca, maculis longitudinalibus confluentibus albis. Cingula tenuia transversa, atrofusca, interdum albo articulata. Spira planiuscula. Anfractus dentibus coronati. Mucro centralis prominulus.

Die Schale ist verkehrt kegelförmig, von brauner Farbe. Nach ihrer Länge herab, laufen zusammenfließende weiße Flecken. Die linienförmigen schwarzbraunen Gürteln sind manchmal weiß gegliedert. Der Wirbel ist etwas flach. Die Gewinde sind mit knotigen Kronen besetzt. Die Wirbelspitze ragt in der Mitte hervor.

C. I. 4. Conus litteratus.

C. I. 4. Die Tigertute.

Linn. S. N. Sp. 292.

Belg. Letter-Hoorn. Rumph. Angl. Horn - Book - Stamper. Pet. Gall. Damier. Dav.

Testa conica alba, maculis quadratis, seriatim digestis.

Die kegelförmige weiße Schale ist mit würflichten Flecken reihenweise besetzt.

Bonan. Recr. el. 3. f. 363.

List. Hist. Conch. l. 4. 5. 10. p. 2. f. 20.

Rumph. amb. t. 31. f. D.

Petiv. Gaz. t. 41. f. D.

— amb. t. 2. f. 5.

Gualt. Test. t. 21. f. O.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. 1.



*Seb. Tbes. III. t. 45. f. I. — 5.*

*Regeuf. I. 3. t. 29. f.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 3. f.*

—— ——— *III. 3. t. 2. f.*

—— ——— *IV. 26. t. 1. f.*

—— *'Delic nat. I. t. B. III. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 60. t. 666 — 669. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 9.*

α punctis fuscis subaequalibus; absque fascia transversa.

α mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten, ohne Querbänd.

β punctis fuscis subaequalibus, absque fascia transversa, spira nodoso coronata.

β mit beinahe gleichgroßen braunen Punkten ohne Querbänd, und gekrönter Wirbelspitze,

γ punctis fuscis confertis, fascia gemina flava.

γ mit gedrängt stehenden braunen Punkten und gedoppelten gelben Bänd.

δ punctis fuscis distinctis. fasciis tribus flauescentibus.

δ mit zerstreuten braunen Punkten, und drey gelblichen Bändern.

ε maculis quadratis fuscis, fasciis tribus transversis latis.

ε mit würflichten braunen Flecken, und drey breiten Querbändern.

ζ maculis punctisque confluentibus fulvis.

ζ mit zusammenfließenden rothgelben Flecken, und Punkten.



C. I. 5. Conus generalis.

C. I. 5. Das Klöppel-  
füßen.*Linn. S. N. Sp. 293.**Belg.* Speeldewerk Kuffen. *Rumph.* *Angl.* Net-listed - Stamper  
*Petiv.* Gäll, La Flamboyante *Argenv.*Testa conica ferruginea, fa-  
sciis tribus interruptis albis,  
anfractibus canaliculatis,Die kegelförmige rostfar-  
bige Schale hat drey weiße un-  
terbrochene Bänder, und aus-  
gekehlte Wirbelgewinde.*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 34.**Petiv. Gaz. I. t. 27. f. 11.*

— amb. t. 3. f. 9.

*Rumph. amb. t. 33. f. 1.**Gualt. Test. t. 20. f. G.**Seb. Thes. III. t. 54. f. 11 — 13.**Argenv. Conch. Pl. 12. f. T.**Regenf. Samml. I. 6. t. 65. f.**Knor. Vergn. III. 17. t. 4, 5. f. 18. t. 3, 4. f.**Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 648 — 652. f.**Da Cost. Elem. Pl. 5. F. 8.*

α fasciis fuscis.

α mit braunen Bändern.

β fasciis fulvis.

β mit rothgelben Bändern.



C. I. 6. *Conus candi-*  
dus.

C. I. 6. Die weiße Kron-  
tute.

Testa conica glabra alba,  
spirae anfractibus coronatis.

Die kegelförmige glatte weiß-  
se Schale hat gekrönte Wirbel-  
gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica solida niuea; Ven-  
ter conuexiusculus; Apex centra-  
lis prominulus, decorticatus, ame-  
thyltinus.

Die kegelförmige dichte Schale  
ist weiß, einigermaßen bläulich. Die  
abgenützte in der Mitte hervorra-  
gende Wirbelspitze ist amethystfarbig.

C. I. 7. *Conus Virgo.*

C. I. 7. Die Menmoni-  
tentute.

*Linn. S. N. Sp. 294.*

*Belg. Mennonist Toet. Rumph. Angl. Wax - stamper. Petiv. Gall.*  
*Bout de Chandelle. Dav.*

Testa conica pallida, trans-  
uersim rugoso striata, basi  
violacea.

Die kegelförmige weißliche,  
der Quere nach runzelicht ge-  
streifte Schale hat eine violette  
Grundspitze.

*List. Hist. Conch. l. 4 s. 10. p. 2. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 31. f. E.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 20. f. B.*

*Seb.*





*Seb. Tbes. III. t. 47. f. 8, 9.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Konch II. 53. t. 585. f.*

C. I. 8. *Conus tessulatus*. C. I. 8. Der Estrich.

*Belg. Italienische Vloerken. Angl. The italien Parement. Gall. Nappe d'Italie.*

*Testa conica alba, maculis oblongis cinnabarinis; basi fulcata, amethystina.* Die kegelförmige weiße Schale hat langwürflichte zinnoberrothe Flecken und eine gefurchte amethystfarbige Grundspitze,

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 17.*

*Valent. Abb. 6. t. 52. f.*

*Gualt. Test. t. 21. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 55. f. 4 — 9.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 19. f.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 653. f.*

An praecedentis varietas?

Vielleicht eine Abänderung der vorhergehenden Art.

C. I. 9. *Conus Capita-neus*. C. I. 9. Die Käsetute.

*Linn. S. N. Sp. 295.*

I 2

*Belg.*



Belg. Groene Kaas Rumph. Angl. Green Stamper. Pet. Gall. L'Her-  
mine Dav.

Testa conica glabra, fasciis Die kegelförmige glatte  
duabus albis fusco maculatis. Schale hat zwey braun gefleck-  
te Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 27.

Rumph. amb. t. 33. f. X.

Petiv. amb. t. 9. f. II.

Gualt. Test. t. 22. f. M.

Seb. Thes. III. t. 22. f. 26, 27, 30, 31, 33.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. K.

Regenf. Samml. I. 7. t. 7. f.

Knor. Verg. I. 15. t. 3. f.

—— V. 16. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 59. t. 660-662. f.

$\alpha$  olivacea.

$\alpha$  olivengrün.

$\beta$  rufa.

$\beta$  rothbraun.

C. I. 10. Conus miles. C. I. 10. Die Zwirnz-  
tute.

Linn. S. N. Sp. 296.

Belg. Arakans - Garen. Rumph. Angl. Garter Stamper. Petiv. Gall.  
Le Navet. Argenv.

Testa conica albida, fasciis Die kegelförmige weiße  
duabus transuersis fuscis. Schale hat zwey braune Quers-  
bänder.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p 2. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 33. f. IV.*

*Petiv. amb. t. 8. f. I.*

*Gualt. Test. t. 20. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 23, 25.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. L.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 4. f.*

—— ——— III. I. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 663. 664. f.*

## C. I. II. Conus Centurio.

## C. I. II. Der Drangen- fegel.

Testa conica, basi attenuata transuerfim sulcata, anfractibus canaliculatis.

Die kegelförmige Schale ist an dem zugespitzten Grunde in die Quere gefurchet, und an den Gewinden ausgekehlet.

## Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica, laevis; Basis attenuata, sulcis transuerfis. Spira planiuscula. Anfractus contigui, canaliculati. Vertex obtusus centralis. Color aurantius. Fasciae duae transuersae albae, lineis aurantiis angulatis oblique transcurrentibus.

Die Schale ist kegelförmig und glatt. Der Grund zugespitzt, und in die Quere gefurchet. Der Schnirkel flach. Die Gewinde berühren einander, und sind rinnensförmig ausgekehlet. Der stumpfe Wiebel steht in der Mitte. Die Farbe ist orangengelb. Zwen breite Querbänder sind mit schiefen orangensfarbigen eckigen Linien durchzogen.



C. II. Spira pyramidata.

C. II. Mit einem pyramidenförmigen Wirbel.

C. II. 1. Conus Princeps.

C. II. 1. Die Bastardbauernmusik.

. Linn. S. N. Sp. 297.

Belg. Balfert Tygers Katje. Gall. La fausse Hebraïque. Dav.

Testa turbinata fusco nigra, lineis longitudinalibus, flexuosis, pallidis.

Die spizwirblige Schale ist braunschwarz, und mit blassen gekrümmten Strichen nach der Länge herab besetzt.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 26.

Valent. Abb. II. t. 94. f.

Gualt. Test. t. 25. f. Q.

Argenv. Conch. Pl. 12. f. B.

Seb. Thes. III. t. 47. f. 30, 31.

Knor. Vergn. III. 4. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. II. 63. t. 699. 700. f.

C. II. 2. Conus Ammiralis.

C. II. 2. Die Admiraltute.

Linn. S. N. Sp. 298.

Belg. Opper-Admiral. Angl. Burg's-stamper. Petiv. Gall. Le grand Admiral. Argenv.

Testa



Testa fulva, maculis dispersis albis, fasciisque transuersis reticulatis.

Die rothbraune Schale ist mit zerstreuten Flecken besetzt, und mit netzförmigen Querbändern umgeben.

α fasciis transuersis tribus, secunda cingulo articulado bifariam diuisa.

α mit drey Querbändern, davon das zweyte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet ist.

*Rumph. amb. t. 34. f. B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 18.*

*Argenv. Conch Pl. 12. f. N.*

*Adans. Seneg. Pl. 6. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 5, 6.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 2. f.*

— *Delic. nat. I. t. B. V. f. 6.*

β fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia cingulo articulado bifariam diuisa.

β mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal, das dritte durch einen gegliederten Gürtel abgetheilet wird.

γ fasciis quatuor, secunda obsoleta tenui, tertia lata, cingulis articulatis duobus trifariam partita.

γ mit vier Bändern, davon das zweyte unvollkommen und schmal ist, das dritte breite aber durch zwey gegliederte Gürteln dreymal abgetheilet wird.

*Petiv. amb. t. 15. f. II.*

*Argenv. Suppl. Pl. I. f. P.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 4, 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



C. II. 3. *Conus Senator*.

C. II. 3. Die Schild-  
krötentute.

*Linn. S. N. Sp. 300?*

*Belg. Schildpad - Toot. Gall. Ecaile de tortue.*

*Testa ovata nebulosa laevi, transuersim articulado striata.* Die eysförmige nebelichte glatte Schale ist mit unterbrochenen Querstreifen umgeben.

*Seb. Thes. III. t. 43. f. 29, 36.*

*Knor. Vergn. VI. I. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 609 — 611. f.*

C. II. 4. *Conus genuanus.*

C. II. 4. Die guineische  
Tute.

*Linn. S. N. Sp. 302.*

*Belg. Geneesche Toot. Gall. Aile de papillon. Argenv.*

*Testa pallido rubra, cingulis albo fuscoque articulatis.* Die blasfrothe Schale ist mit weiß und braun unterbrochenen Bändern umgeben.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 337.*

*List. Hist. Conch. I. 4. s. 10. p. 2. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 34. f. G.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 1 — 3.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 623 — 625.*

C. II. 5. *Conus Mo-*  
*nachus.*

C. II. 5. *Der Mönch.*

*Linn. S. N. Sp. 304.*

*Belg. Graeve Munniker. Rumph. Angl. Gray Monk. Petiv.*

Testa laevi fusca, albo &  
coerulef. ente nebulata, basi  
transuerse sulcata.

Die glatte braune, weiß  
und hellblau wolfigte Schale  
hat eine in die Quere gefurchte  
Grundspize.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 126.*

*Rumph. amb. t. 33. f. CC.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 7.*

*Valent. Abb. 9. t. 74. f.*

*Seb. Thes. III. t. 48. f. 45.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 2. f.*

— — — V. 18. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 55. t. 614. f.*



C. II. 6. Conus minimus.

C. II. 6. Der graue Mönch.

*Linn. S. N. Sp. 305.*

*Gall. La minime, Dav.*

Testa ovato oblonga, glauco albideque nebulosa, lineis fuscis interruptis cincta.

Die eysförmige längliche blau-licht graue Schale hat weisse Wolken und braune unterbrochene Querstreife.

Variat etiam spira coronata.

Es giebt auch eine Abänderung mit gekröntem Wirbel.

*Valent. Abb. 3. t. 24. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Knor. Vergn. III. 27. t. 2. f.*

C. II. 7. Conus Mercator.

C. II. 7. Die bandirte Neztute.

*Linn. S. N. Sp. 307.*

*Belg. Net - Tootje.*

Testa ovata alba, fasciis latis reticulatis fulvis.

Die eysförmige weisse Schale hat breite eysförmige rothgelbe Bänder.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 41.*

*Valent. Abb. 7. t. 65. B. f.*

*Argene.*





*Argenv. Conch. Pl. 12. f. P.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 3.*

*Knor. Vergn. II. 1. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 620. f.*

C. II. 8. *Conus reticulatus.*

C. II. 8. Das Fische-  
netz.

*Gall. Drap à réseau.*

Testa ovato oblonga niuea,  
undique fulvo reticulata.

Die eysförmige längliche  
weiße Schale ist allenthalben  
mit einem rothbraunen Netze  
überzogen.

*Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 621. f.*

Testa ovata, pyriformis, gla-  
berrima niuea, filis reticulatis ful-  
vis intertexta, areolis lanceolatis,  
transuersis. Basis attenuata trans-  
uersim fulcata. Spira pyramidata  
laevis, anfractibus contiguus. Ver-  
tex centralis acuminatus.

Die eylange birnförmige Schale  
ist glatt, schneeweiß, mit roth-  
braunen netzförmigen Fäden be-  
setzt, deren Zwischenflächen länglich,  
und in die Quere gestellet sind.  
Der Schnirkel ist pyramidenförmig  
und glatt, die Gewinde aneinander  
verwachsen. Der Wirbel raget aus  
der Mitte spizig hervor.

An prioris Varietas?

Etwan eine Abänderung der vo-  
rigen Art?

C. II. 9. *Conus betuli-*  
*mus.*

C. II. 9. Die gelbe But-  
terweide.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 308.*

*Belg.* Boterweg. *Rumph. Angl.* Great yellow Leopard Stamper  
*Pet. Gall.* Pelote de beurre. *Dav.*

*Testa turbinata laeui, maculis fuscis per series cincta, basi rugosa.*

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunen Flecken reiheweise umgeben, und an der Grundspize runzelicht.

*List. Hist. Conch. l. 4, s. 10. p. 2. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 31. f. C.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 21. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 1 — 4.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. II, 60 t. 665. f.*

*C. II. 10. Conus figurinus.*

*C. II. 10. Die Eichenholztute.*

*Linn. S. N. Sp. 309.*

*Belg.* Eckenhouts-Toot. *Rumph. Angl.* The Oacken-wood Stamper.  
*Gall.* Le bois de Chene.

*Testa turbinata laeui, lineis transuersis fuscescentibus.*

Die spizwirblige glatte Schale ist mit braunlichen Quersstrichen umgeben.

*List.*



*List. Hist. Conch. t. 4. s. 10. p. 2. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 31. f. V.*

*Gualt. Test. t. 20. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. A.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 47. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 23. f.*

— — — *V. 25. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 59. t. 656, 657. f.*

C. II. 11. *Conus ermi-  
neus.*

C. II. 11. *Der Her-  
melinschwauz.*

*Belg. Hermelin Staart. Gall. Queue d'Hermine. Dav.*

*Testa pyriformi fulva basi striis punctatis scabra, fasciis transuersis niuis.* Die birnförmige rothgelbe Schale hat am Grunde erhabene punktirte Streife, und schneeweiße Querbänder.

*Valent. Abb. 5. t. 47. f.*

*Gualt. Test. t. 20. f. Q.*

*Seb. Tbes. III. t. 42. f. 31 — 40.*

*Mart. Konch. Kab. II. 57. t. 631. f.*

*Testa pyriformis glabra, basi transversim striata, striis elevatis punctatiscabris. Spira conica. Anfractus glabri planiusculi. Color fulvus; spira albo maculata; ventris* Die Schale ist birnförmig, und glatt, am Grunde in die Quere gestreift, und auf den erhabenen Streifen mit Körnern besetzt. Der Schnirkel ist kegelförmig. Die

cin-



cingula duo interrupta alba. Puncta eleuata alba.

Gewinde glatt und etwas flach.  
Die Farbe rothgelb an dem Schneckel weißgefleckt, und um den Leib mit zweyen unterbrochenen Querbändern umgeben. Die erhabenen Punkte, oder Körner sind weiß.

C. II. 12. Conus Hebraeus.

C. II. 12. Die Bauernmuschel.

*Linn. S. N. Sp. 310.*

*Belg.* Böeren - mysyk, *Rumph.* *Angl.* Black Diamond Stamper  
*Pet. L' Hebraique.* *Dav.*

Testa ouata, maculis oblongis per series transuersum cinerea.

Die eysförmige Schale ist mit länglichen Flecken der Quere nach reiheweise umgeben.

α maculis fuscis

α mit braunen Flecken.

β maculis rufis.

β mit rothgelben Flecken.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 122.*

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 33. f. BB.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 12.*

— *Gaz. t. 99. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. G.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 5.*

*Seb.*



Seb. Thes. III. t. 47. f. 28 — 29.

Knor. Vergn. III. 6. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. II. 56. t. 617. f.

C. II. 13. Conus Stercus muscarum. C. II. 13. Die Sandtute.

Linn. S. N. Sp. 311.

Belg. Vliegge - Schettje. Rumph. Angl. Sand - Stamper. Pet. Gall. Piqure de mouche.

Testa oblonga punctis pictis Die längliche Schale ist  
adpersa ; anfractibus canali- mit gefärbten Punkten bestreuet,  
culatis. und an den Gewinden ausge-  
fehlet.

α elongata, spirae anfractibus ae- α länglich, mit glatten Webelge-  
qualibus. winden.

List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 75. f. 1.

— amb. t. 15. f. 21.

Rumph. amb. t. 33. f. Z.

Gualt. Test. t. 25. f. N. O.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. E.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 1.

Regenf. Samml. I. 7. t. 2. f.

Knor. Vergn. I. 7. t. 5. f.

— Del. nat. I. t. B. 5. f. 7.

Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 711 — 713. f.

β ventri-



β ventricosa, spirae anfractibus coronatis. β bäuchig, mit gekrönten Wirbelgewinden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 2. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. S.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

C. II. 14. Conus varius.

C. II. 14. Die Löwenturte.

*Linn. S. N. Sp. 312.*

*Belg. Westindische Landcharten. Gall. Peau de chagrin. Argenv.*

Testa elongata, punctis elevatis cincta, spirae anfractibus coronatis.

Die längliche Schale ist mit erhabenen Punkten umgeben, und an den Gewinden gekrönt.

α fusca, maculis confluentibus ramosis. α braun, mit weißen zusammenfließenden Flecken.

β lutea, maculis albis dispersis solitariis. β gelb, mit weißen zerstreuten einzelnen Flecken.

*Gualt. Test. t. 20. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 12. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 20 — 22.*

*Knor. Vergn. I. 24. t. 5. f.*

— — II. 1. t. 5. f.

— — VI. 1. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 6. 1. t. 678. 679. f.*

C. III.



C. III. Elongati.

C. III. Lange Zuten.

C. III. 1. Conus Nuffa-  
tella.C. III. 1. Der punktir-  
te Bohrer.*Linn. S. N. Sp. 314.**Belg. Gegränuleerde Kuipers - Boor. Rumph. Angl. Grain girdled  
Stamper. Petiv. Gall. Tarriere chagrinee.*Testa subcylindrica, striis  
transuersis eleuatis punctato  
maculatis.Die fast walzenförmige  
Schale ist der Quere nach mit  
erhabenen Streifen umgeben,  
und mit gefleckten Punkten be-  
setzt.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 35.**Rumph. amb. t. 33. f. EE.**Petiv. amb. t. 15. f. 13.**Gualt. Test. t. 25. f. L.**Argenv. Conch. Pl. 13. f. P.**Knor. Vergn. II. 4. t. 7. f.*

— — — III. 19. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 567. f.*C. III. 2. Conus Tere-  
bra.C. III. 2. Der Zirkelboh-  
rer.*Belg. Witte gevoorde Kuypers - Boor. Gall. Tarriere blanche &  
cerclée.*



Testa oblonga albida, striis Die längliche weiße Schale  
elevatis transuersis parallelis. ist mit erhabenen parallelen  
Querstreifen umgeben.

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 577. f.*

Testa oblonga crassa, transuer-  
sim striata; striis elevatis paralle-  
lis. Spira conica; anfractus decli-  
ves, striati, contigui. Color ru-  
bellus, fasciis duabus transuersis  
obsoletis albis. Vertex, & basis  
spoliata, amethystina.

Die Schale ist länglich, und dicht,  
in die Quere gestreift. Die Strei-  
fen erhaben, und gleichweit von  
einander entfernt. Der Wirbel  
kegelförmig, die Gewinde ab-  
hängig, gestreift, und aneinander  
gewachsen. Die Farbe blaßroth mit  
zweyen matten weißen Querbän-  
dern; der Wirbel, und die Grundspitze  
haben, wenn sie abgezogen sind,  
eine Amethystfarbe.

C. III. 3. Conus gra-  
nulatus.

C. III. 3. Der gefurch-  
te Bohrer.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 315.*

*Belg.* Bastert Orangie Admiraal. *Angl.* Small chain Stamper. *Petiv.*  
*Gall.* Faux Amiral orangé.

Testa oblonga transuersim  
fulcata, fasciis albis fusco  
maculatis.

Die längliche in die Quere  
gefurchte Schale ist mit weiß-  
sen braungefleckten Querbän-  
dern umgeben.

*Rumph. amb. t. 32. f. T.*

*Petiv. amb. t. 15. f. I.*

*Gualt.*





*Gualt. Test. t. 25. f. H.*

*Seb. Tbes. III. t. 48. f. 26.*

*Knor. Vergn. III. 6. t. 5. f.*

— — — *V. 24. t. 2. f.*

C. III. 4. Conus circum-  
ciscus.

C. III. 4. Der Draniens-  
bohrer.

Testa subcylindrica fusco-  
que maculata, striis incisis  
transuersis.

Die fast walzenförmige  
Schale ist braungesfleckt, und  
mit eingeschnittenen Querstri-  
chen umgeben.

*Valent. Abb. t. 2. f. II.*

*Mart. Konch. Kab. II. 52. t. 571. f.*

Testa subcylindrica laevis striis  
transuersis incisis parallelis. Spira  
planiuscula. Vertex prominens, acu-  
tus centralis. Color ex flavescenti  
rubescens, fasciis transuersis obso-  
letis albis, punctis dispersis rubris.

Die walzenförmige Schale ist  
in die Quere mit eingeschnittenen,  
parallelen Strichen umgeben. Der  
Schnirkel ist flach. Der spizige  
Wirbel ragt aus der Mitte hervor.  
Die Farbe ist gelblich roth, mit  
matten weißen Querbändern, und  
zerstreuten rothen Punkten.

C. III. 5. Conus planor-  
bis.

C. III. 5. Der Platte-  
wirbel.



Testa conico ventricosa ful- Die kegelförmige rothgelbe  
ua, basi transuersim striato Schale ist am Grunde mit  
punctata; spira plana canali- punktirten Streifen umgeben,  
culata. und auf dem flachen Schnirkel  
ausgekehlet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica ventricosiuscula, Die kegelförmige etwas bäuchige  
prope basin transuersim striata, striis gestreift, die Streifen erhaben,  
eleuatis, punctato scabris. Spira und mit Körnern besetzt. Der Schnir-  
plana. Anfractus canaliculati, mar- kel flach. Die Gewinde ausgekehlet,  
gine extimo acuto. Color ventris am äußersten Rande scharf. Die  
fuluus, spirae albo fuluoque ma- Schale ist rothgelb, der Schnirkel  
culatus. Basis intus amethystina. weiß gestreift. Der Grund inwän-  
dig amethystfärbig.

C. III. 6. Conus Magus.

C. III. 6. Das gefleck-  
te Käzchen.

*Linn. S. N. Sp. 317.*

Belg. Geplekte Katje. *Rumph. Angl. Tabby Stamper. Petiv. Gall.*  
la; Picotée. *Argenv.*

Testa subcylindrica, fasciis Die fast walzenförmige  
longitudinalibus albo puncta- Schale hat nach der Länge  
tis. laufende punktirte Bänder.

*Rumph. amb. t. 32. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 5. f. IO.*

*Argenv. Suppl. Pl. 2. f. C?*

*Gualt.*



*Gualt. Test. t. 20. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 44. f. 27.*

*Knor. Vergn. VI. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 58. t. 641. f.*

C. III. 7. *Conus striatus.*

C. II. 7. Die Wolfenrolle.

*Linn. S. N. Sp. 318.*

*Belg. De Wolkhoorn. Rumph. Angl. Tyger Stamper. Petiv. Gall. l'Ecorchée. Argenv.*

Testa ouato oblonga nebulosa, lineis parallelis transversim picta.

Die eysförmig längliche wolliche Schale ist mit gleichweit entfernten Linien bemalt.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 2. f. 6.*

*Valent. Abb. 7. t. 60. 61. f.*

*Rumph. amb. t. 31. f. F.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 4.*

— *Gaz. t. 98. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 5, 10.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 13. f.*



*Knor. Vergn.* I. 18. t. 1. f.

— — — *III.* 12. t. 5. f. 21. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab.* II, 64. t. 714 — 716. f.

**C. III. 8. Conus Textile.**

**C. III. 8. Die Spizenrolle.**

*Linn. S. N. Sp.* 319.

*Belg. Gouldlaken. Rumpā. Angl. Galdbrocade Scheil. Hill. Gall. Le Drap d'or. Dan,*

Testa ovato oblonga, venis reticulatis fuscis, maculis luteis fuscisque.

Die ensförmige, längliche gelb, und braun gefleckte Schale ist mit netzförmigen braunen Adern bemalet.

*Bouan. Recr. cl.* 3. f. 135.

*List. Hist. Conch.* I, 4. f. 10. p. 2. f. 43.

*Rumph. amb.* t. 32. f. O. P.

*Petiv. amb.* t. 15. f. 9.

*Gualt. Test.* t. 25. f. X.

*Argenv. Conch. Pl.* 13. f. F. I.

*Adans. Seneg. Pl.* 6. f. 7.

*Seb. Tbes.* III. t. 43. f. 6 — 12. t. 47. f. 13 — 17.

*Regensf. Samml.* I. 6. t. 62. f.

*Knor. Vergn.* I. 18. t. 6. f.

— — — *II.* 8. t. 3. f.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 598 — 600.*

C. III. 9. *Conus aulicus*. C. III. 9. Die Brunette.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Bruinet - Toot Rumph. Angl. The Porphyry Shell. Hill. Gall. La Brunette. Dav.*

Testa subcylindrica, maculis dispersis inaequalibus trigonis. Die beinahe walzenförmige Schale ist mit zerstreuten ungleichen dreieckigen Flecken bezeichnet.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 133.*

*Rumph. amb. t. 33. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. G.*

*Seb. Thes. t. 43. f. 1, 2, 4, 5; t. 47 f. 13 — 15.*

*Regenf. Samml. I. 8. t. 25. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 5. t. 3. f.*

—— III. 19. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 592. f.*

C. III. 10. *Conus pen-naceus*. C. III. 10. Die Federtute.



Belg. De Zilver Lakén Rumph. Gall. Volute pannacchée.

Testa conica cinnamomea, Die kegelförmige zimmetfar-  
lineis punctatis transuersis, & bige Schale ist mit punktirten  
maculis pennatis dispersis pal- Querlinien, und zerstreuten  
lidis picta. weißlichen federförmigen Fle-  
cken bemalt.

Mart. Konch. Kab. II. 54. t. 596. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conica crassa glaberrima. Die Schale ist kegelförmig, dicht  
Spira obtusa anfractibus infimis pla- und glatt, der Schnirkel stumpf,  
nis, supremis eleuatis in ver- die unteren Gewinde flach, die obo-  
ticem centralem pyramidatum ob- ren in der Mitte pyramidenförmig  
tusum. Color cinnamomeus. Li- erhaben, und zugespitzt, zinno-  
neae pictae transuersae ex seriebus berfärbig mit rothbraunen aus  
punctorum ruforum. Maculae di- Punkten zusammengesetzten Quer-  
persae, albiae, aut pallide vio- linien. Die zerstreuten weißen, oder  
laceae, pennatae. weißblauen Flecken, sind federförmig.

C. IV. Laxi, ventricosi.

C. IV. Weltbauchige Tuten.

C. IV. 1. Conus Spe-  
ctrum.

C. IV. 1. Das Gespenst.

[ Linn. S. N. Sp. 321.

Belg. Spookje. Rumph. Angl. Fairy-Stamper Petiv. Gall. Le Spectre.

Testa oblōga gibba, fas- Die längliche höckerige  
ciis longitudinalibus undula- Schale hat nach ihrer Länge  
tis. wellenförmige Bänder.

Rumph.



*Rumph. amb. t. 32. f. S.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 5.*

*Valent. Abb. 5. t. 39. f.*

*Gualt. Test. t. 25. f. S.*

*Seb. Thes. III. t. 47. f. 24.*

*Knor. Vergn. II. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 53. t. 581. 583.*

C. IV. 2. *Conus bullatus.*

C. IV. 2. Die Wolkensacke.

*Linn. S. N. Sp. 322.*

*Belg. Wolkbakje.*

*Testa oblonga, nebulosa  
columella flexuosa, emarginata.*

Die länglichte neblichte Schale hat eine gedrehte eingesäumte Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. s. 10. p. 1. f. 43.*

*Gualt. Test. t. 26. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 1.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 65. t. 726. 727. f.*

C. IV. 3. *Conus Tulipa.*

C. IV. 3. Die Tulpe.

*Linn. S. N. Sp. 323.*

K 5

*Belg.*



Belg. Achaat toot. *Angl.* The Tulip - Shell *Hill. Gall.* La Tulipe. *Argenv.*

Testa oblonga laevi, apertura patente, anfractibus super premis coronatis. Die längliche glatte Schale hat eine weite Mündung, und die obersten Gewinde gekrönt.

*List. Hist. Conch.* 1. 4. f. 10. p. 2. f. 7.

*Rumph. amb. t.* 34. f. K.

*Petiv. amb. t.* 4. f. 14.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. B.

*Seb. Thes. III. t.* 42. f. 16, 20. t. 43. f. 20 - 22.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 8.

*Regenf. Samml. I.* 2. t. 20. f.

*Knor. Vergn. V.* 20. t. 1, 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II.* 64. t. 718, 719.

C. IV. 4. *Conus Geographus.*

C. IV. 4. Die Kronen-  
hülle.

*Linn. S. N. Sp.* 324.

Belg. Wolkje. *Rumph. Angl.* Cloudy - Stamper *Petiv. Gall.* Brocard de Soie. *Argenv.*

Testa oblonga, spira coronata, apertura patente. Die längliche Schale hat gekrönte Gewinde, und eine weite Mündung.

*Bonan.*





*Bonan. Recr. cl. 3. f. 319.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. p. 1. f. 41.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 8.*

— amb. t. 15. f. 3. A.

*Rumph. amb. t. 31. f. G.*

*Gualt. Test. t. 26. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. A.*

*Adans. Seneg. t. 6. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 42. f. 1—4.*

*Knor. Vergn. III. 21. t. 2. f.*

— — VI. 17. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 64. t. 717. f.*

## D. Cypraea.

## D. Die Porzellanschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 320.*

Testa convoluta, sub-  
ovata, apertura longitudi-  
nali, utrinque denticulata,  
extremitatibus effusis.

Die Schale ist zusam-  
mengerollet, einigermassen  
enförmig, ihre Mündung,  
welche der Länge nach he-  
rabläuft, ist beiderseits ge-  
zähnel, und an den En-  
den ausgeschnitten.



D. I. Mucronatae.

D. I. Spizwirblige,

D. I. 1. Cypraea Exan-  
thema.D. I. 1. Der Bastard  
Argus.*Linn. S. N. Sp. 325.*

*Belg.* Bastert Argus. *Angl.* Great hebrew Gowry. *Petiv. Gall.*  
Le faux Argus. *Dav.*

Testa turbinata, pallide  
maculata, characteribus in-  
scripta, linea longitudinali  
subramosa.

Die spizwirblige Schale  
ist weißgesteckt, mit buch-  
stabenähnlichen Strichen bema-  
let, und nach der Länge des  
Rückens mit einer geschlängel-  
ten Linie versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 45, 46.**Petiv. Gaz. t. 96. f. 6.**Seb. Thes. III. t. 76. f. 16, 18.**Regenf. Samml. I. 10. t. 38. f.**Knor. Vergn. I. 5. t. 3, 4. f.*

—— — II. 24. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 289. f. 29. t. 298. f.*

D. I. 2. Cypraea Mappa. D. I. 2. Die Landcharte.

*Linn. S. N. Sp. 326.*

*Belg.* Kaaphoorn. *Angl.* The Map - Shell. *Hill. Gall.* La Carte  
geographique. *Dav.*

Testa



Testa turbinata, characteribus inscripta, linea longitudinali ramosa.

Die spizwirblige Schale ist mit buchstabenähnlichen Zügen bemalt, und mit einer ästigen Linie nach der Länge des Rückens durchzogen.

*Rumph. amb. t. 38. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 3, 13, 17.*

*Knor. Vergn. I. 26. t. 3. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. IV. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 25. t. 245. f.*

D. I. 3. *Cypraea arabica.*

D. I. 3. Die arabische Buchstaben = Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 327.*

*Belg. Arabische Letters Hoorn. Gall. La fausse Arlequine. Dav.*

Testa turbinata, pallide maculata, characteribus inscripta, linea longitudinali simpliciter.

Die spizwirblige Schale ist blaßgefleckt mit arabischen Buchstaben ähnlichen Zügen und einer einfachen Linie nach der Länge des Rückens bemalt.

α maculis inter characteres irregularibus.

α mit unregelmäßigen Flecken zwischen den Zügen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 38. f. M.*

*Gualt. Test. t. 16. f. V.*

*Knor. Vergn. III. 12. t. 2. f.*

—— ——— VI. 20. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 328. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 1.*

β maculis rotundis inter characteres obsoletos. β mit runden matten Flecken zwischen den Bügen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 51.*

*Argenv. Conch. Suppl. t. 2. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 331. f.*

D. I. 4. *Cypraea Argus.* D. I. 4. Der doppelte Argus.

*Linn. S. N. Sp. 328.*

*Belg. De dubbelde Argus. Angl. The Argus Shell. Hill. Gall. Le grand Argus. Dav.*

Testa turbinata, subcylindrica, supra adpersa ocellis, subtus maculis quatuor fuscis. Die spiewirblige Schale ist walzenförmig, oben mit ausgenähnlichen Ringen, und unten mit vier braunen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 54.*

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 263.*

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 97. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 38. f. D.*

*Gualt. Test. t. 16. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. D.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 57. f.*

*Knor. Vergn. III. 11. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 285. 286. f.*

D. I. 5. *Cypraea testudinaria.*

D. I. 5. Die Schildkrötenporzellane.

*Linn. Syst. N. Sp. 329.*

Belg. Schilpad - hoorn. Angl. Great tourtle Gowry. *Petiv Gall. Le Lièvre. Dav.*

*Testa subcylindrica, pallida fuscomaculata, extremitatibus depressis.* Die einigermaßen walzenförmige Schale ist weißlich, und braungefleckt, an den Enden plattgedrückt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 36.*

*Rumph. amb. t. 38. f. C.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 7.*

*Knor. Vergn. IV. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 271. 272. f.*

D. I.



D. I. 6. *Cypraea sterco-*  
*raria*,

D. I. 6. Das Weitz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 320.*

*Belg. Wyd - Oog.*

*Testa subturbinata, livido*  
*testaceoque maculata, utrin-*  
*que marginata, subtus plana.*

Die einigermaßen spizwirts-  
lige Schale ist blaulich grau,  
mit ziegelfarbigen Flecken bei-  
derseits eingesäumt, und unten  
flach.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 15. f. S. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. I. A.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

α *pallida griseoque maculata, tu-*  
*berculo laterali mammillari.*

α *bläß und grau gefleckt, mit einer*  
*warzenförmigen Erhöhung an*  
*einer Seite.*

β *glauco griseoque maculata ;*

β *faßl und grau gefleckt.*

γ *cerea unicolor, tuberculo laterali*  
*mammillari.*

γ *wachsweiß, einfarbig, mit einer*  
*warzenförmigen Erhöhung an ei-*  
*ner Seite.*

D. I. 7. *Cypraea Car-*  
*neola.*

D. I. 7. Der Fuchs.

*Linn. S. N. Sp. 331.*

*Belg.*



Belg. De roode Mol. Angl. Buff Gowry. Petiv. Gall. Taupe rousse.

Testa subturbinata pallida, Die blaße Schale hat eine  
fasciis incarnatis. etwas hervortretende Wirbel-  
spitze, und fleischfarbige Quer-  
bänder.

α ore violaceo.

α mit violetter Mündung.

β ore albido, labio exterioro vix β mit weißer Mündung, und un-  
dentato. deutlich gezählter Lefze.

Rumph. amb. t. 38. f. K.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 17. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 287. 288. f.

Mus. Caes. Vindobon.

D.I. 8. Cypraea Zebra. D.I. 8. Der graue Maul-  
wurf.

Linn. S. N. Sp. 332.

Belg. De grave Mol.

Testa turbinata cinerea, Die bleisfarbige Schale hat  
fasciis latis griseis, aperturæ eine hervorragende Spitze, brei-  
denticulis fuscis. te graue Querbänder, und an  
der Mündung braune Zähne.

L

B-man.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 266.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 15.*

*Seb. Thes. III. t. 76. f. 5, 15.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. G.*

*Knor. Vergn. II. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 256 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 9. *Cypraea Talpa.*      D. I. 9. Der Maulwurf.

*Linn. S. N. Sp. 333.*

*Belg. Mol. Angl. The yellow zoned Porcellane Hill. Gall. La Taupe. Dav.*

*Testa turbinata subcylindrica testacea, fasciis albidis, basi incrassata atro fusca.*      Die braunlichgelbe walzenförmige Schale hat eine hervorstehende Wirbelspitze, blaße Querbänder, und einen aufgeschwellenen schwarzbraunen Boden.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 38. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. I.*

*Gualt. Test. t. 16. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. H.*

*Regenf. Samml. I. 10: t. 37. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

Knor.





*Knor. Verg. I. 27. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 273, 274. f.*

D. I. 10. *Cypraea lurida.* D. I. 10. Die Maus.

*Linn. S. N. Sp. 335.*

*Belg. De Muis. Gall. La Souris. Dav.*

Testa turbinata, obsolete Die spizwirblige Schale  
fasciata, extremitatibus nigro hat matte Querbänder, an den  
bimaculatis, basi alba, Enden zwei schwarze Flecken  
und einen weißen Boden.

*Liszt. Hist. Conch. t. 4. f. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 13. f. E. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. C.*

*Adans. Seneg. t. 5. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 315. f.*

D. I. 11. *Cypraea lota.* D. I. 11. Die Milch-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 337.*

Testa subturbinata, utrin- Die einigermaßen spizwirb-  
que marginata, denticulis aper- lige Schale ist beiderseits ein-  
turae acutis. gesäumet, und an der Mün-  
dung mit spizen Zähnen versehen.



*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 322. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. I. 12. *Cypraea fragilis.*

D. I. 12. Die Dün-  
schale.

*Linn. S. N. Sp. 338.*

*Belg. Turke Papier Porcelain - Hoorn. Gall. Porcellaine marbrée.*

Testa turbinata, ouata, glauca, picta maculis angulatis pal-  
lidis.

Die spizwirblige enförmige  
fahle Schale ist mit blaßen ecki-  
gen Flecken bezeichnet.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 16. f. Q.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. II. Obtusae, seu absque Spira  
manifesta.

D. II. Stumpfwirblige, oder mit  
undeutlicher Wirbelspize.

D. II. 1. *Cypraea Caput serpentis.*

D. II. 1. Der Moh-  
renbauch.

*Linn. S. N. Sp. 339.*

*Belg. Klene Slange Kop. Angl. Smal Snake Gowry. Pet. Gall. La  
petite tete de Serpent.*

Testa obtusa, triquetra gib-  
ba, dorso albo maculato, la-  
bris albis.

Die stumpfwirblige dreys-  
seitig höckerige Schale ist auf  
dem Rücken weißgesteckt, an  
den Lippen ganz weiß.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 50.*

*Rumph. amb. t. 38. f. F.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 7.*

— *Gaz. t. 96. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 15. f. O.*

*Adans. Seneg. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 316. f.*

D. II. 2. *Cypraea mauritiana.*

D. II. 2. Der große  
Schlangenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 340.*

*Belg. Slange Kop Rumph. Angl. Great turtle Leopard. Pet. Gall. Tete de Serpent. Dav.*

Testa obtusa plano convexa, dorso gibbo pallide maculato, basi nigricante.

Die stumpfwirblige, unten flache, oben erhabene Schale hat einen höckerigen blaß gefleckten Rücken, und schwärzlichen Boden.

α dorso fusco pallide maculato; lateribus fuscis.

α mit braunen blaßgefleckten Rücken, und braunen Seiten.

β dorso griseo albido maculato, lateribus lividis.

β mit lichtgrauen weißgefleckten Rücken, und blaulich grauen Seiten.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 52.*

*Petiv. Gaz. I. t. 96. f. 8.*

*Rumph. amb. t. 38. f. E.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 1, 2. f.*

— — II. 27. t. 5. f.

*Mart. Kouch, Kab. I. 30. t. 317. f.*

D. II. 3. *Cypraea Vi-*  
tellus.

D. II. 3. Die Salzform  
Porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 341.*

*Belg. Zout - Koreltje ; Angl. Salt - speckled Gowry Petiv. Gall.*  
*La Grelée.*

Testa obtusa, livida, albido  
maculata,

Die stumpfwirblige Schale  
ist blaulichgrau, mit weißen Fle-  
cken.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 254.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 23.*

*Petiv. Gaz. I. t. 80. f. 2.*

*Rumph. amb. t. 38. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 3. f.*

*Mart. Konch, Kab. I. 23. t. 238. f.*

D. II. 4. *Cypraea Mus.*

D. II. 4. Die Kröte.

*Linn. S. N. Sp. 342.*

*Belg.*



*Belg.* Cartageense Wit-rugge. *Angl.* Carthagera Cowry *Petiv.*  
*Gall.* Le Crapaud *Dav.*

*Testa* obtusa, gibba, cinerea, *Die stumpfwirblige höckeri-*  
*fascia* longitudinali nigro ma- *ge Schale* ist von aschengrauer  
*culata.* *Farbe*, mit einem nach der  
 Länge laufenden schwarzgefleck-  
 ten Bände.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 9. f. 2.

*Rumph. amb. t.* 39. f. 8.

*Petiv. amb. t.* 16. f. 4.

*Argenr. Conch. Pl.* 18. f. E.

*Seb. Thes. III.* t. 76. f. 33, 34.

*Knor. Vergn. III.* 12. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. I.* 23. t. 222. 223. f.

D. II. 5. *Cypraea* Ti-  
 gris.

D. II. 5. Die Tigere  
 porzellane.

*Linn. S. N. Sp.* 343.

*Belg.* Getygerde Kliphooorn *Angl.* The great Leopard *Pet. Gall.*  
*La Peau de Tigre. Dav.*

*Testa* obtusa, antice rotun- *Die stumpfwirblige vorne*  
*data*, dorso maculato, basi *rundliche Schale* ist auf dem  
*niuea.* Rücken gefleckt, am Boden  
 schneeweiß.

α *linea* longitudinali nulla.

α ohne Linie über die Länge des  
 Rückens.



β linea longitudinali dorsali az-  
uo rubente.

β mit einer nach der Länge des  
Rückens laufenden gelbrothen  
Linie.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 38. f. A.*

*Petiv. Gaz. t. 96. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. G, H, I, L.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 232. 236. f.*

**D. II. 6. Cypraea Lynx. D. II. 6. Die Masern-**  
**Porzellane.**

*Linn. S. N. Sp. 344.*

*Belg. Mazelen. Rumph. Angl. Thick Saffron - tooth' dGowry. Pet.*  
*Gall. La Truitée. Dav.*

**Testa obtusa maculis fuscis, Die stumpfwirblice brauns**  
**linea longitudinali fulva, ore gefleckte Schale hat nach der**  
**rufo. Länge des Rückens einen roth-**  
**gelben Strich, und eine brauns**  
**rothe Mündung.**

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 38. f. O, P.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 14. f. C, D.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 6, 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. 29. t. 303, 304. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**D. II. 7.**



D. II. 7. *Cypraea Isabella*.

D. II. 7. Die Isabelle.

*Linn. S. N. Sp. 293.*

*Belg. Isabelle, Rumph. Angl. Isabella Gowry Pet. Gall. L' Isabelle. Dav.*

*Testa obtusa subcylindrica, extremitatibus croceis.*

Die stumpfwirblige einigermaßen walzenförmige Schale hat safranrothe Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 4.*

*Rumph. amb. t. 39. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 16.*

— *amb. t. 16. f. 16.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. P.*

*Knor. Vergn. IV. 9. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 27. t. 275. f.*

D. II. 8. *Cypraea cylindrica*.

D. II. 8. Die Walzenporzellane.

*Testa obtusa cylindrica, vertice complanato, extremitatibus fusco bimaclatis.*

Die stumpfwirblige walzenförmige Schale ist an dem Wirbel plattgedrückt, an den Endspitzen mit zween braunen Flecken gezeichnet.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa cylindrica, spira complanata. Dorsum pallide amethystinum; Latera maculis raris fulvis. Extremitates utrinque marginatae bimaculatae. Rima inaequalis. Dentes labii extimi remotiores. Basis niuca.

Die Schale ist walzenförmig. Die Wirbelspiße plattgedrückt. Der Rücken von bläßer Amethystfarbe. Die Seiten sind beiderseits eingesäumt, und mit braunlichen zerstreuten Flecken, die Endspitzen aber mit zweien braunen Flecken gezeichnet. Die Spalte der Mündung ist ungleich. Die Zähne der äußeren Lefze stehen etwas mehr von einander entfernt. Der Grund ist schneeweiß.

D. III. Umbilicatae.

D. III. Mit nabelförmig eingedrücktem Wirbel.

D. III. 1. Cypraea Hirundo.

D. III. 1. Die Schwalbe.

Linn. S. N. Sp. 350.

Belg. Het blaevue Katje.

Testa umbilicata subcylindrica, extremitatibus fusco bimaculatis.

Die nabelförmig eingedrückte walzenförmige Schale hat an den Enden zweien braune Flecken.

Litt. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 30. f. 3.

Mus. Caes. Vindobon.

D. III. 2. Cypraea Asellus.

D. III. 2. Das Eselchen.

Linn. S. N. Sp. 351.

Belg.





Belg. Ezeltje. Rumph. Angl. Ass Gowry. Pet. Gall. Le petit Ane.  
Ar. env.

Testa umbilicata albida, Die nabelförmig eingedrückt-  
fasciis dorsalibus tribus fuscis, te weißliche Schale hat drey  
braune Querbänder.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 21.

Rumph. amb. t. 39. f. M.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 11.

— amb. t. 16. f. 18.

Argenv. Conch. Pl. 18. f. T.

Adams. Seneg. Pl. 5. f. H.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. IV. 25. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 27. t. 280 f.

D. III. 3. Cypraea Er-  
rones.

D. III. 3. Das Ba-  
starddrachenhöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 352.

Belg. Poolische Muts. Angl. Freckled Olive Gowry Petiv. Gall.  
Le Bonnet polonois.

Testa umbilicata oblonga, Die nabelförmig eingedrückt-  
fauce violacea, macula dor- te längliche nebelichte Schale  
sali testacea. hat einen violeten Mund, und  
einen braun grauen Fleck auf  
dem Rücken.

Petiv.



*Pesiv. Gaz. t. 97. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 294. 295. f.*

D. IV. Marginatae.

D. IV. Eingefäumte.

D. IV. 1. *Cypraea cri-*  
*braria.*

D. IV. 1. Das Argus  
Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 353.*

*Belg.* Het Klene Wyfje van den Argus. *Angl.* The little Wife of the Argus. *Gall.* Le petit Argus *Argenv.*

<p>Testa umbilicata oblonga lutea, maculis rotundatis al- bis, basi emarginata alba.</p>	<p>Die nabelförmig eingedrückt- te, längliche, gelbliche Scha- le, ist mit runden Flecken besetzt, und mit einem einge- säumten Boden versehen.</p>
--	---

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 9. f. 42.*

*Pesiv. Gaz. t. 8. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 39. f. R.*

*Argenv. Test. t. 18. f. X.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 74. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 336. f.*

D. IV. 2. *Cypraea*  
*Monera.*

D. IV. 2. Die guineis-  
sche Münze.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 354.*

*Belg.* Gemeene geele Kauris. *Angl.* Black moors Thooth. *Petiv. Gall.* Monnoye de Guinée.

Testa marginata albida, lateribus nodolis. Die eingefäumte weißliche Schale hat knotige Seitenränder.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 233.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 59.*

*Rumph amb. t. 39. f. C.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 14.*

—— *Gaz. t. 97. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 14. f. 4, 5.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. K.*

*Knor. Vergn. IV. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 337. 338. f.*

D. IV. 3. *Cypraea Anulus.* D. IV. 3. Der Ring.

*Linn. S. N. Sp. 355.*

*Belg.* Blauwe Kauris. *Gall.* La Colique. *Dav.*

Testa marginata, annulo flavo discum dorso ambiente. Der Mittelrücken der eingefäumten Schale ist mit einem gelben Ringe eingefast.

*Petiv.*



*Rumph. amb. t. 39. f. D.*

*Petiv. Gaz. t. 6. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 4. f.; 16. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 11.*

*Mart. Konch. Konch I, 24. t. 239. 240. f.*

D. IV. 4. *Cypraea caurica.*

D. IV. 4. Die gefleckte Cauris.

*Linn. S. N. Sp. 356.*

*Belg. Pockjes. Rumph. Angl. Long Massle Gowry. Petiv. Gall. La peau d'Ane. Dav.*

Testa dorso luteo alboque nebuloso, margine inaequali albido, fusco punctato. Der Rücken ist gelb und weiß nebelicht, der Rand ungleich, weißlich mit braunen Punkten.

*Rumph. amb. 38t. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 15. f. X.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 13.*

*Mart. Konch. Kab, I, 29. t. 301. 302. f.*

C. IV. 5. *Cypraea Draena.*

D. IV. 5. Das Drachenhaupt.

*Belg.*



Belg. Draackje. Angl. Dragon Gowry. Pet. Gall. Tete de Dragon.

Testa derofo marginata, lateribus albis fusco maculatis; dorso luteo nebuloso, macula media testacea.

Die Schale hat einen gleichsam zernagten Saum, die weißen Seiten sind braun gefleckt, der Rücken gelb, neblicht, mit einem braunen grauen Flecke in der Mitte.

Petiv. amb. t. 16. f. 10.

Mart. Konch. Kab. I. 28. t. 292. 293. f. ?

Mus. Caes. Vindobon.

Testa oblongo ouata. Vertex umbilicatus retusus. Dorsum carinis duabus transuersis obsoletis. Latera emarginata, margine incrassato eroto. Dentes latitudinem labii extimi occupantes. Color dorsi luteo nebulosus; Latera alba punctis fuscis dispersis maculata. Basis alba.

Die Schale ist länglicht eysförmig. Der Wirbel ist mit einem stumpfen nabelförmigen Eindruck, der Rücken mit zweien stumpfen Schnitten der Quere nach besetzt. Die Seiten sind eingesäumt, der Saum aufgeworfen, und gleichsam zernagt. Die Zähne erstrecken sich über die ganze Breite der äußeren Lefze. Der Rücken ist von gelber neblichter Farbe. Die Seiten sind weiß, mit zerstreuten braunen Punkten. Der Boden ganz weiß.

D. IV. 6. Cypraea erosa.

D. IV. 6. Das Weißaug.

Linn. S. N. Sp. 357.

Belg. Witogje. Rumph. Angl. Whis-eyed Gowry Petiv. Gall. Pointillage blanc.

Testa



Testa crenato marginata, Die weiß punktirte Schale  
albo punctata, lateribus ma- hat einen gekerbten Saum, und  
cula fuscente. an jeder Seite einen braunli-  
chen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 39.*

*Petiv. Gaz. I. t. 97. f. 19.*

— amb. t. 16. f. 12.

*Rumph. amb. t. 39. f. A.*

*Gualt. Test. t. 15. f. H.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 320, 321. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 7. *Cypraea fla-*  
*ueola.*

D. IV. 7. Der Brand-  
fleck.

*Linn. S. N. Sp. 358.*

*Belg. Brand - vlakje.*

Testa derosa, lutea albo- Die gelb und weiß neblichte  
que nebulosa, lateribus ful- Schale hat einen zernagten  
uis. Rand, und braunrothe Seiten.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 14. f. E.*

*Mart. Konch. Kab. I. 26. t. 267, 268. f.*

D. IV. 8.



D. IV. 8. *Cypraea spur-*  
ga.

D. IV. 8. Der Gelb-  
schmuz.

*Linn. S. N. Sp. 359.*

*Belg. Geelsmetje.*

Testa subemarginata, spira  
plana orbiculari, labio exter-  
no vix dentato.

Die etwas eingesäumte Scha-  
le hat einen flachen runden Wir-  
bel, und an dem äußeren Ran-  
de kaum deutliche Zähnen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 9. *Cypraea sto-*  
lida.

D. IV. 9. Das Rost-  
flecken.

*Linn. S. N. Sp. 360.*

*Belg. Het Soostolakje. Angl. The Beetle Porcellane. Hill.*

Testa marginata pallida, ma-  
culis quadrangularibus testa-  
reis.

Die eingesäumte weißliche  
Schale ist mit rostfarbigen vier-  
eckigen Flecken bemalt.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 18.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. 1.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 305. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 10. *Cypraea*  
*heluola*.

D. IV. 10. Die Stern-  
porzellane.

*Linn. S. N. Sp. 361.*

*Belg.* Sterretje. *Angl.* Star Gowry *Petiv.* Gall. Porcellaine e toilé. *Dav.*

Testa crenato marginata, Die höckerige weißpunktirte  
gibba, albo punctata, sub- und unten rothbraune Schale,  
tus ruffa. hat einen zernagten Saum.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 39. f. B.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 17.*

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 326. 327. f.*

D. IV. 11. *Cypraea*  
*ocellata*.

D. IV. 11. Das Schwarz-  
aug.

*Linn. S. N. Sp. 362.*

Testa subemarginata, ocellis Die einigermaßen eingesäum-  
nigris inter annulos pallidos. te Schale hat schwarze mit blaß-  
gelben Ringen eingefasste Augen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 9. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. I. 31. t. 333. 334. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 12.





D. IV. 12. *Cypraea*  
poraria.

D. IV. 12. Die Frie-  
selporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 363.*

Testa marginata, ocellis  
albis, annulo fusco cinctis;  
basi amethystina.

Die eingesäumte Schale hat  
weiße mit Ringen eingefasste  
Augen, und einen amethyst-  
farbigen Boden.

*Mart. Konch. Kab. I. 30. t. 324. 325.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 13. *Cypraea* Pe-  
diculus.

D. IV. 13. Die Laus.

*Linn. S. N. Sp. 364.*

*Belg. Zee Vloog Rumph. Angl. Louse Gowry Petiv. Gall. Pou  
de Mer. Argenv.*

Testa marginata subglobosa,  
striis eleuatis transuersis, in  
rimam usque protensis.

Die eingesäumte fast kugel-  
förmige Schale ist mit erhabes-  
nen Duerstreifen besetzt, die  
sich bis zur Spalte erstrecken.

α sulco dorfi longitudinali.

α mit einer Furche nach der Länge  
des Rückens.

β sulco dorfi longitudinali nullo.

β ohne Furche nach der Länge des  
Rückens.

*List. angl. t. 3. f. 17.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 56, 57.*



*Rumph. amb. t. 39. f. P.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 22.*

*Gualt. Test. t. 14. f. P. t. 15. f. P, R.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. L.*

*Adans. Seneg. Pl. 5. f. 3.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 310, 311. f.*

D. IV. 14. *Cypraea*  
Nucleus.

D. IV. 14. Die Reiss-  
fornporzellane.

*Linn. S. N. Sp. 365.*

*Belg. De Rys Korrel. Angl. The Rice Gowry Petiv. Gall. La petite Verole. Dav.*

Testa utrinque marginata,  
fulcis tuberculisque exaspera-  
ta,

Die beiderseits eingesäumte  
Schale ist mit Furchen, und  
Körnchen besetzt.

\* alba (major) subrostrata.

\* weiß (und größer) mit schnau-  
zenförmigen Endspitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 58.*

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 12.*

— amb. t. 16. f. 11.

*Rumph. amb. t. 39. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 14. f. S.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 22.*

*Knor. Vergn. IV. 17. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 29. t. 312. f.*

utrinque obtusa, punctis eleuatis annulo ferrugineo cinctis (minor). β an beiden Enden stumpf (und kleiner) die erhabenen Körner sind mit rostfarbigen Ringen eingefaßt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

D. IV. 15. Cypraea D. IV. 15. Die Affel.  
staphylaea.

*Linn. S. N. Sp. 366.*

*Belg. Pisseped. Gall La Cloporte. Argenv.*

Testa punctis eleuatis, sine striis, extremitatibus luteis. Die Schale ist mit erhabenen Körnern besetzt, ohne Streifen, und an den Endspitzen gelb.

*Gualt. Test. t. 14. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. S.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. t. 29. f. 313. 314. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



D. IV. 16. *Cypraea* D. IV. 16. Das Korn-  
*Cicercula*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp.* 367.

*Belg.* Korelye Knoopje. *Rumph. Angl.* Wart Gowry. *Petiv.*

Testa utrinque rostrata, ad-  
 sperla punctis eleuatis.

Die an beiden Enden schnau-  
 zenförmige Schale ist mit er-  
 habenen Punkten besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 62.*

*Rumph. amb. t. 39. f. K.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. I. 24. t. 243. 244. f.*

D. IV. 17. *Cypraea* D. IV. 17. Das glatte  
*Globulus*, Knöpfchen.

*Linn. S. N. Sp.* 368.

*Belg.* Paerltje. *Rumph. Angl.* Pearl Gowry. *Petiv.*

Testa laeui, utrinque rostra-  
 ta.

Die Schale ist glatt und an  
 beiden Enden schnauzenför-  
 mig.

*Petiv. Gaz. t. 97. f. 4.*

— *amb. t. 16. f. 19.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 39. f. L, N.*

*Gualt. Test. t. 14. f. M.*

*Knor. Vergn. VI. 21. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I, 24. t. 242. f.*

*Murray. Fund. Test. t. I. f. 12.*

## E. Bulla.

## E. Die Blasenschnecke.

*Linn. S. N. Gen. 322.*

Testa conuoluta laevis; Die Schale ist zusammen-  
Apertura subcoarctata ob- gerollet und glatt; ihre  
longa; Columella obli- Mündung, welche der Län-  
qua edulenta, ge nach herabläuft, mei-  
stens nur an einem Ende  
ausgeschnitten; die Spin-  
del schief und ohne Zähne.

## E. I. Bulla Onum.

## E. I. Das Ey.

*Linn. S. N. Sp. 369.*

*Belg. Porselein - hoorn. Rumph. Angl. White Egg - Gowry. Petiv. Gall. L'oeuf. Dav.*

Testa ouata, obtuse biro- Die eysförmige Schale ist  
stri, labro exteriori denta- an beiden Enden mit einer  
to. stumpfen Schnauze versehen,  
an der äußeren Kefze gezähnt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 252.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 65.*

*Rumph. amb. t. 38. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 8. f. 6.*

— *Gaz. t. 97. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 15. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 76. f. 6, 10.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 205. 206. f.*

E. 2. *Bulla birostris.*

E. 2. Der kleine We-  
berspuhl.

*Linn. Syst. N. Sp. 371.*

Belg. Bastert Wewers - Spoeltje. *Gall. Petite Navette.*

Testa oblonga, margine in-  
crassato, angulato, rostris elon-  
gatis laevibus.

Die längliche Schale hat  
einen aufgeschwollen eckigen  
Rand, und glatte schnabelför-  
mige Endespitzen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 66.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 217. f.*

E. 3. *Bulla Spelta.*

E. 3. Das Joch.

*Linn. S. N. Sp. 372.*

Belg.



Belg. Jockje. Angl. Smal Leghorn Gōwrikin. Pet.

Testa oblonga utrinque ob- Die längliche Schale hat  
tusiuscula, labro arcuato in- etwas stumpfe Endespitzen, und  
crassato. eine gebogene verdickte Lefze.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 68.

Petiv. Gaz. t. 66. f. 2, 3.

Gualt. Test. t. 15. f. 4.

Ginan. adr. II. t 13. f. 95.

Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 215. 216. f.

E. 4. Bulla verrucosa. E. 4. Der Hochrücken.

Linn. S. N. Sp. 373.

Belg. Witte Jamboeze; Rumph. Angl. White Nipple Gowry - Kín.  
Petiv. Gall. La Bossue. Dav.

Testa gibbosa transuersim Die höckerige Schale hat  
carinata, extremitatibus gra- einen eckigen Quervulst, und  
no rotundo adnato. an jedem Ende ein rundes an-  
gewachsenes Knöpfchen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 67.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 22.

— amb. t. 16. f. 23.

Rumph. amb. t. 38. f. H.

Gualt. Test. t. 16. f. F.

M 5

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 18. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 17.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 23. t. 220, 221.*

E. 5. *Bulla gibbosa.*

E. 5. Der Wulst.

*Linn. S. N. Sp. 374.*

*Belg. Hoogruggetje. Gall. La petite bouche.*

Testa subcylindrica, angu- Die einigermaßen walzen-  
lo dorsali elevato transverso. förmige Schale führt auf den  
Rücken einen in die Quere lie-  
genden erhabenen Gürtel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 249. 339.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 64.*

*Petiv. Gaz. t. 15. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 15. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 18. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 18.*

*Knor. Vergn. I. 14. t. 3, 4. f.*

—— — VI. 32. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 211. 212. f.*

E. 6. *Bulla Naucum.*

E. 6. Das Taubeney.

*Linn. S. N. Sp. 375.*

*Belg.*





Belg. Witte Kievits - Ey. Valent. Gall. La Bulle d'eau. Dav.

Testa rotundata subpellucida, transuersim striata, utrinque umbilicata, Die rundliche halbdurchsichtige Schale ist in die Quere gestreift, und an beiden Enden mit einem Nabelloche versehen.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 4.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 73.

Rumph. amb. t. 27. f. H.

Gualt. Test. t. 13. f. G. G.

Argenv. Conch. Pl. 17. f. Q.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 45.

Knor. Vergn. VI. 38. t. 2, 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 22. t. 200. f.

E. 7. Bulla aperta.

E. 7. Die offene Blase.

Linn. S. N. Sp. 376.

Testa subrotunda pellucida, apertura patentissima, Die rundliche durchsichtige Schale hat eine ganz erweiterte offene Mündung.

Gualt. Test. t. 13. f. EE.

Mus. Caes. Vindobon.

E. 8. Bulla Ampulla.

E. 8. Das Kiebigen.

Linn. S. N. Sp. 378.

Belg.



Belg. Kievits - Ey. Angl. The Indian Dipper. Pet. Gall. La  
Muscade Dav.

Testa rotundata opaca, ver-  
tice umbilicato.

Die rundliche undurchsichti-  
ge Schale hat einen nabelför-  
mig eingedrückten Wirbel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 3.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 12.

Petiv. Gaz. t. 50. f. 13. t. 99. f. 14.

Rumph. amb. t. 27. f. G.

Gualt. Test. t. 12. f. E — F.

Adans. Seneg. Pl. 1. f. 2.

Seb. Thes. III. t. 38. f. 34 — 44.

Regenf. Samml. I. 5. t. 58. f. 8. t. 21. f.

Knor. Vergn. II. 8. t. 1. f.

—— — V. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 188. f. 22. t. 202-204f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 4, 5.

E. 9. Bulla lignaria.

E. 9. Die Papierrolle.

Linn. S. N. Sp. 379.

Belg. Opgerollde Papier. Gall. 1' Oublie. Dav.

Testa obouato oblonga  
transuersim striata, vertice  
umbilicato.

Die verkehrt ensförmige läng-  
liche Schale ist in die Quere  
gestreift, und mit einem ge-  
nabelten Wirbel versehen.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 71.*

*Knor. Vergn. VI. 37. t. 1, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 194 195. f.*

E. 10. *Bulla Physis.*

E. 10. Die Staaten-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 380.*

*Belg. Staate Vlaggetje. Valent. Gall. Gondole rayée. Argenv,*

Testa ovato oblonga, picta  
lineis transuersis undulatis,  
spira horizontali.

Die eysförmige längliche  
Schale ist in die Quere mit  
wellenförmigen Linien bemalt,  
und mit einem wagrechten  
Schnickel versehen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 9. f. 75.*

*Bonan. Mus. Kirch, cl. 3. f. 403.*

*Valent. Abb. t. 2. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 13. f. F. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 46 — 50.*

*Murray. Fund. Test. t. 1. f. 9.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 196. 197. f.*

E. 11. *Bulla Amplu-*  
stre.

E. 11. Das rothe Band.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 381.*

*Belg. Rood - bandje.*

*Testa subglobosa albida, Die einigermaßen kugelför-*  
*cingulis transuersis fuscis, mige weißliche Schale hat brau-*  
*spira obtusa. ne Quergürteln, und einen*  
*stumpfen Schnirkel.*

*Mart. Konch. Kab. I. 21. t. 198. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

**E. 12. Bulla Ficus.**

**E. 12. Die Feige.**

*Linn. S. N. Sp. 382.*

*Belg. Spaansche Vyg. Rumph. Angl. Fig - whelk. Pet. Gall, La*  
*Figue.*

*Testa obouato clauata, re- Die verkehrt kegelförmige,*  
*ticulato striata, rostro exser- kaulähnliche und nezförmig ge-*  
*to, spira oblitterata. streifte Schale hat einen ver-*  
*längerten Schnabel, und un-*  
*deutlichen Schnirkel.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 15.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 46.*

*Rumph. amb. t. 27. f. K.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. 7. M.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 17. f. 0.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 93.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 4. f.*

—— ——— III. 23. t. 1. f.

—— *Delic. nat. I. t. B. II. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. III. 66. t. 734. f.*

E. 13. Bulla Rapa.

E. 13. Die Rube.

*Linn. S. N. Sp. 383.*

*Belg. Knollhoorn. Rumph. Angl. Round Partridge. Petiv Gall.*  
*Le Radix. Dav. Ital. Il Radiccio.*

Testa rotundato turbinata, Die runde birnförmige Scha-  
spira exserta, rostro incurua- le hat einen hervorragenden  
to. Schnickel, und umgedrehten  
Schnabel.

*Rumph. amb. t. 27. f. F.*

*Petiv amb. t. 9. f. 8.*

*Valent. Abb. 9. t. 82. f.*

*Gualt. Test. t. 26. f. H.*

*Argenv. Conch Pl. 17. f. K.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 4. f. 80.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 13 - 16. 18 - 20, 22, 23,*

—— t. 68. f. 7, 8.

*Knor.*



*Knor. Vergn. I. 19. t. 5. f.*

— *Del. nat. I. t. B. II f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 747-749. f.*

**E. 14. Bulla Terebellum. E. 14. Der glatte Böttchenbohrer.**

*Linn. S. N. Sp. 388.*

*Belg. Kuipers - Boor. Rumph. Angl. The speckled Augur - Peg. Petiv. Gall. La Tarriere. Dav.*

**Testa cylindrica, spira subulata, basi truncata.**

Die walzenförmige Schale hat einen zugespitzten Schnirkel, und eine abgestumpfte Grundspitze.

$\alpha$  alba, punctis dispersis minutissimis.

$\alpha$  weiß, mit sehr kleinen zerstreuten Punkten.

$\beta$  pallida, punctis maculisque nebulosis.

$\beta$  blaß, mit nebelichten Punkten und Flecken.

$\gamma$  pallida, lineis punctatis.

$\gamma$  blaß, mit punktirten Linien.

$\delta$  pallida, lineis obliquis angulatis.

$\delta$  blaß, mit schiefen Winkelzügen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 57.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 30. f. S.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 13. f. 24.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. G.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 9.*

*Knor. Vergn. II. 4. t. 4. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 568. 569. f.*

E. 15. *Bulla Cypraea.* E. 15. Die Porzellan-  
blase.

*Linn. S. N. Sp. 389.*

*Belg. Bruin gebandeerd Bakje ; Gall. Baquet bandé.*

*Testa ovato oblonga, spi-* Die eysförmige längliche  
*rae apice prominulo, colu-* Schale hat eine hervorragende  
*mella torta,* Wirbelspize, und eine gewun-  
dene Spindel.

*Knor. Vergn. VI. 4. t. 5. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

E. 16. *Bulla virginea.* E. 16. Die Prinzen-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 390.*

*Belg. Prince Vlag. Gall. Le Ruban. Dav,*

*Testa subturrita erecta, co-* Die einigermaßen gethürm-  
*lumellae basi truncata, cin-* te und aufrechte Schale ist an  
*gulis coloratis transuersis,* dem Grunde der Spindel ab-  
gestumpfet, und mit gefärbten  
Querbändern bemalt.

N

α fasciis



- α fasciis miniatis flavisque, lineis  
roseis & purpuraceis. α mit meningrothen und gelben  
Bändern; wie auch rosenrothen  
und purpurfarbigen Linien.
- β fasciis flavis & viridibus, lineis  
purpureis & violaceis. β mit gelben und grünen Bändern;  
wie auch purpurothen und vio-  
letten Linien.
- γ lineis fulvis, cum fasciis inter-  
ruptis, solum in anfractibus su-  
premis alternantibus. γ mit rothgelben Linien, die mit  
unterbrochenen Bändern auf den  
oberen Gewinden allein abwech-  
seln.
- δ tota alba, lineis miniatis prope  
futuras. δ ganz weiß, mit meningfarbigen  
Linien an den Näthen.
- ε fusca, anfractuum fascia media  
& utrinque saturali alba. ε braun, deren jedes Gewind in  
seiner Mitte, wie auch beider-  
seits an der Nath eine weiße Binde  
trägt.
- η alba, fasciis parallelis fuscis. η weiß, mit gleichweit abstehenden  
braunen Bändern.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 66.*

*Petiv. Gaz. t. 22. f. II. t. 151. f. I.*

*Gualt. Test. t. 6. f. A. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. N. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 116.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 62-74. t. 40. f. 38. 39.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 46. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 7. f.*

— — — V. 25. t. 4. f.

— — — Del. nat. I. t. B. II. f. 6.



E. 17. *Bulla achatina*.

E. 17. Die französische Schellenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 391.**Belg. Fransche Belhoorn.**Testa ouato oblonga, columellae basi truncata.*

Die eiförmige längliche Schale hat eine am Grunde abgestumpfte Spindel.

*α fasciis longitudinalibus undulatis latis, columella rubra,**α mit nach der Länge laufenden breiten Wellen, und rother Spindel.**Bonan. Recr. cl. 3. f. 192.**List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 34.**Petiv. Gaz. t. 44. f. 7.**Gualt. Test. t. 45. f. B.**Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 60.**Seb. Thes. III. t. 71. f. 1 — 3.**Knor. Vergn. IV. 24. t. I. f.**— Del. nat. I. t. B. V. f. I.**β fasciis longitudinalibus undulatis tenuibus, columella alba.**β mit nach der Länge laufenden schmalen Wellen, und weißer Spindel.**Seb. Thes. III. t. 71. f. 4, 5.**Knor. Verg. V. 12. t. 2. f.**Mus. Caes. Vindobon.**γ ponderosa, alba unicolor.**γ schwer, weiß, einfarbig.**Mus. Caes. Vindobon.*F. *Voluta*.

F. Die Faltenschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 322.*

N 2

Testa



Testa conuoluta, columella transuerse plicata.

Die zusammen gerollte Schale ist an ihrer Spindel mit Quersalten versehen.

F. I. Apertura coarctata.

F. I. Mit eingefasster Mündung.

F. I. I. Voluta Auris Midae.

F. I. I. Das Midasohr.

Linn. S. N. Sp. 392.

Belg. Midas - Oor. Rumph. Angl. Midas - Ear. Petiv. Gall. Oreille de Midas. Argenv.

Testa ouali oblonga, spira, basique rugulosa, columella bidentata.

Die eysförmige längliche Schale, ist an dem Wirbel und Grunde gerunzelt, an der Spindel mit zwei Falten versehen.

α nivea (major.)

α schneeweiß (größer.)

β fusca (minor.)

β braun (kleiner.)

Bonan. Mus. Kirch. cl. 3. f. 412.

Rumph. amb. t. 33. f. H.H.

Petiv. amb. t. 8. f. 2.

Gualt. Test. t. 55. f. G.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 122.

Seb. Tbes. III. t. 71. f. 21. 22.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 43. t. 436 — 438. f.

Testa



F. I. 2. Volura Auris  
Sileni.

Testa ouali gibba umbilicata, columellae plica unica crassa flexuosa.

F. I. 2. Das Langohr.

Die eysförmige höckerige Schale hat an der Spindel eine dicke gedrehte Falte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata gibba, laevis, longitudinaliter obsolete striata. Spira obtusa, ex anfractibus quatuor convexis, subito decrefcentibus, in verticem obtusum terminata. Apertura ouata coarctata. Labium exterius marginatum, interius tenue replicatum, & super columellam expansum, dente subtus oblique flexuoso, crasso. Basis perforata. Color badius, fasciis undularis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist eysförmig, und glatt, nach der Länge herab matt gestreift. Der Schnirkel besteht aus vier gewölbten geschwinde abnehmenden Windungen, die sich in eine stumpfe Spitze endigen. Die Mündung ist eysförmig, ganz eingeklappt. Die äußere Lefze ist eingeäumt, die innere dünne über die Spindel ausgebreitet, an welcher unten eine dicke schief gedrehte Falte liegt. Der Grund ist durchbohret. Die Farbe schwarzbraun, mit rothbraunen nach der Länge herablaufenden Wellen.

F. II. Cylindroidae effusae.

F. II. Einigermassen walzenförmige, mit ausgeschnittener Mündung.

F. II. 1. Voluta porphyria.

F. II. 1. Die Lagerwalze.

*Linn. S. N. Sp. 398.*

Belg. Porphyre Daadel. Oud. Angl. The Camp. Da Cost. Porphyre Argenv.

Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus acute marginatis, infimis planiusculis, columella incrassata oblique plicata.

Die walzenförmige glatte Schale hat scharfrandige Windungen, deren unterste etwas flach sind, mit einer dichten schief gefalteten Spindel.

Picta lineis angularis.

Mit eckigen Winkelzügen bemalt.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 142.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 11.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 24. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 1. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV f. 4.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 498. f.*

F. II. 2. *Voluta Oliua.* F. II. 2. *Die Olivenwalze.*

*Linn. S. N. Sp. 399.*

*Belg. Daadel. Angl. The Olive Shell. Hill. Gall. l'Olive. Day.*

*Testa subcylindrica laevi, spirae anfractibus planiusculis, extimo tumido reflexo; columella incrassata, oblique plicata.* Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat etwas flache Schnirkelgewinde, deren äußerstes aufgeworfen, und umgebogen ist; mit einer dichten schiefgefaltenen Spindel.

« *albida lineis undulatis, fasciisque reticulatis rufis.* » weiß mit rothbraunen wellenförmigen Linien, und netzartigen rothbraunen Querbändern.

*Mart.*



*Mart. Conch. Kab. II. 51. t. 561. f.*

♂ ex viridescenti reticulata, fasciis duabus transuersis nigris, columella crocea. ♂ mit grüntlichen Netzen, zwey schwarzen Querbändern, und einer safranfarbigen Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. c. 6. f. 28.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. M.*

*Mart. Conch. Kab. II. 48. t. 512. 513. f.*

γ ex coerulescente luteoque maculata, fasciis transuersis viridibus γ bläulich, und gelb gesteckt, mit grünen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 26.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. H. G.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 48. t. 511. f.*

δ olivacea, fasciis transuersis interruptis nigris. δ olivengrün, mit unterbrochenen schwarzen Querbändern.

*Belg. Prince- Begraafenis. Rumph. Angl. Prinse Stamper. Petiv. Gall. Drap mortuaire. Dav.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 25.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 4.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 1.*

*Valent. Abb. 8. t. 68. f.*



*Argenv. Conch. Pl. 13. f. S.*

*Seb. Tbes. III. t. 53. f. F. a.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 480. f.*

♂ lutescens, fasciis longitudinalibus ♂ gelblich, mit rothbraunen nach  
undulatis rufis. der Länge laufenden wellenförmigen Bändern.

*Mart. Konch. Kab. II. 47. t. 505. f.*

♂ alba, luteo fuscoque nebulosa, fa- ♂ weiß, mit gelben und braunen  
sciis duabus transuersis fuscis. Wolken, und zwey braunen  
Querbändern.

*Belg. Porphyristeene Daadel, Rumph. Angl. The purple Marble Date  
Gall. Olive satinée a bandes. Oud.*

Fauce rosea.

Mit rosenrothem Schlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 14.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 24. f. O.*

*Seb. Tbes. III. t. 53. f. A. — D.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 15. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 476, 477. f.*

♂ aurantia; fasciis obsoletis trans- ♂ orangenroth, mit violetten matten.  
uersis violaceis. Querbändern.

*Belg. Achaatje, Rumph. Gall. La Cornaline.*

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 495. f.*

9 aurantia, fascia media transuersa 9 orangenroth mit einem schneeweißen Querbande um die Mitte.

*Mus. Caes. Vindobon.*

8 pallide lutea, maculis adspersa, bläßgelb, mit bläulichen Flecken  
coeruleſcentibus, fauce violacea. beſetzt, und einem violeten Schlunde.

*Liſt. Hiſt. Conch. I. 4. f. 10. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 6.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 5.*

*Gualt. Teſt. t. 23. f. H, J, E.*

*Seb. Theſ. III. t. 53. f. W.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 493, 494. f.*

α brunna unicolor.

α braun einfärbig.

*Belg. Grauwve Munnik. Valent. Olive de Satin. Pet.*

*Seb. Theſ. III. t. 53. f. K.*

*Knor. Vergn. V. 27. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Konch II, 47. t. 501. f.*

*Da Coſt. Elem. Pl. 5. F. 7.*

λ ex fuſco nigra, unicolor.

λ ſchwarzbraun.

*Belg. Svarte Daadel. Rumph. Gall. La Moresque Dar.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 27.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 23. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. L.*

*Knor. Vergn. V. 28. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 45. t. 472, 473. f.*

F. II. 3. *Voluta gibbosa.* F. II. 3. Die dicke  
Schlauchdattel.

*Belg. Sluik - Daedel Mus. Oud. Angl. The clouded Olive. Hill.*  
*Gall. Agate bossue. Mus. Oud.*

Testa ovali ventricosa, co- Die eysförmige dickbäuchige  
lumella callosa, & spirac acu- Schale, hat eine schwüllige  
minatae anfractibus infimis in- Lesze, und aufgetriebene Un-  
crassatis. tergewinde an zugespizten  
Schnirkel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 24. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 13. f. M.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. II. 12. t. 4, 5. f.*

— — V. 4. t. 4. f.

*Mart.*





Mart. Konch. Kab. II. 51. t. 565. 566. f.

Testa ovata, oblonga, ponderosa, glabra. Spira acuminata. Anfractus fulco futurali distincti, infimi tumidi gibbi. Labium exterius integerrimum, acutum; interius reflexum, tumidum, callosum, supra incrassatum, subtus oblique fuscum, emarginatum. Venter extus brunneus, maculis oblongis, & fascia transversa albida. Faux alba.

Die Schale ist länglich eiförmig, schwer und glatt. Der Schnirkel zugespitzt. Die Windungen sind durch eine gefurchte Naht von einander abgesondert, deren untere aufgeschwollen und ungleich. Die äußere Lefze hat einen ganzen scharfen Rand die innere ist übergeschlagen, schwülig, und oben dick aufgeworfen, unten schief gefurchet, und eingesäumt. Der Leib ist außen braun, mit weißen länglichen Flecken und einem Quersbände. Der Schlund weiß.

F. II. 4. Voluta Ispidula.

F. II. 4. Die Spizdatstel.

Linn. S. N. Sp. 400.

Testa subcylindrica laevi, spira conica, suturis acutis, columella incrassata oblique plicata.

Die einigermaßen walzenförmige glatte Schale hat einen glatten kegelförmigen scharf randigen Schnirkel, und eine dicke schief gespaltene Spindel,

α albida, brunno maculata.

α weißlich, mit braunen Flecken.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. f. 12.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. Q.

Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 526. f.

β alba, maculis undatis fuscis.

β weiß, mit wellenförmigen braunen Flecken.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 23. f. M. 00.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. V.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 6. t.*

*Mart. Konch. Kab. II. 46. t. 487. 488. f.*

γ albida, maculis venisque fuscis. γ lang, mit braunen Flecken, und Adern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 39. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 553. f.*

δ niuea unicolor.

δ schneeweiß, einfarbig.

*Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.*

ε alba, maculis raris, & fascia ε weiß, mit seltenen Flecken, und prope spiram transuersa rufa. einem Querbande an dem Schnirfel von rothbrauner Farbe.

*Seb. Thes. III. t. 53. f. X.*

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 524, 525. f.*

ζ alba parva, undis fuscis tenuissimis. ζ weiß, mit sehr feinen braunen Wellen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 543. 544. f.*

η grisea



η grisea, parua, lineis angulatis vio- η lichtgrau klein mit violeten Wink-  
laceis. selzügen.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 10. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 152. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. II. 50. t. 545. 547. f.*

3 castanez.

3 Kastanienbraun.

1 fusca alboque maculata.

1 braun, und weiß gefleckt.

*Mart. Konch. Kab. II. 49. t. 537, 538. f.*

\* alba punctis luteis, maculisque \* weiß, mit gelben Punkten, brau-  
undatis fuscis, fauce violacea. nen Wellen, und einem violetter  
Echlunde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 10. f. 3.*

*Petiv. Gaz. t. 156. f. 18.*

*Rumph. amb. t. 98. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 23. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. II. 48. t. 518. 521. f.*

F. III. Ouatas, esufac.

F. III. Esförmige, mit ausgeschnit-  
tener Mündung.

F. III. 1. Voluta bul-  
lata.

F. III. 1. Die Blasen-  
walze.

Testa



Testa emarginata, ouata, Die eingesäumte enförmige  
laeui, spira oblitterata, com- glatte Schale hat einen stum-  
planata, columella quadripli- pfen plattgedrückten Wirbel,  
cata. und drey Falten an der Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. II.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. I. f. 27. t. I. f.*

Testa ouata laeuis. Spira oblitterata, complanata. Apertura lanceolata, extremitatibus subefusis. Columella conuexa glabra, subtrus plicata, plicis crassis, obliquis, quatuor. Labrum obtusum extrorsum reflexum, incrassatum. Basis infra plicas oblique marginata. Color pallide rubescens, fasciis transuersis obsoletis albis.

Die Schale ist enförmig, und glatt. Der Schnirkel stumpf, und plattgedrückt. Die Mündung lanzettförmig. Die Ende mit unvollkommenen Auschnitten. Die erhabene glatte Spindel hat unten vier schief stehende dichte Falten. Die äußere Lefze ist stumpf, auswärts überschlagen, und aufgeworfen. Der Grund hat unter den Falten einen schiefen Saum. Die Farbe ist blasroth mit matten weißen Querbändern.

F. III. 2. Voluta Perficula.

F. III. 2. Die Kornel-  
firsche.

*Linn. S. N. Sp. 404.*

Testa emarginata laeui, spiram retuso umbilicata, columella septem plicata, labro marginato crenato.

Die eingesäumte glatte Schale ist mit einem stumpfen genabelten Schnirkel, und an der Spindel mit sieben Falten versehen; an der äußern Lefze eingesäumt und gefurct.

α lineis transuersis fuluis cincta.

α mit rothgelben Querstreichen.

*Belg. Gebandeerde Kornelstje. Gall. La Cornouille fasciée.*

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 28. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 4. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI, 21. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 419. 420. f.*

A punctis adspersa incarnatis.

ß mit fleischrothen Punkten gezeichnet.

Belg. Gestoppelte Kornelkersje. Gall. La Cornouille ponctuée.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 28. f. C, D, E.*

*Mart. Konch. Kab. II, 42. t. 421. f.*

F. III. 3. *Voluta marginata.*

F. III. 3. Die eingesäumte Kornelkirsche.

Testa ovata, spira obsoleta, lateribus incrassato marginatis, columella quadriplicata.

Die eysförmige Schale hat einen unvollkommenen Schnirkel, aufgeworfene eingesäumte Seiten, und vier Falten an der Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa ovata, laevis; Spira turbinate, adnata labro incrassato; Latera cincta margine lato, tumido. Columella plicata. plicis cratlis obliquis quatuor. Apertura lanceolata, extremitatibus effusis. Color niueus.

Die Schale ist eiförmig, und glatt. Der Schnirkel zugespitzt, und mit der Vorderleiste verwachsen. Die Seiten sind mit einem breiten aufgeworfenen Rande eingefasst. Die Spindel hat vier dicke Quersalten. Die Mündung ist lanzettförmig, an beiden Enden ausgeschnitten. Die Farbe schneeweiß.

F. III. 4. Voluta Faba.

F. III. 4. Die Bohne.

Linn. S. N. Sp. 406.

Belg. Bonje. Angl. Black Speckled Silver Cowrykin. Petiv. Gall. Cocombre pointée.

Testa ovata, laevi, spirae mucronatae anfractibus plicatis, columella quadriplicata. Die Schale ist eiförmig, und glatt, ihr Schnirkel zugespitzt, und gefaltet.

Color glaucus, punctis oblongis fuscis, per series longitudinales pictis. Die Farbe ist faßl, mit nach der Länge stehenden Reihen länglicher brauner Punkten bemalt.

Petiv. Gaz. t. 10. f. 5.

Gualt. Test. t. 28. f. Q.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 2.

Knor. Vergn. IV. 17. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 432. 433. f.

F. III. 5. Voluta glabella.

F. III. 5. Die glatte Gurke.

Linn. S. N. Sp. 407.

Belg.



Belg. Pruim. Gall. La Prune.

Testa ouata laeui, mucro- Die eiförmige, glatte, spiz-  
nata, columella quatriplica- wirblige Schale, hat an der  
ta, labro incrassato, reflexo. Spindel vier Falten, und eine  
verdickte, übergeschlagene Scha-  
lenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 326.

Gualt. Test. t. 28. f. L.

Adans. Seneg. Pl. 4. f. 3.

Knor. Vergn. IV. 21. t. 3, 4. f.

Mart. Konch. Kab. II. 42. t. 422. 423. f.

F. III. 6. Voluta merca-  
toria.

F. III. 6. Das brüten-  
de Taubchen.

Linn. S. N. Sp. 409.

Belg. Broedende Duifje. Gall. Le Pigeon couvant.

Testa ouata, transversim Die eiförmige Schale ist  
striata; columella retusa, la- in die Quere gestreift, an der  
broque denticulatis. stumpfen Spindel, wie auch  
an der äußern Leiste gezäh-  
nelt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 42.

Petiv. Gaz. t. 9. f. 4.

Gualt. Test. t. 43. f. f. L.

O

Adans.



*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 29.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. 5. f.*

— — — VI. 16. t. 6. 7. f. 18. t. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 452. — 458. f.*

F. III. 7. *Voluta rustica.* F. III. 7. Der Oliven-  
fern.

*Linn. S. N. Sp. 410.*

*Belg. Boetje.*

*Testa ovata, lacui, spira* Die eiförmige, glatte, spiz-  
*mucronata; columella, labro-* wirblice Schale ist an der  
*que denticulatis,* Spindel, und äußeren Lesze  
gezähnt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 48, 49.*

*Petiv. Gaz. t. 30. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 43. f. E. G. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 9. f. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 18. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 469. f.*

F. III. 8. *Voluta pau-* F. III. 8. Das arme  
*percula.* Weibchen.

*Linn. S. N. Sp. 411.*

*Gall. La Mignature.*

*Testa*





Testa ouata oblonga, laeui,  
columella quatriplicata, la-  
bro obtuso.

Die eysförmige längliche  
Schale, hat vier Falten an  
der Spindel, und eine stumpfe  
Schalenlefze.

Color fuscus, aut ferrugineus, fas-  
ciis longitudinalibus albidis.

Braun, oder eisenrothig, mit weiß-  
lichen nach der Länge laufenden  
Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 35.*

*Gualt. Test. t. 54. f. L.*

*Knor. Vergn. IV. 26. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1386. f.*

F. III. 9. Voluta men-  
dicaria.

F. III. 9. Das trauren-  
de Täubchen.

*Linn. S. N. Sp. 412.*

Testa ouata, transuersim  
tenuissime striata, spira coro-  
nata; columella complanata,  
labroque denticulatis.

Die eysförmige, in die  
Quere fein gestreifte Schale,  
ist an dem Schnirkel mit Hör-  
nern, an der platt gedrückten  
Spindel, und der Schalenlefze  
mit Zähnchen besetzt

Atra, fasciis transuersis tribus  
albis.

Schwarz mit drey weißen Quer-  
bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. II. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. E.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 44. t. 460. 461. f.*

F. III. 10. *Voluta cancellata.*

F. III. 10. Die netzförmige Faltenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 413.*

Testa ovata, striis elevatis transuersis, plicisque obliquis reticulatim intertexta, columella umbilicata, buplicata, contorta. Die eiförmige Schale ist mit erhabenen Streifen, und schiefen Falten netzförmig überzogen, und mit einer durchbohrten, zweymal gefalteten, verdrehten Spindel versehen

*Gualt. Test. t. 48. f. B. C.*

*Seb. Thez. III. t. 49. f. 45. 46. 48.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 16.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 5. f. ?*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. Fußförmiges, marginatae, effusae.

F. IV. Spindelförmiges, eingesäumte, mit ausgeschnittener Mündung.

F. IV. 1. *Voluta filosa.*

F. IV. 1. Die Schnurwalze.

Testa



Testa fusiformi tenuissime Die spindelförmige Schale  
reticulato striata, cingulis ele- ist mit sehr feinen Strichen netz-  
uatis transuersis columella förmig gezeichnet, mit erhabenen  
quatriplicata, labro crenato. Querschnüren umgürtet, an  
der Spindel mit vier Falten ver-  
sehen, an der Schalenleiste ge-  
kerbet.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa fusiformis, striis minu- Die Schale ist spindelförmig,  
tissimis incis reticulata, cingulis mit sehr feinen Strichen besetzt,  
fili formibus eleuatis, remotis, ven- und schnurförmigen erhabenen,  
tris duodecim, anfractuum quatuor. Quergürteln umgeben, deren zwölf  
Columella umbilicata, replicata, den Leib, vier die Gewinde umge-  
plicis eleuatis obliquis quatuor. ben. An der genabelten, und über-  
Labrum acutum, sub cingulis sul- geschlagenen Spindel sind vier er-  
catum. Basis effusa, extrus margina- habene schiefe Falten. Die äußere  
ta. Color albus, cingulorum ru- Leiste ist scharfrandig, unter den  
fus. Schnüren gesurchet. Der Grund  
ausgeschnitten und außen einge-  
säumt. Die Farbe weiß, mit roth-  
braunen Schnüren.

F. IV. 2. Voluta Sca-  
bricula,

F. IV. 2. Die rauhe  
Nadelwalze.

*Linn. S. N. Sp. 417.*

*Belg. Rauwe Pen - hoorn.*

Testa fusiformi, striis eleua- Die spindelförmige Scha-  
tis transuersis, longitudinali- le hat erhabene Querstreife, und  
bus incis, columella qua- nach der Länge laufende einge-  
triplicata, labro crenato. schnittene Striche, eine gekerbte  
Schalenleiste und vier Quers-  
falten.



*Gualt. Test. t. 53. f. D.*

*Knor. Vergn. III. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1389. f.*

F. IV. 3. *Voluta San-  
guifuga.*

F. IV. 3. Die Fahnen-  
nadel.

*Linn. S. N. Sp. 419.*

Testa fusiformi, longitudi-  
naliter sulcata, striis incis-  
is transversis, columella qua-  
triplicata, labro laevi.

Die spindelförmige Schale  
ist der Länge nach gefurcht, in  
die Quere mit eingeschnittenen  
Strichen besetzt, ihre Spindel  
vierfach gefalten, die Schalen-  
leiste glatt.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 11. f. 38.*

*Rumph. amb. t. 29. f. V.*

*Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 53. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. V.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 11. 12.*

*Regenf. Samml. I. 12. t. 5. f.*

*Knor. Vergn. IV. 11. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1367. f.*

F. IV. 4. *Voluta castra.*

F. IV. 4. Die braune  
Brandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 420.*



*Testa fusiformi, laevi, spirac anfractibus longitudinaliter rugosis, columella quatriplicata.* Die spindelförmige glatte Schale ist an den Wirbelge-  
winden mit länglichen Run-  
zeln, an der Spindel mit vier  
Falten versehen.

*Gualt. Test. t. 53. f. E.*

*Seb. Tbes. III, t. 49. f. 21, 22.*

*Knor. Vergn. V. 19. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1369. f.*

F. IV. 5. *Voluta Vulpecula.*

F. IV. 5. Der Fuchsturm.

*Linn. Syst. N. Sp. 423.*

*Belg. Toornje Rumph.*

*Testa fusiformi longitudinalibus angulata, striis transuersis incisis, columella quatriplicata.* Die spindelförmige Schale hat nach der Länge herablaufende Ecken und eingeschnittene Querstrieche, mit einer vierfach gefalteten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 39.*

*Petiv. Gaz. t. 56. f. I.*

*Rumph. amb. t. 29. f. R.*

*Valent. Abb. 2. t. 10. f.*

*Gualt. Test. t. 54. f. B.*

*Knor. Vergn. V. 16. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 148. t. 1366. f.*



F. IV. 6. *Voluta plicaria*.

F. IV. 6. Die knotige Bandnadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Genobelde Band - Pen. Gall. Le Minaret. Dav.*

*Testa fusiformi, angulis antice subspinosis, columella quatriplicata, labro laevi.* Die spindelförmige Schale hat vorne zugespitzte Ecken, vier Falten an der Spindel, und eine glatte Schalenleiste.

*Bonan. Recr. el. 3. f. 64.*

*Gualt. Test. t. 54. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 23, 24.*

*Knor. Vergn. I. 15. t. 5, 6. f.*

—— ——— III. 27. t. 4. f.

*Mart. Kouch, Kab. IV. 148. t. 1362, 1363. f.*

F. IV. 7. *Voluta pertusa*.

F. IV. 7. Die durchgestochene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 424.*

*Belg. Monniks Kappe.*

*Testa fusiformi, striis punctatis transversim pertusa, columella quinquaplicata.* Die spindelförmige Schale hat aus durchgestochenen Punkten bestehende Streifen, und fünf Falten an der Spindel.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 54. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 28. 47. 48.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1358. 1359. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

F. IV. 8. *Voluta Mitra* F. IV. 8. Die Bischofs-  
episcopalis. mütze.

*Linn. S. N. Sp. 425.*

*Belg. Penne hoorn. Rumph. Angl. The Bischops - Miter Shell.*  
*Hill. Gall. La tiare episcopale. Argenv.*

Testa fusiformi, laevi, co- Die spindelförmige glatte  
lumella quatriplicata. Schale hat an der Spindel  
vier Falten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 120.*

*Rumph. amb. t. 29. f. K.*

*Petiv. amb. t. 13. f. II.*

*Gualt. Test. t. 53. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 33. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1360. f.*

F. IV. 9. *Voluta Mi-* F. IV. 9. Die Pabst-  
tra papalis. frone.

O 5

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 426.*

*Belg. De Paus - Krone. Rumph. Angl. The papal - Crown. Da Cost. Gall. La tiare papale. Dav.*

Testa fusiformi, anfractibus coronatis, labro denticulato, columella quatriplicata. Die spindelförmige Schale hat gekrönte Windungen, eine gezähnelte Schalenleiste, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 119.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 66 - 68.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 53. f. 7. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 1. — 5, 37.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 1. f.*

*Knor. Verg. I. 6. t. 1. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 147. t. 1353. 1354. f.*

F. IV. 10. Voluta Musica.

F. IV. 10. Die Notenschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 427.*

*Belg. Musiek - hoorn. Angl. The Musik Shell. Hill. Gall. La Musique Dav.*

Testa marginata, anfractibus obtuse spinosis, columella octoplicata. Die eingesäumte Schale ist auf den Gewinden mit stumpfen Stacheln, und an der Spindel mit acht Falten besetzt.

*Bonan.*





*Bonan. Recr. cl. 3. f. 296. 297.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 28. f. Z.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. F.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 88.*

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 7 — 19. 20.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. I. f.*

— — — III. 12. t. I. f.

*Murray. Fund. Test. t. I. f. 17.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 96, t. 926. 929. f.*

F. IV. 11. *Voluta Vespertilio.*

F. IV. 11. *Die Fledermaus.*

*Linn. S. N. Sp. 428.*

*Belg. De Vleermuis. Klein. Angl. Long Batt Music Stamper. Pet. Gall. Chauve Souris. Dav.*

Testa marginata, anfractibus acute spinosis, columella quatriplicata.

Die eingesäumte Schale hat spizige Stacheln auf den Gewinden, und eine viermal gefaltene Spindel.

„ spinis breuibus.

„ mit kurzen Stacheln.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 16.*

*Rumpf. amb. t. 32. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 15. f. 12.*

*Valent. Abb. I. t. 1. f. ; 7. t. 62. f.*

*Gualt. Test. t. 29. f. F, G, H, V.*

*Seb. Thes. III. t. 57. f. 4, 5.*

*Knor. Vergn. II. 6. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab, III. 98. t. 938, 939. f.*

♂ spinis acutis rectis.

♂ mit spizigen geraden Stacheln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 17.*

*Petiv. Gaz. t. 70. f. 10.*

—— *amb. t. 15. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 28. f. 7. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 89.*

*Seb. Thes. III. t. 67. f. 1-5.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 3. f.*

—— *Delic. nat. I. t. B. VI. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab, III. 98. t. 937. f.*

γ maxima, spinis acutis incurvis. γ sehr groß mit spizigen gekrümmten Stacheln.

*Mart. Konch. Kab, III. 97. t. 934, 935. f.*



F. IV. 12. Voluta hebraea.

F. IV. 12. Die wilde Musik.

Linn. S. N. Sp. 429.

Belg. De wilde Musyk - hoorn. Angl. The oriental Music. Gall. L'hebraïque. Dav.

Testa ovata, anfractibus acutis spinosis, plicis quinque crassioribus, tribusque obsoletis.

Die eiförmige Schale hatte an den Gewinden spizige Stacheln, und an der Spindel fünf starke, und fünf schwächere Falten.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 293.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 18.

Rumph. amb. t. 32. f. L.

Petiv. amb. t. 15. f. 12.

Gualt. Test. t. 28. f. T.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.

Seb. Tbes. III. t. 57. f. 1 - 3, 6.

Knor. Vergn. I. 24. t. 1, 2. f.

— — VI. 15. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. III. 96. t. 924. 925. f.

F. IV. 13. Voluta Capitellum.

F. IV. 13. Die Vase.

Belg. Witte Vazs, Angl. The white Music, Gall. L' Aigrette. Dav.

Testa



Testa ovata, nodosa, rugosa, columella triplicata, basi umbilicata.

Die eysförmige, knotige, runzelichte Schale hat drey Falten an der Spindel, und am Grunde eine nabelsförmige Vertiefung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 19.*

*Gualt. Test. t. 37. f. A.*

*Argenv. Conch Pl. 15. f. K.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 76.*

*Knor. Vergn. VI. 35. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 947. 948. f.*

F. IV. 14. *Voluta muricata.*

F. IV. 14. Die rothmündige Vase.

*Belg. Capitaale Schwitzersbroek.*

Testa plicata, spinisque muricata, columella quinque plicata, perforata.

Die gefaltene und stachelichte Schale hat fünf Falten an der durchbohrten Spindel.

*Mart. Konch. Kab. III. 99. t. 949. 950. f.*

Testa ponderosa, transuersim fultata, fulcis acutis alternatim aequalibus. Spira conica, nodosa. Anfractus, ventrisque basis spinosa; spinis conicis, fornicatis, obtusis.

Die Schale ist schwer, in die Quere gefurchet, mit scharfen wechselseitig ungleichen Furchen besetzt. Der Schnitzel kegelförmig und knotig. Die Gewinde, und der Ager-



Apertura oblonga. Labrum exterius denticulatum, subtus plicatum. Columella laevis, rugis transversis tribus majoribus, duabus alternis minoribus. Basis perforata; Color albus, aperturae roseus.

Grund des Leibes sind stachelicht; die Stachel kegelförmig, hohl und stumpf. Die Mündung länglich. Die Schalenleiste ist gezähnt, unten gefalten. Die Spindel glatt, mit fünf größeren, und zwei kleineren Falten. Der Grund ist durchbohret. Die Farbe weiß, die Mündung rosenroth.

F. IV. 15. *Voluta ceramica.*

F. IV. 15. Die gezackte Vase.

*Linn. S. N. Sp. 432.*

*Belg. Getakte Swizers-broeck. Rumph. Angl. Ceram Spec Shell. Petiv. Gall. Chauffe - Trape.*

Testa utrinque acuminata, spinis diuergentibus, columella quinque plicata.

Die an beiden Enden zugespitzte Schale ist mit ausgebreiteten Stacheln besetzt, und an der Spindel mit fünf Falten versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 368.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 51.*

*Rumph. amb. t. 24. f. A. t. 49. f. L.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 55. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 2. f.*

—— VI. 35. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. III, 99. t. 943. . f.*

F. V:



F. IV. 16. *Voluta Py-*  
*rum.*

F. IV. 16. Die Birn-  
walze.

*Belg.* Witte offerhoorn. *Angl.* Gall. *La rave.* *Dav.*

*Testa* pyriformi, rostrata,  
*ponderosa*, *columella tri-qua-*  
*triplicata.*

Die birnförmige schwere  
Schale ist mit einem Schna-  
bel, und drey bis vier Falten  
an der Spindel besetzt.

$\alpha$  major, alba, *columella tripli-*  
*cata.*

$\alpha$  größer, weißer, mit drey mal  
gefaltener Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 194.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 25.*

*Rumph. Amb. t. 36. f. 7.*

*Gualt. Test. t. 46. f. C.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 916. f.*

$\beta$  minor, fuscopunctata, *columella*  
*quatriplicata.*

$\beta$  kleiner, braunpunktiert, mit vier-  
mal gefaltener Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 26.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 49.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 95. t. 917. 918. f.*



F. V. Ventricosae.

F. V. Bäuchige.

F. V. I. Voluta aethiopica.

F. V. I. Die Mohren-  
front.

Linn. S. N. Sp. 435.

Belg. Gekroonde Bak. Rumph. Angl. Ceram Coronnet. Petiv. Gall.  
Couronne d' Ethiopie. Dav.Testa ovata ventricosa, spi-  
ra coronata spinis fornicatis,  
apice papillari, columella  
quatriplicata.Die eysförmige bäuchige  
Schale ist an dem Schnirkel  
mit hohlen Stacheln, und ei-  
ner warzenförmigen Spitze ver-  
sehen, mit vier Falten an der  
Spindel.

α spinis fornicatis erectis.

α mit hohlen aufgerichteten Stas-  
cheln.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 1.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 4.

Rumph. amb. t. 31. f. B.

Petiv. amb. t. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. f. H.

Seb. Thes. III. t. 64. f. 4.

Knor. Vergn. II. 4. t. 1. f.

— Del. nat. I. t. B. 6. f. 2.

Mart. Konch. Kab. III. 73. t. 778. 779. f.

β spinis fornicatis decumbentibus. β mit darniederliegenden hohlen  
Stacheln.

Rumph. amb. t. 31. f. A.

Petiv. amb. t. 3. f. 13.

P

Gualt.



*Gualt. Test. t. 29. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 64. f. 2.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 15. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 75. t. 785. f.*

γ spinis obsoletis.

γ mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 72. t. 772. 773. f.*

F. V. 2. *Voluta Cymbium.*

F. V. 2. *Die Gondel.*

*Linn. S. N. Sp. 436.*

*Belg. Jacobs-Kruck. Engl. Clouded Melon. Gall. Cuiller de Neptune. Dav.*

*Testa ventricosa, anfractibus canaliculatis, acute marginatis, apice papillari, columella quadriplicata.*

Die bäuchige Schale hat rinnenartige scharfrandige Gerwinde mit einer warzenartigen Spitze, und vier Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 6.*

*List. Hist. Conch. 1. 4. f. 11. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 29. f. B.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 2.*

*Seb.*





*Seb. Thes. III. t. 65. f. 5, 6; t. 66. f. 5.*

*Knor. Vergn. II. 30. t. 1. f.*

—— ——— *V. 28. t. 1. f.*

—— *Delic nat. I. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 70. t. 762. - 765. f.*

F. V. 3. Voluta Olla.

F. V. 3. Der Topf.

*Linn. S. N. Sp. 437.*

*Belg. Teepel bak. Valent. Angl. The Melon Tun. Da. Cost. Gall. Tasse de Neptune, Dav.*

Testa ovata ventricosa, spirae anfractibus canaliculato Die eysförmige läuchige Schale hat gewölbte ausgeconuexis, columella bi-tri-felhte Windungen, und zweo plicata. bis drey Falten an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 2.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 29. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 3. f. 1.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 5. f. 97.*

*Seb. Thes. III. t. 66. f. 18.*



*Knor. Vergn. V. 28. t. 7. f.*

— — — VI. 22. t. 2. f.

*Mart. Konch. Konch III. 71. t. 766. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 9.*

## G. Buccinum.

## G. Das Rinthorn.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 323.*

Testa spiralis; apertura effusa desinens in canalibus retusum; labium explanatum.

Die schnirkelförmig gewundene Schale hat eine eingeschnittene Mündung, die in eine kurze Rinne ausläuft; und eine ausgebreitete Schalenleiste.

G. I. Ampullacea, inflata.

G. I. Flaschenartige, aufgeblasene.

G. I. I. Buccinum Galea

G. I. I. Das Schellenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 439.*

*Belg. Geribde Belheorn. Gall. Tonne cannelée Dav.*

Testa subrotunda inflata, sulcis transversis, linea elevata interstinctis, labro edentulo.

Die rundliche aufgeblasene Schale ist mit Quersulchen besetzt, dazwischen mit einer erhabenen Linie umgürtet, und an der äußern Lippe ohne Zahn.

*Gi.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 183.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 42. f. A.A.*

*Ginan. adr. II. t. 12. f. 93.*

*Mart. Konch. Kab. III. 116. t. 1070. f.*

G. I. 2. Buccinum Per-  
dix.

*Linn. S. N. Sp. 440.*

*Belg. Patrys - hoorn. Angl. Indian. Partridge Shell. Hill. Gall.  
Le Perdix. Argenv.*

Testa ouata inflata, trans- Die eysförmige aufgeblasene  
versum sulcata, albo maculata, Schale ist in die Quere gefur-  
labro edentulo. chet, mit weißlichen Flecken,  
und ungezählter äußerer Lippe.

G. I. 2. Das Rebhuhn.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 191.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 43.*

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 13.*

— amb. t. 4. f. 11.

*Rumph. amb. t. 27. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 5.*

*Seb. Tbes. III. t. 68. f. 12, 13, 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1078, 1079. f.*



G. I. 3. Buccinum Po-  
mum.

G. I. 3. Die dicklippige  
Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 441.*

*Belg.* Diklippige Olyhoorn. *Rumph. Angl.* Thik lip'd Partridge.  
*Petiv. Gall.* Perdrix a grosse-levre. *Dav.*

Testa ovata, inflata, trans-  
verse sulcata, apertura den-  
tata.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere ge-  
furchet, und an der Mündung  
ungezähnel.

Albo fulvoque maculata, fulcis  
concavis, spira breui.

Weiß- und rothbraun gefleckt, mit  
hohlen Furchen, und kurzem Schnir-  
fel.

*Rumph. amb. t. 27. f. B.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 51. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 2 — 4.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 370. 371. f.*

G. I. 4. Buccinum sul-  
cosum.

G. I. 4. Die gefurchte  
Sturmhaube.

Testa ovata, inflata, trans-  
versim sulcata, labio explana-  
to granuloso.

Die eysförmige aufgeblasene  
Schale ist in die Quere gefur-  
chet, und an der ausgebreite-  
ten Spindellefze mit Körnern  
besetzt.

*Seb.*



Seb. Tbes. III. t. 68. f. 15. 17.

Ginan. adr. II. t. 5. f. 44.

• Mart. Konch. Kab. III. 118. t. 1081. f.

Testa ovata inflata ponderosa, sulcis numerosis transversim cincta. Anfractus contingui Spira acuminata, reticulatim striata. Labrum plicatum. Labium explanatum, punctis eleuatis scabrum. Basis definens in canallem recuruum, ascendentem. Color albidus, fasciis transversis rufis.

Die Schale ist eiförmig, aufgeblasen, und der Quere nach mit vielen Furchen umgürtet. Die Gewinde berühren einander. Der zugespitzte Schnirkel ist nezförmig gestreift. Die Schalenlefze gefalten. Die Spindellefze ausgebreitet und mit erhabenen Körnern besetzt. Der Grund verliert sich in eine krumme aufgerichtete Röhre. Von weißer Farbe, mit rothbraunen Querbändern.

G. I. 5. Buccinum Dolum.

G. I. 5. Das Faß.

Linn. S. N. Sp. 442.

Belg. Geplekte Belhoorn. Angl. Great spat rib'd Partridge. Pet. Gall. Tonne dentelée. Dav.

Testa rotundata ventricosa, cingulis eleuatis, sulcisque remotis transversis, rostro prominulo, labro dentato.

Die rundliche bäuchige Schale ist mit erhabenen Gürteln, und breiten Furchen der Quere nach umgeben, mit einem hervorragenden Schnabel, und gezähnter Lefze versehen.

Albida cingulis albo fuscoque articulatis.

Weiß, mit weiß und braun unterbrochenen Gürteln.



*α* fulcis obtusis latis.

*α* mit stumpfen breiten Furchen:

*β* fulcis linea elevata interstinctis. *β* mit Furchen, die mit einer erhabenen Linie unterbrochen sind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 17, 25.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 19.*

*Petiv. Gaz. t. 99. f. 11.*

— *amb. t. 12. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 27. f. A.*

*Gualt. Test. t. 39. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 6.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 9 t. 89. f. H, J, P.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 117. t. 1073. 1074. f.*

*G. II. Cassidea, rostro recurvo.*

*G. II. Sturmhäuben, mit umgebogenen Schnabel.*

*G. II. 1. Buccinum echinophorum.*

*G. II. 1. Die Knotenschelle.*

*Linn. S. N. Sp. 443.*

*Belg. Geknobbelte Belhoorn Rumph. Angl. Knot-listed Kasket. Petiv. Gall. Casque tuberculé.*

Testa



Testa rotundata, cingulis Die rundliche Schale hat  
tuberculatis, rostro ascenden- knotige Gürteln, und einen  
te. aufgerichteten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 18. 19.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 27. n. 1.*

*Petiv. amb. t. 7. f. 14.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. P.*

——— *Zoom. Pl. 3. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 18.*

*Ginan. adr. II. t. 5. f. 43.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 1. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. I. B. 16. t. I. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 8.*

*Mart. Konch. Kab. II, 41. t. 407, 408. f.*

G. II. 2. *Buccinum cor-  
nutum.*

G. II. 2. Die gestricke-  
te Sturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 445.*

*Belg. Gebreide Stormhoed. Rumph. Angl. Knot listed Kasker.*  
*Petiv. Gall. Casque tricoté. Dav.*

Testa turbinata reticulata, Die verkehrt kegelförmige  
tuberculis spinosis, apertura nezartig gestricke Schale hat  
dentata. knotige Stachelgürteln, und  
eine gezähnte Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 155.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 73.*

*Petiv. Gaz. t. 151. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 23. f. A.*

*Gualt. Test. t. 40. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 7, 8, 17, 18.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II, 33. t. 348. 349. f.*

G. II. 3. Buccinum ru-  
fum.

G. II. 3. Die rothe  
Sturmhaube.

*Linn. S N. Sp. 446.*

*Belg. Roode Stormhoed. Rumph. Angl. Red Kasket-Shell. Pet. Gall, Le turban rouge. Argenv.*

Testa ovata striata, cingu-  
lis nodosis, striis geminis in-  
terstinctis; apertura dentata,  
cauda recurva.

Die eysförmige gestreifte  
Schale hat knotige Gürteln,  
und dazwischen gepaarte Strei-  
fen, mit gezählter Mündung,  
und gekrümmten Schnabel.

*Rumph. amb. t. 23. f. B.*

*Petiv. amb. t. 5. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 40. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 3, 6.*

*Regenf.*





*Regenf. Samml. I. 12. t. 69. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 52. t. 341. f.*

G. II. 4. *Buccinum tuberosum.*

G. II. 4. Die Knotensturmhaube.

*Linn. S. N. Sp. 447.*

*Belg. Volvvaffe turksche Papierkasket. Angl. The persian Whelk. Gall. Casque triangulaire. Dav.*

Testa ouata, albido fuscoque varia, cingulis tribus tuberculatis, rostro recuruo.

Die eysförmige, weiß- und braun gefleckte Schale hat drey knotige Reihen, und einen umgebogenen Schnabel.

*Petiv. Gaz. t. 153. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 51.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 11, 14.*

*Knor. Vergn. III. 10. t. 1, 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 359, f. 38. t. 381. 382f.*

G. II. 5. *Buccinum flammeum.*

G. II. 5. Das attalische Kleid.

*Linn. S. N. Sp. 448.*

*Belg.*



Belg. Geribd westindische Stormhoedje. Klein. Gall. Drap d'argente  
Ital. Drappo d'argento. Ron.

Testa ovata longitudinali- Die ensförmige nach der Län-  
ter plicata, cingulis aliquot ge gefaltene Schale hat einige  
tuberculatis, rostro incurua- Knotengürteln, und einen ge-  
to, krümmten Schnabel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 161.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 72.

Rumph. amb. t. 23. n. 2.

Valent. Abb. t. 11. f. 99, 100.

Seb. Thes. III. t. 73. f. 19. 20.

Knor. Vergn. IV. 4. t. 1. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 353, 354. f.

G. II. 6. Buccinum pul-  
lum.

G. II. 6. Die Papiere-  
haube.

Belg. Turks - Papier zonder Lippen. Angl. Feather - Stamper.  
Petiv. Gall. Casque plume. Dav.

Testa ovata oblonga, cin- Die ensförmige längliche  
gulis transversim striatis, 12- Schale hat gestreifte Quergür-  
bro edentulo, rostro recurvo, teln, die äußere Lesze ohne Zahn,  
mit einem gekrümmten Schnabel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 71.

Rumph. amb. t. 23. f. C.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 10. f. 10.*

*Mart. Konch. Kab. II. 36. t. 373. 374. f.*

0

Testa ovata, laevis glabra, longitudinaliter striata. Cingula composita striis latis profundis parallelis quinatis. Spira planiucula, transverse striata, producta in mucronem centralem prominentem. Columella subtrus umbilicata, & recurvata in rostrum ascendens. Labrum exterius nullum seu imperfectum. Color rufus, maculis dispersis albis.

Die Schale ist eysförmig, leicht und glatt, nach der Länge gestreift. Die Quergürteln bestehen aus fünf gleichweit laufenden vertieften Streifen. Der Schnirkel ist etwas flach, in die Quere gestreift, ihre Spitze raget in der Mitte hervor. Die Spindel hat eine nabelförmige Vertiefung, mit einem gekrümmten aufwärts gerichteten Rüssel. Die äußere Leiste manvelt, oder ist unvollkommen. Die Farbe ist rothbraun mit zerstreuten weißen Flecken.

G. II. 7. Buccinum Testiculus.

G. II. 7. Die polnische Mütze.

*Linn. S. N. Sp. 449.*

*Belg. Poolische Muz, Gall. Bonnet de Pologne. Dav.*

Testa ovata, striis elevatis longitudinalibus, apertura dentata, rostro recurvo.

Die eysförmige Schale ist der Länge nach mit erhabenen Streifen, an der Mündung mit Zähnen besetzt, und mit einem gekrümmten Schnabel versehen.

*Bonan. Reer. cl. 3. f. 162.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 66.*

*Pe-*



*Petiv. Gaz. t. 152. f. 17.*

*Rumph. amb. t. 23. n. 3.*

*Valent. Abb. t. 7. . 59.*

① *Gualt. Test. t. 39. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 17-20.*

*Knor. Vergn. III. 8. n. 2. f.*

— — — IV. 6. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. II. 37. t. 375, 376. f.*

G. II. 8. Buccinum decussatum.

G. II. 8. Der Schuppen-Bezoar.

*Linn. S. N. Sp. 450.*

*Belg. Geschubde Bezoar. Gall. Casque pavé. Dav.*

**Testa ovata, decussatim striata, tessulis luteis maculata, apertura dentata, rostro recurvo,** Die eiförmige kreuzweisgestreifte Schale ist mit gelben Flecken bemalet, an der Mündung gezähnt, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Rear. cl. 3. f. 157.*

*Lifst. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 65.*

*Gualt. Test. t. 40. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 3, 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 360, 361. f.*

G. II.



G. II. 9. Buccinum  
Areola.

G. II. 9. Das Gartene  
beetchen.

*Linn. S. N. Sp. 451.*

*Belg. Gevlackte Bezoar. Rumph. Angl. Small Dice Kasket. Petiv. Gall. Casque truité. Argeny.*

Testa substriata, tessulis Die einigermaßen gestreifte,  
oblongis transuersim macula- und mit länglichen Würfel-  
ta, apertura dentata, rostro flecken bemalte Schale ist an  
recuruo. der Mündung gezähnet, mit  
einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 154.*

*Rumph. amb. t. 25. f. B.*

*Petiv. amb. t. 2. f. II.*

*Gualt. Test. t. 39. f. H.*

*Argeny. Conch. Pl. 15. f. J.*

*Seb. Thes. III. t. 70. f. 7-9.*

*Knor. Vergn. III. 8. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 355 - 356. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 10.*

G. II. 10. Buccinum gra-  
nulaturn.

G. II. 10. Das gekörnte  
Beetchen.

*Belg. Gestreepte Beddetje. Angl. Gray Kasket. Petiv. Gall. Gros Casque cannelé.*

Testa



Testa ovata, transuersim obsolete sulcata, tessulis luteis seriatim maculata, labio granulato, cauda recurua.

Die eysförmige einigermaßen in die Quere gefurchte Schale hat einige Reihen gelber Würfelstellen, die Schalenlesze ist gezähnt, die Spindellessze gekörnet, der Schnabel gekrümmt.

*Rumph. amb. t. 25. f. C.*

*Petiv. amb. t. 9. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 39. f. B. t. 40. f. E.*

*Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 344. 345. f.*

Testa ovata, transuersim obsolete sulcata, longitudinaliter tenuiter striata. Spira conica, decussatim striata. Apertura longa, utrinque dentata. Labrum exterius marginatum, extrorsum reflexum, intrus dentatum, interius transuersim plicatum, subtus expansum, punctisque eleuatis seu granis adpersum. Basis desinens in canallem rostratum recuruum. Sutura lateralis prope columellam nulla. Color albus, maculis quadratis luteis secundum series digestis.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach mit matten Furchen, in die Quere mit zarten Streifen besetzt; Der kegelförmige Schnitzel ist kreuzweise gestreift. Die Mündung länglicht, beiderseits gezähnt. Die Schalenlesze gesäumt, und auswärts überschlagen, von innen gezähnt. Die Spindellessze in die Quere gefalten, unten ausgebreitet, und mit erhabenen Punkten, oder Körnern besetzt. Der Grund endet sich in eine schnabelförmige, gekrümmte Rinne. An der Seite der inneren Lesze steht der Länge nach keine Rath. Die Farbe ist weiß mit gelben reiheweise gesetzten Würfelstellen.



G. III. Cassidea, labro muricato. G. III, Helmformige, mit gezackter Schalenlesze.

G. III, I. Buccinum Eri-  
naceus.

G. III, I. Das gefaltene  
Säumchen.

Linn. S. N. Sp. 452.

Belg. Gestreepte Zoomtje Rumph. Angl. Small curld Casket. Pat.

Testa ouata, longitudinaliter Die eysförmige längliche ei-  
subplicata, papillis coronata, nigermaßen gefaltene Schale  
labro postice muricato, ist mit Knoten gekrönet, und  
an der Schalenlesze gezackt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 73.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 152.

Rumph. amb. t. 25. f. D. 6, 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 9.

Gualt. Test. t. 39. f. D, 7.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. G.

Seb. Thes. III. t. 53. f. II. 16.

Knor. Vergn. VI. II. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 35. t. 363. f.

G. III, 2. Buccinum  
glaucum.

G. III, 2. Der graue  
Bezoar.

Linn. S. N. Sp. 453.

Belg. Graeuwe Kasket. Rumph. Angl. Smooth gray Casket. Petiv.  
Gall. Casque Bezoard. Dav.

Q

Testa



Testa ovata laevi, papillis coronata, labro postice muricato. Die eysförmige glatte Schale ist mit Knoten gekrönt, und hinten an der Schalenleiste gezackt.

Rumph. amb. t. 25. f. A.

Petiv. amb. t. 7. f. 4. t. 11. f. 18.

Gualt. Test. t. 40. f. A.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 11 - 16.

Knor. Vergn. III. 8. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. II. 32. t. 342. 343. f.

G. III. 3. Buccinum G. III. 3. Der glatte  
Vibex. Bezvar.

Linn. S. N. Sp. 454.

Beig. Gladde Zoomtje. Rumph. Angl. Smooth - lip'd Casket. Pet.

Testa ovata, laevissima, labro postice muricato. Die eysförmige ganz glatte Schale ist hinten an der Schalenleiste gezackt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 151.

Rumph. amb. t. 25. f. E.

Petiv. amb. t. 4. f. 9.

Gualt.





*Gualt. Test. t. 39. f. F. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 53. f. 5-7, 10, 17.*

*Regenf. Samml. I. 10. t. 40. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 35. t. 364, 365. f.*

⊙ G. III. 4. Buccinum papillosum. G. III. 4. Das körnige Rinkhorn.

*Linn. S. N. Sp. 455.*

*Belg. Ryftenbry Hoorentje.*

Testa ovata oblonga, undique tuberculata, labro portice muricato. Die eiförmige längliche Schale ist allenthalben mit erhöhten Körnern, und hinten an der Schalenleiste mit Zacken besetzt.

*List. Hist. Conch. t. 4. f. 15. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 29. f. M.*

*Gualt. Test. t. 44. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 57, 58, 59.*

*Knor. Vergn. II. 27. t. 2. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. t. 1204, 1205. f.*



G. III. 5. Buccinum  
Glans.

G. III. 5. Das linirte  
Kinfhorn.

Linn. S. N. Sp. 456.

Belg. Modervlakje.

Testa ovata oblonga laevi,  
spirae apice longitudinaliter  
sulcato, labro postice murica-  
to.

Die eysförmige längliche  
Schale ist glatt, an der Spitze,  
der Länge nach gesurchet, und  
hinten an der Schalenleiste mit  
Zacken besetzt.

Rumph. amb. t. 29. f. P.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 60.

Knor. Vergn. III. 5. t. 5. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 125. t. 1196 - 1198. f.

G. IV. Callosa ad columellam re-  
flexam.

G. IV. Mit umgeschlagener schwie-  
liger Spindel.

G. IV. 1. Buccinum  
Arcularia.

G. IV. 1. Das weiße  
Kofferhörnchen.

Linn. S. N. Sp. 457.

Belg. Koffer Hoorntje. Gall. Arculaire blanc. Angl. Small koffer Shell.

Testa ovata, transversim  
striata, plicis longitudinali-  
bus, papillisque coronata,  
labio explanato, calloso.

Die eysförmige, in die Que-  
re gestreifte Schale, ist der  
Länge nach mit Falten und Kno-  
ten besetzt, mit einer ausge-  
breiteten schwieligen Spindel.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. M.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 44. f. R. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Sch. Thes. III. t. 53. f. 32. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 22. t. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 125. l. 1174. 1175. f.*

G. IV. 2. Buccinum  
murabile.

G. IV. 2. Die Afters-  
sturnhaube.

*Linn. S. N. Sp. 460.*

Testa ovata oblonga, spira  
acuminata, labio explanato.

Die eiförmige linsliche  
Schale hat einen zugespitzten  
Schnükel, und eine ausge-  
breitete Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 30.*

*Gualt. Test. t. 44. f. B.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. IV. 3. Buccinum  
neritoideum,

G. IV. 3. Die Dofen-  
schnecke.

Q 3

Testa



Testa orbiculata laevi, sub-  
tus planiuscula, labio expla-  
nato gibbo.

Die Schale ist scheibenrund  
und platt, unten einigermaßen  
flach, und an der Lippe aus-  
gebreitet, und erhaben.

*Gualt. Test. t. 65. f. J.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. V. Columella, quasi abrasa,  
plana.

G. V. Mit gleichsam abgeschabe-  
ner flacher Spindel.

G. V. I. Buccinum Har-  
pa.

G. V. I. Die Harpe.

*Linn. S. N. Sp. 462.*

*Belg. Davids Harp. Angl. The Harp Shell. Hill. Gall. La Harpe.*  
*Argenv.*

Testa costis longitudinalibus  
carinatis antice mucronatis, co-  
lumella plana laevi.

Die Schale ist nach der  
Länge mit scharfen, vorne spiz-  
gen Rippen besetzt, und an der  
Lippe flach.

α costis complanatis, latis.

α mit plattgedrückten breiten Rib-  
ben.

*Bonani. Recr. cl. 3. f. 185.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 55.*

*Rumph. amb. t. 32. f. K. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 2. t. 7. f. 8.*

*Gualt. Test. t. 29. f. C, E, G.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. D.*

*Seb.*



Seb. Thes. III. t. 70. f. 10.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. 2. t. 14. f.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 14.

Knor. Vergn. I. 9. t. 3. f.

— — II. 8. t. 2. f; 19. t. 1, 2. f.

Mart. Konch. Kab. III. 119 t. 1090. 1091. 1092. f.

♂ costis carinatis angustioribus.

♂ mit scharfen schmälern Rippen.

Mus. Caes. Vindobon.

G. V. 2. Buccinum persicum.

G. V. 2. Die Rudolphsschnecke.

Linn. S. N. Sp. 464.

Belg. Wydmonder. Angl. The Persian-Shell. Hill. Gall. Conque perlique.

Testa ovata laevi, anfractibus tuberculatis, labro cre-

Die eysförmige glatte Schale ist an den Gewinden knotig, an der Lefze gekerbt, mit eines plattgedrückten Spindel.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 15. f. 46. 47.

Rumph. amb. t. 27. f. E.

Q 4

Petiv.



*Gualt. Test. t. 51. f. H. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 72. f. 12 — 16.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 2. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 69. t. 760. f.*

G. V. '3. Buccinum  
Haemastoma.

G. V. 3. Der Roth-  
mund.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa ovata nodosa, labro  
intus striato, fauce fulva.

Die eiförmige knotige Schale ist an der Schalenleiste inwendig gestreift, und im Schlunde rothgelb.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 48.*

*Gualt. Test. t. 51. f. A.*

*Knor. Vergn. IV. 5. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 965. f.*

G. V. 4. Buccinum La-  
pillus.

G. V. 4. Das Steins-  
chen.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 467.*

Testa ovata transuersim Die eysförmige Schale ist  
striata, spira tuberculata, co- der Quere nach gestreift, an  
lumella plana. den Gewinden knotig, mit ei-  
ner flachen Spindel.

*Reaumur Mem. de Paris 1711. Pl. 6. f. 45.*

*List. angl. t. 3. f. 5. 6.*

*Adans. Seneg. Pl. 7. f. 4.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 16. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III, 121. t. II. 1112. f.*

G. V. 5. Buccinum Sma-  
ragdulus.

G. V. 5. Die Smaragd-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 468.*

*Gall. l'Emeraude. Argenv.*

Testa ovata, glaberrima, Die eysförmige ganz glatte  
columella complanata, plica- Schale hat eine plattgedrückte  
ta. gefaltene Spindel.

Alba, lineis transuersis parallelis Weiß, mit gleichweitstehenden  
fuscis. braunen Querstreichen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 45.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. P.*



*Seb. Thes. III. t. 54. f. 14 — 16.*

*Knor. Vergn. III. 14. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 120. t. 1104. 1105. f.*

G. VI. G'abra.

G. VI. Glatte Rinkhörner.

G. VI. 1. Buccinum  
spiratum.

G. VI. 1. Die Treppe.

*Linn. S. N. Sp. 469.*

*Belg. Gevoord Bultje. Angl. Cloudy Dice - Shell. Pet. Gall. La tour  
de Coppenhague.*

Testa ouata oblonga laeui, Die eysförmige längliche glat-  
anfractibus canali plano distinc- te Schale hat flach ausgefehl-  
tis, columella abrupta, per- te Nätze, und eine abgestuzte  
forata. durchbohrte Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 70. 370.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 41.*

*Rumph. amb. 49. f. C. D.*

*Petiv. amb. 1. 9. f. 21.*

*Gualt. Test. t. 51. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 17. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 73. f. 23 — 26.*

*Regensf. Samml. I. 10. t. 41. f.*

*Knor.*





*Knor. Vergn. II. 6. t. 5. f.*

— — — *III. 3. t. 4. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 122. t. III 8 — 1121. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 6.*

G. VI. 2. *Buccinum glabratum.*

G. VI. 2. Der Kanarienvogel.

*Linn. S. N. Sp. 470.*

*Belg. Gladde Knipers - boor.*

Testa ovato oblonga glaberrima, suturis obsoletis, basi ventricosa transuersim sulcata.

Die eysförmige längliche ganz glatte Schale hat undeutliche Näthe, und einen bäuchigen nach der Quere gefurchten Boden.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 149.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 29.*

*Gualt. Test. t. 43. f. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. prior.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 47.*

*Knor. Vergn. II. 16. t. 4, 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 122. t. III 7. f.*

G. VI. 3. *Buccinum sulcatum.*

G. VI. 3. Das gefurchte Rinkhorn.

Testa



Testa ovata transversim sulcata, anfractibus contiguus, re gefurchte Schale, hat an labro crenulato, intus striato. einander verwachsene Gewinde, und eine gekerbte inwendig gestreifte Schalenleiste.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 31.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ovata. Anfractus sex, transversim sulcati, suturis contiguus. in die Quere gefurchte Windungen, deren Rätze an einander verwachsen sind. Die Mündung ist wie bei den Nebenarten. Die Schalenleiste fein gekerbt. Der Schlund gestreift. Die Spindelkeiste ist übergeschlagen, und ausgebreitet. Der Grund ausgeschnitten, und verkürzt. Von brauner Farbe, mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

G. VII. Angulata.

G. VII, Eckige Rinkhörner.

G. VII. I. Buccinum undosum.

C. VII. I. Das Eckhorn.

Linn. S N. Sp. 472.

Belg. Boerenjonge. Angl. Small rough Whelke. Petiv.

Testa ovato oblonga transversim sulcata, obtuse quinqueangulata, labro intus striato. Die eysförmige längliche, in die Quere gefurchte Schale hat fünf stumpfe Ecken, und eine inwendig gestreifte Schalenleiste.

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 33. 36.*

*Rumph. amb. t. 29. f. 0.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 4.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 61.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 26.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 4, 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 122. t. 1126. 1127. f.*

G. VII. 2. Buccinum  
Bezoar.

G. VII. 2. Die Muska-  
tennuß.

*Linn. S. N. Sp. 473.*

*Belg. Getackte Noote - Moskaat. Gall. Moskat.*

Testa ovata, decussatim ru- Die ensförmige Schale ist  
gosa, spinis transversis con- kreuzweise gerunzelt, mit hoch-  
cauis, anfractibus infimis la- len Stacheln der Quere nach,  
mellatis, columella perforata. und mit Blättern an den unter-  
sten Gewinden besetzt, sammt ei-  
ner durchbohrten Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. G.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 40. t. 398, 399. f.*

G. VII. 3. Buccinum  
undatum.

G. VII. 3. Das Wellen-  
horn.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 475.

Belg. Wulk. Angl. The Whelke.

Testa ovata, transuersim striata, anfractibus curuato multangulis. Die euförmige in die Quere gestreifte Schale hat runzelichte vieleckige Gewinde.

α dextrorsa.

α rechtsgewunden.

○

Bonon. Recr. cl. 3. f. 189.

List. angl. t. 3. f. 2.

—— Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 14.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 78 — 80.

Knor. Vergn. IV. 19. t. 1. f.

Müll. Linn. N. S. VI. I. B. 16. t. 3. 4. f.

β sinistrorsa.

β linksgewunden.

Mus. Caes. Vindobon.

G. VII. 4. Buccinum reticulatum.

G. VII. 4. Das Gitterhorn.

Linn. S. N. Sp. 476.

Angl. Small latticed Whelk. Pef.

Testa



Testa ovato oblonga, transversim striata, longitudinaliter rugosa, apertura dentata.

Die ensförmige längliche in die Quere gestreifte Schale ist der Länge nach mit Runzeln, und an der Mündung mit Zähnen versehen.

*Reaumur Mem. de Paris. 1711. Pl. 6. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 21.*

*Petiv. Gaz. t. 64. f. 8; t. 75. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

G. VII. 5. Buccinum clathratum.

G. VII. 5. Das Nezhorn.

Testa ovata, longitudinaliter plicata, striis elevatis transversis decussata; rostro recurvo.

Die ensförmige Schale ist mit nach der Länge laufenden Falten, und erhabenen Quersstreifen durchkreuzet, mit einem gekrümmten Schnabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 62.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata ventricosa, reticulata rugis longitudinalibus strias elevatas transversas decussantibus. Puncta decussationum nodosa. Spira acuminata porrecta. Labrum crenatum, intus sulcatum. Labium

Die Schale ist ensförmig häuchlig, und nehartig, mit nach der Länge laufenden Runzeln, welche durch erhabene Quersalten durchkreuzet werden. Die Durchkreuzungspunkte sind knotig. Der ausgesprozte Schnabel

repli-



replicatum tenue. Basis definens  
in canalem, breuem recuruum. Co-  
lor glaucus.

sel raget hervor. Die Schalenlefze  
ist gekerbt, und inwendig gefur-  
chet Die innere Lefze ist überge-  
schlagen, und dünn. Der Grund  
endiget sich in einen kurzen ge-  
krümmten Schnabel. Von lichter  
grauer Farbe.

G. VIII. Turrita, laevis, subulata.

G. VIII. Gethürmte, glatte, ab-  
förmige Rinkhörner.

G. VIII. I. Buccinum  
maculatum.

G. VIII. I. Die Strif-  
nadel.

Belg. Malprieu. Angl. Tygers-tooth. Petiv. Gall. Le Cloud. Argenv.

Testa turrita subfusiformi,  
anfractibus laevis indivisis  
integerrimis.

Die gethürmte einigermassen  
spindelartige Schale hat glatte  
ungetheilte, und ganzrandige  
Gewinde.

Pallida, maculis latis purpurascen-  
tibus.

Blas, mit breiten purpurrothen  
breiten Flecken.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 317.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 74.

Rumph. amb. t. 30. f. A. D.

Petiv. amb. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. f. 7.

Argenv. Conch. Pl. II. f. A.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 6.

Knor. Vergn. III. 23. t. 2. f.

— — VI. 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. t. 1440. f.

G. VIII.



G. VIII. 2. Buccinum  
subulatum.

G. VIII. 2. Die Tiger-  
nadel.

Linn. S. N. Sp. 480.

Belg. Dunne Tygerpen. Angl. Brown Tygers horn. Petiv. Gall. Vis  
tigrée. Day.

Testa turrita subulata, an-  
fractibus laevibus, indivisis, se-  
rie duplici macularum ferru-  
ginearum pictis.

Die gethürmte spindelför-  
mige Schale hat glatte unge-  
theilte Gewinde, die mit einer  
dreyfachen Reihe rostfarbiger  
Flecken bemalt sind.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 118.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 70.

Rumph. amb. 30. t. B.

Petiv. amb. t. 4. f. 2.

Gualt. Test. t. 56. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. X.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 28.

G. VIII. 3. Buccinum  
candidum.

G. VIII. 3. Die weiße  
Nadel.

Testa turrita subulata laevi;  
anfractibus integerrimis, prope  
suturam incrassatis.

Die gethürmte ahlförmige  
glatte Schale hat ungetheilte  
ganzrandige Gewinde, die bei  
der Naht sich verdicken.

Mus. Caes. Vindobon.



Testa subulata laevis. Anfractus circiter viginti, indivisi, integerrimi, supra prope futuram incrassati; supremi linea transversa bifariam partiti, & juxta futuram crenulati. Apertura, & basis congenerum. Color niueus.

Die ahlförmige Schale ist glatt. Die Gewinde, deren beständig zwanzig sind, nahe an der Naht. Die obersten sind durch eine neue Querlinie in zwey Theile getheilet, und an der Naht gekerbet. Die Mündung und der Grund sind wie an den Nebenarten beschaffen. Die Farbe schneeweiß.

G. VIII. 4. Buccinum ferrugineum.

G. VIII. 4. Die rostfarbige Nadel.

Testa turrita subulata ferruginea, anfractibus laevis, bipartitis, integerrimis.

Die gethürmte ahlförmige, rostfarbige Schale ist glatt, zweythellig und ganzrandig.

List. Hist. Conch. l. 4. f. II. f. 71.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata, laevis. Anfractus circiter sexdecim integerrimi, linea exarata transversa bifariam divisi. Apertura & basis congenerum. Color ferrugineus, maculis obsoletis albis.

Die Schale ist ahlförmig, und glatt. Die Gewinde häuchig, ganzrandig, und zweythellig; sechzehn an der Zahl. Die Mündung und der Grund nach Art der Unverswandten. Von eisenrothiger Farbe, mit matten weißen Flecken.

G. VIII. 5. Buccinum crenulatum.

G. VIII. 5. Die gekrümmte Nadel.

Linn S. N. Sp. 481.

Belg. Gehartelde Pen. Rumph. Angl. Tooth'd Bedlin. Pet.

Testa





Testa turrita, anfractibus bi- Die gethürmte Schale hat  
partitis, margine superiore zweitheilige am Oerrande ge-  
crenatis, kerbte Bindungen.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 75.

Rumph. amb. t. 30. f. E.

Petiv. amb. t. 8. f. 13.

Gualt. Test. t. 57. f. L.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. Y.

Seb. Thes. III. t. 56. f. 9. 35.

Knor. Vergn. I. 8. t. 7. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 153. - 1442. f.

G. VIII. 6. Buccinum G. VIII. 6. Die gekerbte  
vittarum. te Nadel.

Linn. S. N. Sp. 483.

Testa ventricoso turrita, Die bäuchig gethürmte Schale  
transuersum striata, sutura an- se ist in die Quere gestreift,  
fractuum duplicato crenulata, und an der Naht zweifach ge-  
kerbet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 34.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 121.

Mart. Konch. Konch IV. 155. t. 1461. f.



G. VIII. 7. Buccinum  
frigidatum.

G. VIII. 7. Die gestrie-  
gelte Nadel.

*Linn. S. N. Sp.* 484.

*Belg. Naalde = Pen. Gall. Le Foret. Dav.*

Testa subulata longitudi-  
naliter striata, anfractibus in-  
diuisis, cingulo suturali niveo  
rufo maculato.

Die ahlförmige Schale hat  
ungeheilte nach der Länge ge-  
streifte Gewinde, die an der  
Nath mit einem schneeweißen  
rothbraun gefleckten Bande um-  
geben sind.

*Rumph. amb. t.* 30. f. H.

*Gualt. Test. t.* 57. f. O.

*Argenv. Conch. Pl.* 11. f. R.

*Mus. Caes. Vindoben.*

G. VIII. 8. Buccinum du-  
plicatum.

G. VIII. 8. Die Nadel-  
nadel.

*Linn. S. N. Sp.* 485.

*Gall. La Vis de pressoir. Dav.*

Testa subulata anfractibus  
bipartitis, striatis.

Die ahlförmige Schale hat  
zweytheilige, gestreifte Win-  
dungen.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 110.

*Gualt. Test. t.* 57. f. N.

*Knor.*



*Knor. Vergn. VI. 18. t. 6. f. 24. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 155. t. 1455. f.*

G. VIII. 9. Buccinum lanceolatum, G. VIII. 9. Die Lanzennadel.

*Linn. S. N. Sp. 486.*

*Belg. Piekenier. Angl. Furrow - Pen. Pet. Gall. L'alène. Dav.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus integris, lineis lon- le hat ungetheilte Gewinde,  
gitudinalibus fulvis. die mit rothgelben Streifen  
nach der Länge herab bezeichnet  
sind.

*Rumph. amb. t. 30. f. G.*

*Petiv. Gaz. t. 13. f. 20.*

*Argenv. Conch. Pl. II. f. Z.*

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1450. f.*

G. VIII. 10. Buccinum dimidiatum, G. VIII. 10. Die un-  
wundene Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 487.*

*Belg. Omwonden Pen.*

Testa subulata laevi, an- Die ablsförmige glatte Scha-  
fractibus bipartitis integerri- le hat zweythellige ganzrandige  
mis. Gewinde.



*α* macularum crocearum serie transversa triplici picta. *α* mit dreifacher Reihe safranfarbigen Flecken in die Quere bemalt.

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 16, 23, 24, 27.*

*Knor. Verg. I. 23. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 154. t. 1443. f.*

*β* lutescens, maculis longitudinalibus us niueis, anfractuum margine superiore compresso attenuato. *β* gelblich, mit länglichen schneeweißen Flecken, und plattgedrücktem verdünntem Oberlande an den Gewinden.

*Rumph. amb. t. 30. f. C.*

*Gualt. Test. t. 51. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 15, 19.*

*Knor. Vergn. I. 23. t. 5. f.*

*— — — VI. 18. t. 5. f.*

G. VIII. 11. Buccinum cinereum.

G. VIII. 11. Die aschengraue Nadel.

Testa subulata; anfractibus indivisis; prope futuram longitudinaliter striatis.

Die ahlförmige Schale hat ungetheilte, und an der Naht nach der Länge gestreifte Gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa subulata glabra. Anfractus quatuordecim indiuisi, integerrimi, margine superiore longitudinaliter striati. Columella complanata. Apertura, & basis congenerum. Color cinereus; fascia transuersa prope suturam nigricante obsoleta.

Die Schale ist ablsförmig und glatt. Die vierzehn Gewinde sind eingetheilt, ganz glatt, und nur an der Nath der Länge nach gestreift. Die Spindel flach gedrückt. Die Mündung und der Grund wie an den Nebenarten dieses Geschlechtes. Von aschengrauer Farbe, mit einer undeutlichen schwärzlichen Querbinde unweit der Nath.

G. VIII. 12. Buccinum pertusum.

G. VIII. 12. Die durchstochene Nadel.

Testa subulata; anfractibus bipartitis, striis longitudinalibus eleuatis, & transuersis excauato punctatis.

Die ablsförmige Schale hat zwenytheilige Gewinde, die nach der Länge herab erhabene Streifen, und in die Quere vertiefte Punkten haben.

Mart. Kouch. Kab. IV. 155. t. 1457. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata. Anfractus circiter viginti striati, striis longitudinalibus eleuatis, punctisque ex auatis per seriem transuersam digestis. Apertura & basis congenerum. Color croceus aut albus, maculis dispersis fuluis.

Die Schale ist ablsförmig. Die Gewinde, deren ungefähr zwanzig sind, haben der Länge nach erhabene Streifen, und in die Quere eine dreyfache Reihe ausgehöhlter Punkten. Die Mündung, und der Grund ist wie an den andern Nadeln dieses Geschlechtes. Von safrangelber, oder weißer Farbe mit zerstreuten rothgelben Flecken.



G. VIII. 13. Buccinum  
sinuatum.

G. VIII. 13. Die Fal-  
tennadel.

Testa turrita anfractibus  
longitudinaliter plicatis, prope  
futuram attenuatis, labro po-  
stice sinuato.

Die gethürmte nach der Län-  
ge gefaltene Nadel hat an der  
Nath zusammengedrückte Ge-  
winde, und eine hinten aus-  
geschnittene Schalenleſze.

Mart. Konch. Kab. IV. 155 t. 1464. 1465. f.

Testa turrita. Anfractus circiter  
nonem, longitudinaliter plicati,  
prope futuram complana i Labrum  
replicatum, postice sinu breui exci-  
sum. Columella replicata. Aper-  
tura, & balis congenerum. Color  
lutescens, epidermide decidua ni-  
gra.

Die Schale ist gethürmt. Die  
Gewinde, deren ungefehr neun sind,  
der Länge nach gefalten, nächst der  
Nath platt gedrückt. Die Schal-  
enleſze ist erweitert, und hinten  
mit einem kurzen Einschnitte ver-  
sehen. Die Spindel ist übergeschla-  
gen. Die Mündung, und der  
Grund, wie an andern Spindeln  
dieses Geschlechtes. Von gelblicher  
Farbe mit schwarzer abfallender  
Oberhaut.

H. Strombus.

H. Die Flügelſchnecke.

Testa spiralis; apertura  
dilarata, labro ampliato.

Die ſchneckenförmige  
Schale hat eine erweiterte  
Mündung, und ausgebrei-  
tete Schalenleſze.

H. I.



H. I. Digitati, labro in lacinias  
tenues exeunte.

H. I. Gezackte, deren Schalen-  
lesze mit schmalen Zacken versehen  
sind.

H. I. I. Strombus Fusus.

H. I. I. Die Sterna-  
del.

Linn. S. N. Sp. 489.

Belg. Dicke Starre - Pen. Gall. Fuscau étoilé.

Testa turrita laeui, rostro  
subulato, labro dentato.

Die gehürnte glatte Scha-  
le hat einen ahlförmigen Schna-  
bel mit einer gezackten Schalen-  
lesze.

α testa crassa lutescens: apice longitu-  
dinaliter striato, labio incrassato.

α dickschalig gelblich braun, an  
der Spitze nach der Länge ge-  
streift, mit verdickter Spindel-  
lesze.

Bonap. Recr. cl. 3. t. 121.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. II, 18.

Argenv. Conch. Pl. 10. f. D.

Klein. Hist. Conch. t. 4. f. 37.

Seb. Thes. III. t. 56. f. I. 2.

Knor. Vergn. V. 6. t. 1. f. 7. t. 2. f.

Chemnitz Naturforscher IX. 6. t. 1, 2. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 158. t. 1495. 1496. f.

β attenuata alba, apice reticula-  
tim striato, rostro elongato.

β Schmal, weiß, an der Spitze  
gitterförmig gestreift, mit einem  
verlängerten Schnabel.

R 5

List.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 9.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 56. f. 3.*

*Mart. Conch. Kab. IV. 159. t. 1500. 1502. f.*

An prioris varietas pulla?

Etwan eine unvollkommene Ab-  
änderung der vorigen?

H. I. 2. Strombus Pes      H. I. 2. Der Vogelfuß.  
pelicani.

*Linn. S. N. Sp. 490.*

*Belg. Pelikaans - Poot. Angl. Blobber - lipt. Petiv. Gall. Patte  
d'oie. Dav. Ital. Turbine pendatilo. Gin.*

Testa labro tetradactylo, Die Schale hat eine vier-  
spirarum marginibus nodosis; zackige Schalenleiste, mit kno-  
fauce laevi. tigen Rändern an den Gewin-  
den, und glattem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 85. 87.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 20.*

*Petiv. Gaz. t. 79. f. 6; t. 127. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 53. f. A, B, C.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. M.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 2. f. 41. 42.*

*Ginan.*





*Ginan. adr. t. 7. f. 58. 60.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 21.*

*Mart. Konch. Kab. III, 83. t. 848 - 850. f.*

H. I. 3. Strombus Chi- H. I. 3. Die Bootschacke,  
ragra.

*Linn. S. N. Sp. 491.*

*Belg. Wufje - Bootschaak. Angl. Female Devil's Claw. Petiv. Gall. Araignée femelle Dav.*

Testa labro hexadactylo, Die Schale hat an der Scha-  
digitis curvis, rostro recurva- lefze sechs krumme Zacken, einen  
to, labio striato. gekrümmten Rüssel, mit einer  
gestreiften Spindellefze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 314.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 35. f. A. B.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 35. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 1, 6, 7, 9, 10.*

*Knor. Vergn. I. 27. t. 1. f.*

— Delic. nat. I. t. B. II. f. 1.

*Mart.*



*Mart. Konch. Kab. III. 85. t. 851. 852. f.*

— — — — — 87. t. 856. 857. f.

H. I. 4. Strombus Scorpio.

H. I. 4. Die Podagra-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 492.*

*Belg. Podagra kreeft. Valent. Angl. Knob-Fingers. Petiv. Gall.  
Le Scorpion. Argenv.*

Testa labro. heptadactylo, Die Schale hat sieben kno-  
digitis nodosis, postico lon- tige Zacken, deren hinterster  
ziffimo. sehr lang ist.

*Litt. Hist. Conch. I. 4. f. 12 f. 22.*

*Rumph. amb. t. 36. f. K.*

*Valent. Abb. t. 3. f. 28.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. II. 15.*

*Knor. Vergn. II. t. 3. f. I.*

*Murray. Fund. Test. t. I. f. 29.*

*Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 860. f.*



H. I. 5. Strombus H. I. 5. Die Krabbens-  
Lambis. schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 493.*

Belg. Geele krabbe. *Angl.* The Spider Shell. *Hill. Gall.* Araignée  
male. *Day.*

Testa labro heptadactylo, Die Schale hat an der Scha-  
digitis rectifuculis, fauce laevi. lenletzte sieben einigermassen ge-  
rade Zacken, und einen glatten  
Schlund.

α digitis perfectis elongatis.

α mit vollkommenen verlängerten  
Zacken.

*Rumph amb. t. 35. f. F.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 35. f. C.*

*Argenv. Conch. t. 14. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 8.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. I. 28. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. III. 86. t. 855. f.*

β digitis imperfectis, haud productis. β mit unvollkommenen verkürzten  
Zacken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 36. f. G.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 14. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 82. f. 16. 17.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 1. f.*

H. I. 6. Strombus Mil-  
lepeda.

H. I. 6. Die Zehlfuß-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 494.*

*Belg. Duizend - Beem. Rumph. Angl. The twelve Fingers. Petiv. Gall. Millepied Dav.*

Testa labro decadactylo,  
digitis inflexis, dorso gibbo  
compresso.

Die Schale hat zehn um-  
gebogene Zacken, und einen  
höckerigen plattgedrückten Rüs-  
sen.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 311.*

*Lift. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 23.*

*Rumph. amb. t. 36. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. B.*

*Mart. Konch. Kab. III. 88. t. 861. 862. f.*

H. II. Labro lobate.

H. II. Mit lappenförmigen  
Schalenlesze.

H. II. 1.



H. II. 1. Strombus lentiginosus.

H. II. 1. Die Sommersprossen.

*Linn. S. N. Sp.* 495.

*Belg.* Sproetje. *Rumph. Angl.* knobbed Broadlip. *Petiv. Gall.* Tete de serpent. *Dav.*

Testa labro antice trilobo, Die Schalenlesze ist vorne  
dorso tuberculato coronato, dreylappig, der Rücken knottig,  
rostro obtuso. und gekrönt, der Schnabel  
stumpf.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 300.

*Rumph. amb. t.* 37. f. Q.

*Petiv. amb. t.* 14. f. 10.

*Gualt. Test. t.* 32. f. A.

*Argenv. Conch. Pl.* 15. f. C.

*Seb. Thes. III. t.* 52. f. 17, 18.; t. 62. f. 11.

*Knor. Vergn. III. 13. t.* 2. f.; 26. t. 2, 3. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t.* 825. 826. f.

H. II. 2. Strombus Galus.

H. II. 2. Der Kampf  
hahn.

*Linn. S. N. Sp.* 496.

*Belg.* Kempheantje. *Rumph. Angl.* The Plough. *Da Cost. Gall.* Aile d'Ange. *Dav.*

Testa labro mucronato Die Schalenlesze hat einen  
longissimo, dorso spinoso, ro- sehr langen hervortretenden Zin-  
stro recto. ger, der Rücken ist stachelig,  
der Schnabel gerad.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 309. 310.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 29. 30.*

*Rumph. amb. t. 37. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 32. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 1, 2.*

*Knor. Vergn. IV. 12. t. I. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV f. 3.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 841, 842. f.*

—— ——— *85. t. 846. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 1.*

H. II. 3. Strombus Au-  
ris Dianae.

*Linn. S. N. Sp. 497.*

H. II. 3. Der Dianen-  
flügel.

*Belg. Wyzer. Rumph. Angl. Horned Broad - Lip. Petiv. Gall. Oreille  
& Anc. Argenv.*

Testa labro antice mucro-  
nato, dorso tuberculoso, ros-  
tro erecto.

Die Schalenleiste hat einen  
hervortretenden Finger, der  
Rücken ist knottig, der Schna-  
bel in die Höhe gebogen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 301. 302.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 26. 28.*

*Rumph. amb. t. 37. f. R.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 32. f. D, H.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. O.*

*Hlein.*



*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 106.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 1 — 6. t. 62. f. 13.*

*Knor. Vergn. II. 15. t. 1.2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 84. t. 838. 839. f.*

H. II. 4. Strombus Pu-      H. II. 4. Das Fleisch-  
gilis.                              horn.

*Linn. S. N. Sp. 498.*

*Belg. Vlees - Hoorn. Gall. Oreille de Cochon. Dav.*

Testa labro antice promi-      Die rundliche Schalenleiste  
nente rotundato, spira spino-      raget vorne hervor, der Schnir-  
sa, rostro trilobo, fauce ru-      kel ist stachlicht, der Rüssel  
bra.                              dreylappig, mit einem roten  
   Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 299.*

*Gualt. Test. t. 32. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. A.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 108.*

*Knor. Vergn. I. 9. t. 1. f.*

— — — III. 16. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 81. t. 830. 831. f.*



H. II. 5. Strombus Luvianus.

H. II. 5. Die Ruhnerschnecke.

Linn. S. N. Sp. 500.

Belg. Lohoensche Hoorntje. Rumph. Angl. Lohoe Broad - Lip. Petiv. Gall. Gueule noire. Argenv.

Testa labro prominulo, anfractibus rotundatis aequalibus, fauce sanguinea, columella nigra.

Die Schalenleiste raget hervor, die Gewinde sind rundlich, und gleich, der Schlund bluthroth, die Spindel schwarz.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 6.

— — Gaz. t. 98. f. 10.

Petiv. amb. t. 14. f. 12.

Rumph. amb. t. 37. f. S.

Gualt. Test. t. 31. f. H, J.

Argenv. Conch. Pl. 14. f. N.

Seb. Thes. III. t. 61. f. 20, 21. t. 62. f. 31, 32.

Knor. Vergn. V. 16. t. 5. f.

Mart. Conch. Kab. III. 77. t. 789. 790. f.

H. II. 6. Strombus fasciatus.

H. II. 6. Die gebänderte Flügelschnecke.

Testa labro prominulo, anfractibus infimis obtuse spinosis, ventre fasciis fuscis.

Die Schalenleiste raget etwas hervor, die untersten Gewinde sind mit stumpfen Stacheln gekrönt, und der Leib mit braunen Bändern umgeben.

Mart.





*Mart. Konch. Kab. III. 78. t. 800 - 802. f.*

Testa laevis. Anfractus septem,  
infimi duo spinosi, spinis obtusis.  
Labrum rotundatum prominulum.  
Labium reflexum. Basis obtusa  
biloba. Color testae albus, ventris  
fasciis interruptis fuscis; faux ro-  
sea.

Die Schale ist glatt. Die Ge-  
winde der Zahl nach sieben, davon  
die untersten mit stumpfen Knoten  
besetzt sind. Die Schalenleiste ist  
rundlich, raget etwas hervor. Die  
Spindelkeule übergeschlagen. Der  
Grund stumpf und zweiflappig. Die  
Schale ist weiß, mit braunen un-  
terbrochenen Bändern bemalt; der  
Schlund rosenroth.

H. II. 7. Strombus gib-  
berulus.

H. II. 7. Die höckerige  
Kanarienschncke.

*Linn. S. N. Sp. 501.*

*Belg.* Gebande Kanartje. *Angl.* Gall. Ailée bossue. *Angl.* Girdled Ca-  
narie. *Pet.*

Testa labro prominulo, dor-  
so laeui, anfractibus gibbosis  
inaequalibus.

Die Schalenleiste raget her-  
vor, der Rücken ist glatt, die Ge-  
winde sind höckerig und ungleich.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 1.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 150.*

*Rumph. amb. t. 37. f. V.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 31. f. N.*

*Seb. Thes. III. 61. t. 53. f.*

*Knor. Vergn. II. 14. t. 3. f.*

— — — III. 13. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 77. t. 792—796. f.*



H. II. 8. Strombus Oniscus.

Linn. S. N. Sp. 502.

Belg. Graeuwe Moerbey. Valent.

Testa ovata, cingulis nodosis, spirae apice mucronato, labro granulato, basi obtusa.

H. II. 8. Die Affel-schnecke.

Die eiförmige Schale hat knotige Gürteln, eine verdünnte Wirtelspitze, mit körniger Schalenleiste und stumpfen Grunde.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 10. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 22. f. 7.

Seb. Thes. III. t. 55. f. 23.

Knor. Vergn. IV. 12. t. 4. f.

— — VI. 15. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. II. 34. t. 357. 358. f.

H. III. Strombi, ampliati.

H. III. Mit ausgebreiteten Stü-  
geln.

H. III. 1. Strombus Lucifer.

Linn. S. N. Sp. 503.

H. III. 1. Die Kameel-schnecke.

Belg. Gemarmelde Kameelhoorn. Angl. Spiked Whelk. Gall. Chameau.

Testa transversim dupliciter striata, spira carinata, minute tuberculato.

Die in die Quere doppelt gestreifte Schale hat keilförmige feinknottige Schnirkelgewinde.

Bonan.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 303.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 4—6.*

*Rumph. amb. t. 49. f. M.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 88.*

*Gualt. Test. t. 55. f. A. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. 7.*

*Seb. Tbes. III. t. 61. f. 8; t. 62. f. 38—40.*

*Knor. Vergn. II. 29. t. 1. f.*

— — — III. 5. t. 4. f; 16. t. 4. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 90. t. 878, 886.*

*Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 2.*

H. III. 2. Strombus Gi- H. III. 2. Die gezakte  
gas. Schweizerhose.  
*Linn. S. N. Sp. 504.*

*Belg. Getakt Vleugel-Hoorn. Angl. The large Conch. Gall. La  
grande Ailée. Ital. Ogniella.*

Testa labro rotundato ma- Die rundliche Schalenleiste  
ximo, ventris spiraeque spi- ist sehr groß, der Leib und  
nis patentibus. Schnirkel mit ausgebreiteten  
kegelförmigen Stacheln besetzt.

*Fauce rosea.*

Mit rosenrothem Schlunde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 307. 321.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 19.*



*Gualt. Test. t. 33. f. A; t. 54. f. M.*

*Knor. Vergn. III. 17. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 80. t. 824. f.*

H. III. 3. Strombus Epidromis.

H. III. 3. Das Besandsegel.

*Linn. S. N. Sp. 506.*

? Belg. Bezaantje Rumph. Angl. Great Canarie. Pet. Gall. La Tourterelle, Dav.

Testa labro rotundato, bre- Die rundliche Schalenleſze  
ui, ventre laevi, spira sub- ist kurz, der Leib glatt, der  
nodosa. Schnirkel etwas knottig.

*Bonan. Mus. Kirch. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 10.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 11.*

— amb. t. 14. f. 18.

*Rumph. amb. t. 36. f. M.*

*Seb. Toes. III. t. 62. f. 21 — 23. 26.*

*Knor. Vergn. VI. 33. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 821. f.*



H. III. 4. Strombus Canarium.

H. III. 4. Das Tauben.

*Linn. S. N. Sp. 507.*

*Belg. Bultje Rumph. Angl. Hunchbackt Canarie Pet. Gall. Pigeonne.*

Testa tumida, laevi; labro rotundato, breui, retuso. Die bäuchige glatte Schale, hat eine rundliche, kurze, eingezogene Schalenleiste.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 146.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 13.*

— amb. t. 14. f. 17.

*Rumph. amb. t. 36. f. N.*

*Gualt. Test. t. 32. f. N. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. Q.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 28, 29, 24, 25.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 73.*

*Knor. Vergn. I. 18. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 817. 818. f.*

H. III. 5. Strombus vitatus.

H. III. 5. Das aufgewickelte Besanssegel.

*Linn. S. N. Sp. 508.*

*Belg. Opgerolde Bezaantje. Rumph. Angl. Great net Whelk. Pet. Gall. Mifaine roulée.*



Testa labro rotundato, ventre laeui, spirae elongatae anfractibus sutura distinctis,

Die Schalenlefze ist rundlich, der Leib glatt, die Gewinde des verlängerten Schnirkels haben eine Zwischennath.

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 12.*

— *amb. t. 7. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 36. f. 0.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 18 — 20.*

*Knor. Vergn. III. 20. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 79. t. 822. f.*

H. III. 6. Strombus acinctus.

H. III. 6. Die breite Kanarienschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 509.*

*Belg. Geblomde Kanarie. Angl. Broad knobbed Canarie. Petiv.*

Testa labro rotundato, spirae anfractibus striatis, ventre laeui, cingulis quatuor albo maculatis.

Die Schalenlefze ist rundlich, die Gewinde gestreifet, der Leib glatt, mit vier weißen gefleckten Gürteln.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 16.*

*Rumph. amb. t. 37. f. X.*

*Petiv. amb. t. 14. f. 19.*

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 10. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 61. f. 15.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

H. III. 7. Strombus Ur-  
ceus,

*Linn. S. N. Sp. 312.*

H. III. 7. Die knottige  
Kanarienschnecke.

*Belg. Gebulde Kanary. Rumph. Angl. Long knobbed Canarie. Pet.*

Testa labro attenuato, stria-  
to, ventre spiraque plicato  
nodosis.

Die Schalenlefze ist veren-  
get und gestreift, der Leib  
und der Schnirkel mit Knotten  
und Falten besetzt.

$\alpha$  alba transuersim striata, (major.)

$\alpha$  weiß, der Quere nach gestreift,  
(größer.)

$\beta$  fusco maculata, aut reticulata,  
laevis (minor.)

$\beta$  glatt, mit braunen Flecken, oder  
Rezen (kleiner.)

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 13.*

*Petiv. Gaz. t. 98. f. 14.*

— amb. t. 14. f. 21.

*Rumph. amb. t. 37. f. T.*

*Gualt. Test. t. 32. f. E.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 28. 29.*

*Knor. Vergn. III. 13. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. III. 78. t. 804 — 806. f.*



H. IV. Turriti.

H. IV. Gethürmte Flügelschnecken.

H. IV. 1. Strombus turberculatus.

H. IV. 1. Die knottige Nadel.

*Linn. S. N. Sp. 415.*

Testa turrita, transuersum  
striata, nodis glabris cincta;  
labro incrassato.

Die gethürmte Schale ist  
in die Quere gestreift, mit  
glatten Knotten umgeben, an  
der Schalenleiste verdickt.

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1490. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

## I. Murex.

## I. Die Stachelschnecke.

Testa spiralis suturis lon-  
gitudinalibus varicosis. A-  
pertura desinens in cana-  
lem rectum, aut subascen-  
dentem.

Die schnirkelförmig ge-  
wundene Schale ist der  
Länge nach mit wulstigen  
Räthen besetzt. Die Mün-  
dung endiget sich in eine  
gerade, oder etwas auf-  
steigende Rinne.

I. I. Spinosa, rostro elongato.

I. I. Dornige, mit verlängertem  
Rüssel.I. I. 1. Murex Hau-  
stellum.I. I. 1. Der Schnepfen-  
schnabel.*Linn.*





Linn. S. N. Sp. 518.

Belg. Scheppertje. Rumph. Angl. The common Woodcock Shell.  
Gall. Tete de Becasse. Dav.

Testa subovata tuberculata, Die etwas eysförmige knoti-  
rostro elongato subulato, recto, ge Schale hat einen verlänger-  
inermi, ten ahlförmigen, geraden, un-  
bewaffneten Rüssel.

α incarnata, maculis nigris. α fleischroth, mit schwarzen Flecken.

β niuea, maculis rufis. β schneeweiß, mit braunrothen  
Flecken.

Bonan. Recr., el. 3. f. 268.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 23.

Rumph. amb. t. 26. f. F.

Petiv. amb. t. 4. f. 8.

Gualt. Test. t. 30. f. E.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. B.

Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 81.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 12. t. 2, 3. f.

— — — III. 9. t. 4. f.

Mart. Konch. Kab. III, 115. t. 1066. f.

I. I. 2. Murex Tribulus. I. I. 2. Die Spinne.

Linn. S. N. Sp. 519.

Belg.



Belg. Spinnekop. Rumph. Angl. Thorney Woodcock. Hill. Gall.  
La becasse epincuse. Dav.

Testa ouata, spinis setaceis  
trifariis, rostro elongato, subu-  
lato, spinoso.

Die eysförmige Schale ist  
mit einer dreysachen Reihe bor-  
stiger Stacheln besetzt, und mit  
einem verlängerten, abköm-  
migen, stachelichten Rüssel versehen.

α spinis simplicibus, alternis majo-  
ribus.

α mit einfachen wechselweise größe-  
ren Stacheln.

○ Bonan. Recr. cl. 3. f. 269.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 22.

Petiv. Gaz. t. 101. f. 16.

— amb. t. 6. f. 8.

Rumph. amb. t. 26. f. G.

Gualt. Test. t. 31. f. A.

Seb. Thes. III. t. 78. f. 4.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Knor. Vergn. I. 11. t. 3, 4. f.

— Delic. nat. t. B. V. f. 5.

Murr. Fund. Test. t. 1. f. 15.

Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1053. 1054. f.

Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 5.

β spinis subaequalibus duplicatis.

β mit beynahe gleichgroßen doppelt-  
ten Stacheln.

Rumph. amb. t. 26. f. 3.

Gualt. Test. t. 31. f. B.

Argenv.



*Argenv. Conch. Pl. 16. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 78. I — 3. f.*

*Knor. Verg. V. 27. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 113. t. 1052. f.*

I. I. 3. *Murex cornu-*  
*tus.*

I. I. 3. Der gezackte  
Schneppsenkopf.

*Linn. S. N. Sp. 520.*

*Belg. Gedoornde Snippekop.*  
*grande Massüe d'Hercule. Dav.*

*Angl. Thorney Snipe. Gall. La*

Testa subrotunda, spinis  
subulatis obliquis, rostro elon-  
gato, spinis sparsis.

Die rundliche Schale hat  
ahlsförmige schiefstehende Stä-  
cheln und einen verlängerten  
mit zerstreuten Stacheln besetz-  
ten Rüssel.

*Bonan. Recr: cl. 3. f. 283.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 21.*

*Rumph. amb. t. 26. f. 5. °*

*Gualt. Test. t. 30. f. D.*

*Adans. Seneg. Pl. 8. f. 20.*

*Seb. Thes. III. t. 78. f. 7 — 9.*

*Knor. Vergn. VI. 17. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 114. t. 1057. f.*



I. I. 4. Murex Brandaris.

I. I. 4. Der dornige Schnepfenkopf.

Linn. S. N. Sp. 521.

Belg. Getackte Snippekop Rumph. Angl. The common thorney Murex. Pet. Gall. Massüe d'Hercule. Dav.

Testa ouata, spinis rectis, Die eiförmige Schale hat  
rostro mediocri subulato, rec- gerade Stacheln, einen mittelmäßig  
to, labio excauato. langen ablsförmigen geraden Rüssel mit einer ausgehöhlten Schalenleiste.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 281.

Petiv. Gaz. t. 68. f. 12.

Rumph amb. t. 25. f. 4.

Gualt. Test. t. 30. f. F.

Argenv. Zoom. Pl. 4. f. C.

Ginan. adr. II. t. 8. f. 61. 62.

Regenf. Samml. 6. t. 67. f.

Knoy. Vergn. II. 18. t. 1. 2. f.

— — — 22. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Konch III. 114. t. 1060. 1061. f.

— — — 115. t. 1062 - 1065. f.

I. I. 5. Murex Trunculus.

I. I. 5. Das gehörnte Purpurhorn.

Linn. S. N. Sp. 522.

Belg.



Belg. Gebandeerde Purper - Hoorn. Gall. Pourpre 2 bandes.

Testa ovata nodosa, spinis Die eiförmige knotige Scha-  
anticis majoribus, rostro trun- le hat vorne größere Stacheln,  
cato breui, perforato. und einen stumpfen kurzen  
durchbohrten Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 271, 274, 277.

Gualt. Test. t. 31. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. G.

Klein. Meth. Ostr. t. 6. f. 104.

Seb. Thes. III. t. 52. f. 15. 16.

Knor. Vergn. III. 13. t. I. f.

— — — V. 13. t. 4. f.; 19. t. 6. f.

Mart. Konch. Kab. III. 109. t. 1019. 1020. f.

I. II. Suturis foliaceis: Purpuræ.  
dictæ.

I. II. Mit blätterigen Nätzen: so-  
genannte Purpurschnecken.

I. II. 1. Murex tripte-  
rus.

I. II. 1. Die dreiflüg-  
lige Purpurschnecke.

Belg. Vleugel - hoorntje. Gall. Pourpre triangulaire ailée. Dav.

Testa elongata triangulari, Die länglichte, dreieckige  
angulis alato membranaceis. Schale hat flügelartig aus-  
gebreitete Ecken.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1033. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa



Testa elongato triangularis, transuersim rugosa; rugae inaequales acutae, striis eleuatis longitudinalibus subtilissimis; decussatae. Spira constans anfractibus septem, tuberculis solitariis inter suturas obliquis. Suturae longitudinales tres obsoletae, totidem constituentes angulos expansos in membranas plicatas aliformes. Apertura tuberculata ovato oblonga, desinens in canalem rectum spira breuiorem. Color nitens niueus.

Die länglichte dreneckige Schale ist in die Quere gerunzelt; Die Runzeln sind ungleich, und scharf, und mit erhabenen feinen Streifen der Länge nach durchkreuzet. Der Schnirkel bestehet aus sieben Gewinden, die zwischen den Näthen mit einzelnen Adrern besetzt sind. Nach der Länge laufen dann undeutliche Näthe, welche eben so viele Ecken bilden, die sich in häutige gefaltene Flügeln ausbreiten. Die länglichte ensförmige Mündung ist mit Körnchen besetzt, und endiget sich in eine gerade Rinne, die kürzer als der Schnirkel ist. Die Farbe ist glänzend schneeweiß.

### I. II. 2. Murex triquet-

ter.

### I. II. 2. Die dreysseitige Purpurschnecke.

Belg. Geplekte Vleugel - Hoorentje. Gall. Pourpre triangulaire tachetée.

Testa elongata triquetra subalata, reticulatim costata, rostro recto clauso.

Die länglichte dreysseitige eini-  
germaßen geflügelte Schale ist  
mit netzförmigen Ribben besetzt,  
und mit einem geraden geschlos-  
senen Rüssel versehen.

Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1038. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa elongata, costis transuersis, & longitudinalibus reticulatim decussata. Spira pyramidata composita ex anfractibus senis. Suturae longitudinales tres, eleuatae; angulos totidem constituentes, in membranas plicatas obsoletas excrecentes; quarum illa nonnisi labri externi, manifesta est. Apertura ellip-

Die Schale ist länglicht, mit  
nach der Länge, und in die Quere  
laufenden Ribben durchkreuzet. Der  
pyramidenförmige Schnirkel bester-  
het aus sechs Gewinden. Die drey  
nach der Länge stehenden erhabenen  
Näthe bilden eben so viele Ecken,  
welche sich in gefaltene, unvoll-  
kommene Flügeln verbreiten, davon  
tica,



tica, desinens in canalem elongatum rectum clausum. Labrum crenulatum. Color albus maculis dispersis rubris.

nur jener an der Schalenleſze deutlich ist. Die Mündung ist elliptisch, und verlängert sich in eine gerade geschlossene Rinne. Die Schalenleſze ist gekerbt. Von weißer Farbe mit rothen Flecken.

I. II. 3. *Murex ramosus*.

I. II. 3. Die Kraußschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 523.*

*Belg. Ocean-Hoorn. Rumph. Angl. The Caltrup Shell. Hill. Gall. Chauffe Trape. Argenv.*

Testa oblonga, triangula, trifariam frondosa, anfractibus contiguis, rostro truncato,

Die längliche, dreyeckige Schale hat drey Reihen kraußser Blätter, aneinander gewachsene Windungen, und einen abgestumpften Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 275. 276.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 41.*

*Rumph. amb. t. 26. f. A. I.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 37. f. G. D. L.; t. 38. f. A.*

*Valent. Abb. t. 4. f. 38; 5. t. 42. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 16. f. C. E. H.*

— *Zoom. Pl. 4. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 77. f. 1. 2. 7.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 8.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*



*Regenf. Samml.* I. 6. t. 6. f.

*Knor. Vergn.* I. 26. t. 1. 2. f.

— — — *III.* 9. t. 3. f.

— — — *V.* 11. t. 1. f.

*Mart. Konch. Kab.* III. 102. t. 980. f.

— — — 103. t. 981 — 983. f.

— — — 104. t. 984 — 986. f.

— — — 105. t. 987 — 989. f.

I. II. 4. *Murex Scorpio.* I. II. 4. Die Skorpion-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 524.

*Belg.* Scorpioentje *Rumph.* *Angl.* Least ragged Whelk. *Petiv. Gall.*  
*Patte de Crapaud.* *Dav.*

*Testa quadrifariam frondo-* Die Schale hat drey Rei-  
*sa, spira capitata, rostro trun-* hen krauser Blätter, einen kolo-  
*cato.* bigen Schnirkel, und abge-  
stumpften Rüssel.

*Rumph. amb.* t. 26. f. D.

*Petiv. amb.* t. 9. f. 14.

*Valent. Abb.* t. 4. f. 36. 37.

*Gualt. Test.* t. 37. f. M.

*Argenv. Conch. Pl.* 16. f. D.

*Seb.*





Seb. Thes. III. t. 77. f. 13 — 16.

Knor. Vergn. II. II. t. 4. 5. f.

Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040 — 1041. f.

Da Cost. Elem. Pl. 5. f. 6.

I. II. 5. Murex saxati-

s.

I. II. 5. Das Brand-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 525. ○

Belg. Dnbbelde Brana - Hoorn. Angl. The Endive - Shell. Hill. Gall.  
a Chicorée. Argenv.

Testa sexariam frondosa,  
afractibus contiguis, rostro  
bbreuiato.

Die sechsfach krausblätteri-  
ge Schale, hat aneinander ge-  
wachsene Windungen, und ei-  
nen verkürzten Rüssel.

brunna,

α braun.

nivea, frondibus nigris.

β schneeweiß, mit schwarzen Kraus-  
blättern.

Rumph. amb. t. 26. f. C. 2.

Petiv. amb. t. 12. f. 1.

Argenv. Conch. Pl. 16. f. K.

Seb. Thes. III. t. 77. f. 5, 6.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.

Regenf. Samml. I. I. t. 2. f.



*Knor. Vergn. II. 7. t. 4. 5. f.*

—— ——— *III. 9. t. 2. f.*

—— ——— *VI. 19. t. 1. 4. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 26.*

*Mart. Kouch. Kab. III. 107. t. 1004 - 1010. f.*

—— ——— ——— *108. t. 1011 - 1014. f.*

I. II. 6., *Murex Erina-*  
*ceus.*

I. II. 6. Die vieleckige  
Purpurschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 526.*

Testa multifariam subfron-  
dosa, spirae anfractibus mult-  
angulis, rostro brevisculo.

Die Schale hat viele un-  
vollkommene Krausblätter, viel-  
eckige Wirbelgewinde, und ei-  
nen etwas verkürzten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 49. f. H.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. Varicosi, suturis rotundis,  
torosis.

I. III. Warzige, mit runden Knot-  
tigen Rätzen.

I. III. 1. *Murex Rana,*

I. III. 1. Die Kröten-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 527.*

*Belg. Padde-Hoorn. Rumph.*  
*Gall. Raerocheuse, Dav.*

*Angl. Wide cadoe Whelk. Petiv.*

Testa



Testa futuris oppositis, compressis, cingulis mucatis, te Die Schale hat entgegengesetzte Zusammengedrückte Röhre, dornige Gürteln, und eine ebrunde Oefnung.

testa rotundata, spinis dorsi, & mit runder Schale, deren Rücken und Röhre mit kurzen Dörnern besetzt sind.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 182.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 59.*

*Petiv. Gaz. t. 100. f. 12.*

— amb. t. 11. f. 15.

*Rumph. amb. t. 24. f. G.*

*Gualt. Test. t. 49. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 15 — 18.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 64. f.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 6. 7. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1271. f.*

testa compressa, spinis futurarum  $\beta$  mit platgedrückter Schale, und verlängerten Stacheln auf den Röhren.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 44.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 19.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 133. t. 1275. 1276. f.*



I. III. 2. Murex Gyri-  
nus.

Linn. S. N. Sp. 528.

Belg. Vorfchen = Poppe, Gall. Grenouillete.

Testa futuris oppositis, con-  
tinnatis, cingulis tuberculosis  
fasciata; apertura rotunda.

I. III. 2. Die Frosch-  
schnecke.

Die Schale hat entgegen-  
gesetzte ununterbrochene Rätze  
und ist mit knottigen Gürteln  
und einer rundlichen Mündung  
versehen.

Seb. Thes. III, t. 60. f. 25 — 27.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 5. 6. f.

Mart. Konch. Kab. IV, 128. t. 1233. 1234. f.

I. III. 3. Murex Lam-  
pas.

Linn. S. N. Sp. 529.

I. III. 3. Der knottige  
Delfuchen.

Belg. Gebulde Olykoek. Rumph. Angl. Knopped Trumpet. Petiv.  
Gall. Culotte de Suisse Dav.

Testa granulosa, futuris op-  
positis, cingulis tuberculatis,  
labro dentato, labio striato.

Die körnige Schale hat ent-  
gegengesetzte Rätze, knettig  
Querbänder, eine gezähnte  
Schalenleiste, und gestreifte  
Spindellippe.

Bonanz. Recr. ol. 3. f. 103.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 88.

Rumph. amb. t. 28. f. C.

Petiv. amb. t. 12. f. 16. 17.

Gualt.



*Gualt. Test. t. 50. f. D.*

*Argenv. Conch. t. 9. f. D.*

*Knor. Vergn. II. 28. t. I. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 106. t. 998 — 123. f.*

I. III. 4. Murex Olearium.

I. III. 4. Der geribbte  
Delfuchen.

*Linn. S. N. Sp. 530.*

*Belg. Gebande Argus Oogen. Rumph. Angl. Girdled Argus Shell.*  
*Petiv. Gall. Argus a boutons-*

Testa futuris alternis, cin-  
gulis nodosis, dorso pollice  
transuersim striato.

Die Schale hat wechselwei-  
se stehende Rätze, knottige  
Gürteln, und einen hinten mit  
Querstreifen besetzten Rücken.

*Bonan. Recr. cl. 3. t. 289.*

*Rumph. amb. t. 49. f. E.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 6.*

*Gualt. Test. t. 50. f. A.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1223. f.*

I. III. 5. Murex costa-  
tus.

I. III. 6. Der eckige  
Delfuchen.

T 4

Testa



Testa subfusiformi, costis Die einigermaßen spindelför-  
transuersis angulatis, futura mige Schale, hat eckige Quer-  
solitaria, rostro elongato. ribben, eine einzelne Nath,  
mit einem verlängerten Rüssel.

Seb. Thes. III. t. 57. f. 31.

Mart. Konch. Kab. IV. 131. t. 1253. f.

Testa subfusiformis. Anfractus circiter octo, cincti costis crassis, conuexis, angulatis. Sulci intermedii striati, striis eleuatis, duplicatis. Sutura varicosa, solitaria, labro subopposita. Apertura plicata, ouato oblonga, declinens in rostrum umbilicatum, canaliculatum recuruum. Color pallide luteus.

Die Schale ist einigermaßen spindelförmig. Die Gewinde, deren beiläufig acht sind, haben dicke erhabene eckige Ribben. Die Zwischenfurchen sind gestreift, die Streifen erhaben und doppelt. Die Nath ist knottig und einzeln, der Schalenleiste gegenüberstehend. Die gefaltene länglich eiförmige Mündung endiget sich in einen nabelförmig eingedrückten, rinnenartigen gekrümmten Rüssel. Die Farbe ist bläulich.

I. III. 6. Murex Femorale.

I. III. 6. Das Fußhorn.

Linn. S. N. Sp. 531.

Belg. Voet - Hoorn. Rumph. Angl. Stooone Whelk. Gall. Rhinoceros. Dav.

Testa rugosa, trigona; spirae apice tuberculato, apertura edentula, antice transuersim expansa.

Die runzelichte dreieckige Schale hat eine knotige Wirtelspitze, mit einer ungezähnten vorne in die Quere erweiterten Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 290.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 37.

Rumph. amb. t. 26. f. B.

Petiv.



*Petiv. amb. t. 12. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 50. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 63. f. 7 — 10.*

*Knor. Vergn. IV. 16. t. I. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. III. III. t. 1039. f.*

I. III. 7. *Murex cuta-*  
*ceus.*

I. III. 7. Die Haut-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 532.*

*Belg. Vell. - Hoorn. Gall. Degrés bordés.*

Testa futura solitaria, no-  
disque transuersim decussatis,  
apertura dentata, columella  
perforata.

Die Schale hat eine einzels  
ne Nath, in die Quere durch-  
kreuzte Knotten, eine gezähnte  
Mündung, und durchbohrte  
Spindel.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 14. f. 38.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 10. 11.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 118. t. 1085. 1086. f.*

I. III. 8. *Murex Pyrum.*

I. III. 8. Die getrock-  
nete Birne.

*Linn. S. N. Sp. 535.*

*Belg. Gedrooyede Peer. Rumph. Angl. Hairy Whelk. Petiv. Gall. Poire ferhe.*

Testa ouata, nodosa, trans-  
uersim sulcata, rostro elonga-  
to flexuoso.

Die eysförmige knottige Scha-  
le ist in die Quere gefurchet,  
und mit einen langen geboge-  
nen Rüssel versehen.

*List.*



*Rumph. amb. t. 26. f. E.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 37. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 60. f.*

*Knor. Vergn. II. 7. t. 2. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 112. t. 1040. 1041. f.*

I. III. 9. *Murex Rubecula.*

I. III. 9. Die Libreeschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 536.*

*Belg. Livreyhoorn. Gall.*

Testa futuris oppositis, cingulis nodulosis, apertura dentata.

Die Schale hat entgegengesetzte Näthe, knottige Bürteln, und eine gezähnte Mündung.

*Gualt. Test. t. 49. f. I.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. I.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. I — 5.*

*Knor. Vergn. I. 13. t. 3. 4. f.*

— — — III. 5. t. 2. 3. f.

*Mart. Konch. Kab. IV. 132. t. 1259 — 1266. f.*

I. III. 10.





I. III. 10. *Murex reticularis*.

*Linn. S. N. Sp.* 538.

I. III. 10. Die Netzschnecke.

Testa futuris suboppositis, Die knottige Schale hat einigermassen entgegengesetzte Näth, netzförmig durchkreuzte erhabene Streifen, und einen verkürzten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 193.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 14. f. 30.

*Petiv. Gaz. t.* 153. f. 6.

*Gualt. Test. t.* 49. f. M.

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. III. 11. *Murex Anus*.

I. III. 11. Das frumme Maul.

*Linn. S. N. Sp.* 539.

*Belg. Oorhorn. Valent. Angl. Hairy - Ear. Petiv. Gall. La Grimaces*

Testa gibbosa reticulatim Die höckerige, netzförmige, tuberculata, futuris, & labiis knottige Schale, hat ausgedilatato membranaceis, rostro breitete häutige Näthe und Lippen, mit einem aufgerichteten credo. Schnabel.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 279. 280.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 11. f. 57.

*Petiv.*



*Petiv. Gaz. t. 74. f. 9.; t. 99. f. 10.*

— *amb. t. 6. f. 4.*

*Rumph. umb. t. 24. f. F.*

*Gualt. Test. t. 37. f. B. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 6. 7.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Knor. Vergn. III. 3. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. II. 41. t. 403. 404. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 2.*

I. IV Echinati, sine rostro.

I. IV. Dornige, ohne Rüssel.

I. IV. I. Murex Ricinus.

I. IV. I. Die gezackte  
Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 540.*

*Belg. Gedakte Moerbey. Rumph. Angl. Small Spur Shell. Pet. Gall.  
L' Herisson. Dav.*

Testa ouata, spinis subula-  
tis, apertura dentata.

Die eysförmige Schale ist  
mit ahlförmigen Dornern beset-  
zet, und an der Mündung ge-  
zähnt.

α ore luteo, spinis longioribus  
(minor).

α mit gelber Mündung, und längeren  
Dornern (kleiner).

β ore amethystino, spinis breuiori-  
bus (major).

β mit amethystfarbener Mündung,  
und kürzeren Dornern (größer).

*Rumph.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 11. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 24. f. E.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 28. f. N.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 37. 3942.*

*Knor. Vergn. I. 25. t. 5. 6. f.*

—— ——— VI. 24. t. 7. f.

*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 972. 973 f;*

—— ——— ——— 102. t. 976. 977. f.

I. IV. 2. *Murex Nodus.* I. IV. 2. Die große Ka-  
stanie.

*Linn. S. N. Sp. 541.*

*Belg.* De bandeerde Castanje. *Angl.* The great Chesnut. *Gall.* La  
Chataigne a bandes.

<p><i>Testa utrinque attenuata, spinis conicis, labro tubercu- lato, columella laevi.</i></p>	<p>Die beiderseits zugespitzte Schale ist mit kegelförmigen Stacheln besetzt, an der Scha- lenleiste knottig, an der Spin- del glatt.</p>
---	---

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 60. f. 12.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 957. 958. f.*

I. IV. 3.



I. IV. 3. *Murex neritoides*.

*Linn. S. N. Sp. 542.*

I. IV. 3. Das Schmin-  
pflästerchen.

*Belg. Roots - Hoorn met Moesjesjes. Angl. The Coequet. Gall. La Coquette.*

Testa obtuse nodosa, labro  
angulato, columella compla-  
nata, bimaculata.

Die Schale ist mit stumpfen  
Knotten besetzt, an der Schal-  
lenleiste eckig, mit zween Fle-  
cken an der flachgedrückten  
Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 50.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 173. 174.*

*Petiv. Gaz. t. 19. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 66. f. B. B.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 1. f. 30.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 959. 960. f.*

I. IV. 4. *Murex Man-  
cinella*.

I. IV. 4. Die lange  
Maulbeere.

*Linn. S. N. Sp. 544.*

*Belg. Langverpige Maerberzie. Angl. The Mulberry Shell, Hill. Gall. La Mure allongée.*

Testa ovata oblonga, tuber-  
culis acutis muricata, ore  
dentato amethystino.

Die eiförmige längliche  
Schale ist mit spizigen Dör-  
nern bewafnet, mit einer ame-  
thystfarbenen gezähnten Münz-  
dung.

*List.*



- List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 5.*  
*Petiv. Gaz. t. 48. f. 14.*  
*Argenv. Conch. Pl. 17. f. H.*  
*Hill. Hist. of Anim. Pl. 8.*  
*Mart. Konch. Kab. III. 101. t. 970. f.*

I. IV. 5. *Murex Hippocastanum.*

I. IV. 5. Das Pimpelchen.

*Linn. S. N. Sp. 545.*

*Belg. Pimpeltje.*

Testa ovata striata, quadriefariam spinosa, columella umbilicata.

Die eysförmige gestreifte Schale ist mit vier Reihen Stacheln umgeben, und an der Spindel genabelt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 15.*

*Rumph. amb. t. 24. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 31. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 80 — 82.*

*Knor. Vergn. III. 7. t. 3. f.*

—— — V. 4. t. 2. f.

*Mart. Konch. Kab. II. t. 40. f. 398.*

I. IV. 6. *Murex rugosus.*

I. IV. 6. Die runzellichte Knotenschnecke.

Testa



*Testa ovata, longitudinaliter rugosa, striis, carinisque nodosis transuerlis, rostro umbilicato breui.* Die eiförmige, der Länge nach runzelichte Schale ist in die Quere gestreift, und knotig gefielel, mit einem genabelten kurzen Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 124. t. 1155. 1156. f. Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa ovata. Anfractus quinque connati, longitudinaliter rugosi, transuersim striati, & carinati, carinis angulatis. Apertura ovalis columella umbilicata. Rostrum breue, effusum.* Die Schale ist eiförmig. Die fünf Gewinde sind zusammengewachsen, nach der Länge gerunzelt, in die Quere gestreift, mit eckigen Riefen. Die Mündung eiförmig. Die Spindel genabelt. Der Rüssel kurz und ausgeschlitten.

I. IV. 7. *Murex sen-  
ticofus.*

*Linn. S. N. Sp. 546.*

I. IV. 7. Die Distel-  
schnecke.

*Belg. Distel - Hoorntje. Angl. Small prickly Whelk. Petiv.*

*Testa subturrita, longitudinaliter costato muricata, transuersim cancellata, ore striato.* Die einigermaßen gerhürmte Schale ist der Länge nach flachlicht geribbt, in die Quere gegittert, an der Mündung gestreift.

*Bonan. Recr. pl. 3. f. 35.*

*Rumph. amb. 1. 29. f. N.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 9. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 51. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. 0.*

*Seb. Thes. III. t. 49. f. 45 — 47.*

*Knor. Vergn. IV. 23. t. 4. 5. f.*

I. IV. 8. Murex Melon- I. IV. 8. Das Bettzeug.  
gena.

*Linn. S. N. Sp. 547.*

*Belg. Gedoorende Schildpadstaert. Rumph. Angl. The blue & white  
Murex. Hill. Gall. le Lard. Dav.*

Testa pyriformi, spira Die birnförmige Schale hat  
subspinosa prominente, aper- einen hervorragenden einiger-  
tura laevi, maßen dornigen Schnirkel,  
und eine glatte Mündung.

« ventra transuersum spinoso.

« der Leib der Quere nach mit  
Stacheln besetzt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 186. 295.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 24.*

*Rumph amb. t. 24. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 21. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 26. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. H.*



*Seb. Thes. III. t. 72. f. 1 — 9.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 49. f.*

*Knor. Vergn. I. 17. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 391 — 893. f.*

— — — — — 40. t. 394. f.

β ventre sine spinis.

β der Leib ohne Stacheln.

*Rumph. amb. t. 24. f. 3.*

*Petiv. amb. t. 21. f. 8.*

*Knor. Vergn. II. 10. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. II. 39. t. 393. f. 40. t. 395-397f.*

I. IV. 9. *Murex raphi-*  
*formis.*

I. IV. 9. Die dicke  
Rübe.

Belg. Geknobbelde Knoll. Gall. Gros - Radix.

**Testa** pyriformi, spinis fornicatis obtusis, anfractibus carinatis, rostro breui, incuruo, umbilicato. Die birnförmige Schale ist mit hohlen stumpfen Stacheln besetzt, mit keilsförmig erhabenen Gewinden, und einem kurzen krummen genabelten Rüssel.

**Testa** pyriformis, ponderosa. Anfractus sex, transversim striati, carinati, carina spinis; fornicatis obtusis. Die Schale ist birnförmig, und schwer. Die sechs Gewinde sind gestreift, und keilsförmig, am Rüssel





sis coronata. Sutura canaliculata. Spira pyramidata. Labrum incisum transversim striatum. Columella umbilicata; umbilicus latus, profundus, lamellosus, incurvatus. Rostrum breve inflexum.

mit hohlen stumpfen Stacheln gekrönt; Die Nuth rinnenartig ausgehöhlet; Der Schnirkel pyramidenförmig; Die Schalenleuze inwendig in die Quere gestreift. Die Spindel genabelt; der breite, tiefe, und blätterichte Nabel ist in einen kurzen krummen Rüssel gebogen.

subspinosa albida.

„weiß, mit unvollkommenen Stacheln.

*Knor. Vergn. V. 21. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 750. f.*

foliaseo spinosa, fusca.

ß braun, mit Blättern und Stacheln besetzt.

*Mart. Konch. Kab. III. 68. t. 754. 755. f.*

I. IV. 10. Murex laceus.

I. IV. 10. Der ausgeschnittene Morgenstern.

Testa ovata, oblonga, striata; infractibus carinatis, spinosis; labro antice soluto; columella perforata.

Die eysförmige länglichte gestreifte Schale hat tielförmige stachelichte Gewinde, eine vorne ausgeschnittene Schalenleuze, mit einer durchbohrten Spindel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. II.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 56 — 58.*



*Seb. Thes. III. t. 60. f. 30 — 32.*

*Mart. Konch. Kab. III. 100. t. 95 I. f.*

Testa ovata, utrinque attenuata. Anfractus quinque, transuersim carinati; carina spinis obtusis muricata. Ventris cingula spinosa bina. Apertura ovato oblonga. Labium antice sinu a columella solutum. Columella umbilicata. Color ex pallido roseus.

Die eysförmige Schale ist beiderseits zugespitzt. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, und keilsförmig, an dem Kiele mit stumpfen Stacheln besetzt. Um den Leib sind zweien stachelichte Bänder. Die Mündung ist länglicht eysförmig. Die Schalenleste vorne durch einen Ausschnitt von der Spindel getrennet. Die Farbe ist blaß rosenroth.

I. V. Rostro recto elongato.

I. V. Mit einem geraden verlängerten Rüssel.

I. V. I. Murex babylonius.

I. V. I. Der Babelsthurm.

*Linn. S. N. Sp. 549.*

*Belg. Babilonse Tooren. Rumph. The Babel Shell. Pet. Gall. L. Tour de Babel. Dav.*

Testa turrita, cingulis acutis maculatis, labro fisso, rostro elongato recto.

Die gethürmte Schale ist mit scharfen gefleckten Gürteln umgeben, an der Schalenleste gespalten, mit einem verlängerten geraden Rüssel.

*List. Hist. Conch. L. 4. f. 14. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 29. f. L.*

*Gualt. Test. t. 52. f. N N.*



*Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Regenf. Samml. I. 1. t. 9. f.*

*Knor. Vergn. IV. 13. t. 2. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1331. 1332. f.*

I. V. 2. *Murex javanus.* I. V. 2. Die javanische  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 550.*

Testa turrita, transuersum Die gethürmte in die Quer  
striata, asfractibus carinato re gestreifte Schale hat hies  
tuberculatis, labro antice so- förmige knottige Gewinde, und  
luto. eine vorne getrennte Spindel-  
leſze.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 79.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Seb. Thes. III. t. 62. f. 42.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 143. t. 1334. 1335. f.*

I. V. 3. *Murex Colus.* I. V. 3. Die franzöſi-  
sche Spindel.



*Linn. S. N. Sp. 551.*

Belg. Tabaks-Pip. Rumph. Angl. Spindle-Shell. Pet. Gall. Le Fufeau.

Testa turrita, transuersim Die gethürmte in die Que-  
striata, carinato nodosa, labro re gestreifte Schale hat knottiz-  
crenulato, rostro recto elon- ge Kiele, eine gekerbte Spin-  
gato. dellefze, und einen geraden ver-  
längerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 360.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 11.*

*Rumph. amb. t. 29. f. F.*

*Petiv. amb. t. 6. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 52. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. B.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 4. f. 78.*

*Seb. Thes. III. t. 79. 4. 5.*

*Regenf. Samml. I. t. 12. f. 6.*

*Knor. Vergn. III. 5. t. 1. f. 14. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 144. t. 1339—1341. f.*

— — — — — 145. t. 1343—1344. f.

*Müll. Linn. Naturf. IV. 1. B. 17. t. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 4. f. 4.*

I. V. 4. Murex Mo-  
rio.

I. V. 4. Der bandirte  
Möhr.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 552.*

Testa ventricosa nigra, fasciis transuersa alba, spiraele haet ein weißes Querband, anfractibus nodosis, columella und knottige Schnirkelgewinde mit einer runzelichten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 357.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 31.*

*Seb. Tbes. III. t. 80. f. plurimae.*

*Regenf. Samml. I. II. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. 20. t. 1. f.*

—— II. 6. t. 2. f.

—— *Del. nat. I. t. B. V. f. 4.*

*Mart. Koncb. Kab. IV. 139. t. 1300. f.*

I. V. 5. Murex Cochlidium.

I. V. 5. Die indische Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 553.*

*Belg. Indian. Gall. L'Indien.*

Testa ventricosa, transuersim sulcata, anfractibus spinis coronatis, rostro elongato recto. Die bäuchige Schale ist der Quere nach gefurchet, an den Gewinden mit Stacheln gekrönt, mit einem verlängerten geraden Rüssel.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Argenv. Conch. Pl. o. f. A.*

*Seb. Tbes. III. t. 57. f. 27. 28.*

*Knor. Vergn. VI. 15. t. 4. f. 3; 26. t. 2. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 143. t. 1333. f.*

I. V. 6. *Murex Spirillus.*

I. V. 6. Die langschne-  
belige Rube.

*Linn. S. N. Sp. 554.*

*Belg. Langgestarte gladde Knoll. Gall. Maisüe lifse.*

*Testa ventricosa, spira acuminata, anfractibus acute marginatis, columellae labio expanso.*

Die bäuchige Schale hat einen zugespizten Schnirkel, scharfrandige Gewinde mit einer ausgebreiteten Schalenselze.

*Knor. Vergn. VI. 24. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. III. 115. t. 1069. f.*

I. V. 7. *Murex canaliculatus.*

I. V. 7. Die gezackte  
Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 555.*

*Belg. Raap. Gall. Navet a longue queue.*

**Testa**



Testa ventricosa, spirae an-  
fractibus canaliculo diuinc-  
tis.

Die Gewinde der bäuchigen  
Schale sind mit einer Rinne  
von einander abgesondert.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 13. f. 2.*

*Valent. Abb. II. t. 92. f.*

*Gualt. Test. t. 47. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 68. f. 22.*

*Knor. Delic. nat. I. t. B. VI. f. 4.*

*Mart. Konch. Kab. III. 67. t. 742. 743. f.*

I. V. 8. Murex per-  
versus.

I. V. 8. Die linksge-  
wundene Feige.

*Linn. S. N. Sp. 557.*

*Angl. The pointed Murex. Hill. Gall. Buccin unique. Argenv.*

Testa ventricosa, anfracti-  
bus sinistrorsis, spinoso coro-  
natis, rostro elongato recto.

Die bäuchige Schale hat  
links gewundene mit Stacheln  
gekrönte Windungen, und einen  
geraden verlängerten Rüssel.

*Gualt. Test. t. 30. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 15. f. F.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



I. V. 9. Murex pugi-  
linus.

I. V. 9. Das unächte  
Fleischhorn.

Testa ventricosa, anfractibus  
canaliculatis, acute coronatis,  
rostro recto, extus transuersim  
fulcato.

Die bäuchige Schale hat  
rinnenartig ausgefehlte, und  
spizig gekrönte Windungen,  
mit einem geraden auswändig  
in die Quere gefurchten Rüs-  
sel.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 13. f. infra 6.

Gualt. Test. t. 47. f. B.

Knor. Vergn. I. 30. t. 1. f.

Mart. Conch. Kab. IV. 152. t. 1323. 1324. f.

Testa ventricosa, crassa. Anfrac-  
tus septem, infra futuram canali-  
culati, in medio carinati; carina  
spini acuti breuibus coronata. Ven-  
ter laevis, spira, & rostrum re-  
ctum, transuersim undulato striata.  
Columella subumbilicata. Color  
fulvus, aut pallide luteus.

Die Schale ist bäuchich, und  
dick. Die sieben Gewinde sind un-  
ter der Naht rinnenartig ausgefeh-  
let, in der Mitte keilförmig erha-  
ben, und allda mit kurzen spizi-  
gen Stacheln gekrönt. Der Leib  
ist glatt, der Schnirkel, und der  
gerade Rüssel in die Quere wellen-  
förmig gestreift. Die Spindel ei-  
nigermassen genabelt. Von gelb-  
rother, oder bläßgelber Farbe.

I. V. 10. Murex arua-  
nus.

I. V. 10. Die zweykie-  
lige Spindel.

Linn. S. N. Sp. 556.

Testa





Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus bicarinatis, rostro le hat zwey erhabene rielförmige  
 elongato, Gürteln, und einen verlängerten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 101.*

*Rumph. amb. t. 28. f. A.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 138. t. 1295. 1296. f.*

I. V. II. Murex de- I. V. II. Die nordi-  
 spectus. sche Spindel.

*Linn. S. N. Sp. 559.*

*Belg. Noordsche Wulk. Angl. The common english Whelk. Da Cost.*

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige Scha-  
 anfractibus teretibus, rostro le hat runde Gewinde, und ei-  
 recto. nen geraden Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 190.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 4; f. 15. f. 15.*

*Linn. It. westg. t. 5. f. 8.*

*Seb. Thes. III. t. 83. f. 3 — 6.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3 — 5.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1292. 1294. f.*

I. V. 12.



I. V. 12. Murex Tritonis.

I. V. 12. Die Tritons-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 560.

Belg. Kink-Hoorn, Rumph. Angl. Tritons - trumpet. Pet. Gall.  
Trompe marine Dav.

Testa oblonga, anfractibus teretibus, prope suturam crenulatis, varicibus longitudinalibus, apertura denticulata. Die längliche Schale hat runde an der Naht gekerbte Windungen, mit nach der Länge laufenden Näthen, und einer gezähnelten Mündung.

Sulci transversi, striati. Apex roseus. Nach der Quere laufen gestreifte Furchen. Die Spitze ist rosenroth.

α attenuata rosea, & lutescens α schmal, von rosenrother, oder immaculata. gelblicher Farbe ohne Flecken.

Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1278. 1279-f.

β ventricosa, albo fuscoque variegata. β bäuchig, weiß und braun gefleckt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 188.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 12. 13.

Rumph. amb. t. 28. f. B.

Petiv. Gaz. t. 12. f. 15.

Gualt. Test. t. 48. f. A.

Seb.



Seb. Tbes. III. t. 81. f. omnes.

Knor. Vergn. II. 16. t. 2. 3. f.

—— — V. 5. t. 1. f.

—— Del. nat. I. t. B. VI. f. 1.

Mart. Konch. Kab. IV. 134. t. 1277. f.

—— — 136. 1282. 1283. f.

I. V. 13. Murex Pufio.

I. V. 13. Die gefleckte Spindel.

Linn. S. N. Sp. 561.

Belg. Gnemoe-Hoorn,

Testa oblonga, ventricosa, laeui, anfractibus rotundatis, apertura laeui, rostro breui.

Die längliche bäuchige glatte Schale, hat runde Gewinde, eine glatte Mündung, samt einem kurzen Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 40.?

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 7.

Gualt. Test. t. 52. f. 7.

Knor. Vergn. IV. 21. t. 7. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 97. t. 1357. f.

I. V. 14. Murex accinctus.

I. V. 14. Die Gürtelspindel.

Testa



Testa fusiformi, laeui, fusca, anfractibus conuexis, fascia articulata alba, rostro recto breui.

Die spindelförmige glatte Schale hat an den bäuchigen Gewinden einen gegliederten weißen Gürtel, mit einem kurzen geraden Rüssel.

*Mart. Konch. Kab. IV. 127. t. 1281. 1219. f.*

Testa fusiformis, laevis. Anfractus octo conuexi, attenuati, connati. Apertura ouato oblonga. Labrum intus striatum. Columella laevis, supra plica una transuersa. Basis extus transuersim striata, constituens rostrum abbreviatum, rectum. Color atro fuscus, cingulo angusto anfractuum albo, lineis angulatis rufis articulado.

Die Schale ist spindelförmig und glatt. Die acht bäuchigen zusammengewachsenen Gewinde verbinden sich. Die Schalenleiste ist innwändig gestreift. Die Spindel glatt, und oben mit einer Quersalte versehen. Der Grund ist von außen in die Quere gestreift, und bildet einen geraden verkürzten Rüssel. Von schwarzbrauner Farbe mit einer weißen schmalen Quersbinde, die durch rothbraune Bindelzüge unterbrochen wird.

I. V. 15. Murex vulpinus.

I. V. 15. Die rothbraune Spindel.

Testa oblonga, ventricosa, glabra, basi, anfractuumque marginibus striatis, rostro breui, torto.

Die längliche bäuchige glatte Spindel ist an dem Rande der Windungen gestreift, und mit einem kurzen gedrehten Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa oblonga. Anfractus octo  
laeues, teretiusculi, prope futuram  
transuersim striati. Venter conue-  
xus subtus transuersim striatus,  
definens in rostrum breue extus in-  
tortum. Apertura laevis. Color ex  
fusco ruber.

Die Schale ist länglich. Die  
acht Gewinde glatt, rund, an der  
Nath in die Quere gestreift. Der  
erhabene Leib ist unten der Quere  
nach gestreift, und endiget sich in  
einen kurzen, auswändig gedrehten  
Rüssel. Die Mündung ist glatt.  
Von braunrother Farbe.

I. V. 16. Murex Tuli-  
pa.

I. V. 16. Die Achat-  
birne.

Linn. S. N. Sp. 562.

Belg. Agaate - Peer. Rumph. Gall. L'Agathine. Dav.

Testa oblonga ventricosa, Die längliche bäuchige glatte  
laeui, anfractibus rotundatis, Schale hat runde mit einer  
futura geminata, columella uni- zweyfachen Nath versehene Ge-  
plicata, rostro patulo striato. winde, mit einer Falte an der  
Spindel, samt einem erweiter-  
ten gestreiften Rüssel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 187.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. I. 2.

Rumph. amb. t. 49. f. H.

Gualt. Test. t. 46. f. A.

Argenv. Conch. Pl. 13. f. K.

Seb. Thes. III. t. 71. f. 23 — 31.

Regenf. Samml. I. 9. t. 35. f.



*Knor. Vergn. V. 18. t. 5. f.*

— — — *VI. 29. t. 1. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 136. t. 1286. f.*

— — — — — *137. t. 1288. 1289. f.*

I. V. 17. *Murex Dolarium.*

I. V. 17. Die Vortreppe.

*Linn. S. N. Sp. 564.*

*Belg. Bostrappen.*

Testa ventricosa, costis obtusis angulatis, labro plicato, columella umbilicata.

Die bäuchige Schale hat stumpfe, eckige Rippen, eine gefaltene Spindelöffnung, samt einer genabelten Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 347.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 11.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 5. f.*

I. V. 18. *Murex lignarius.*

I. V. 18. Die Splzspindel.

*Linn. S. N. Sp. 566.*

Testa



Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat longitudinaliter plicatis , ob- stumpfknottige nach der Länge tuse nodosis , rostro abbrevia- gefaltene Windungen mit einem to. verkürzten Schnabel.

Fulva , fascia ventris niuea.

Rotthgelb, mit einer weißen Quer-  
binde um den Leib.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 32.*

*Seb. Thes. III. t. 52. f. 4.*

*Knor. Vergn. VI. 20. t. 7. f.*

I. V. 19. Murex Tra-  
pezium.

I. V. 19. Die Band-  
spindel.

*Linn. S. N. Sp. 567.*

*Belg. Gebaande Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le Tapis. Day.*

Testa oblonga , anfractibus Die längliche Schale hat carinato angulatis , apertura fielförmige eckige Windungen, dentata , rostro recto. eine gezähnte Mündung, mit einem geraden Schnabel.

Lineis transuersis , geminatis fus- Mit gepaarten braunen Quere-  
cis. streifen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 287.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 26.*

*Rumph. amb. t. 49. f. K.*



*Gualt. Test. t. 46. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 10. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 79. f. 1.*

*Knor. Verg. IV. 20. t. 1. f.*

— — — *V. 10. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 139. t. 1298. 1299. f.*

I. V. 20. *Murex craticulatus.*

I. V. 20. Die Wellenspindel.

*Linn. Sp. N. Sp. 569.*

Testa fusiformi longitudinaliter rugosa, cingulis elevatis acutis, labro dentato, rostro recto.

Die spindelförmige Schale ist der Länge nach gerunzelt, und in die Quere mit erhabenen scharfen Ringen umgürtet, an der Schalenleiste gezähnt, mit einem geraden Küssel.

*Nivea, maculis longitudinalibus croceis.*

Schneeweiß, mit nach der Länge laufenden safranrothen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 22.*

*Knor. Vergn. II. 3. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 149. t. 1382. 1383. f.*

I. VI.





I. VI. Turriti, rostro breui.

I. VI. Gethürmte, mit kurzem  
Rüssel.I. VI. I. Murex Verta-  
gus.I. VI. I. Die Schnau-  
zennadel.*Linn. S. N. Sp. 571.**Belg. Witte Tuitje. Rumph. Angl. White Inoured Peg. Petiv. Gall.  
Chenille blanche. Dav.*

Testa turrita, anfractibus su- Die gethürmte Schale hat  
perne plicatis, rostro ascen- oben gefaltene Bindungen, ei-  
dente, columella biplicata. nen aufgerichteten Rüssel, und  
zwo Falten an der Spindel.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 84.**List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 83.**Petiv. Gaz. t. 56. f. 4.*

— amb. t. 13. f. 14.

*Rumph. amb. t. 30. f. K.**Gualt. Test. t. 57. f. D.**Argenv. Conch. Pl. II. f. P.**Adans. Seneg. Pl. 10. f. 2.**Knor. Vergn. III. 20. t. 3. f.*

— — V. 15. t. 6. f.

— — VI. 40. t. 4. 5. f.

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 28.**Müll. Linn. Naturfyst. VI. B. 17 t. 4 f.*



*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1479. f.*

— — — — — 157. t. 1480. 2488. f.

**I. VI. 2. Murex sulcatus.**

**I. VI. 2. Die Mangos-  
nadel.**

*Belg. Mauger - Naalde. Rumph. Angl. Mango's Peg. Pet.*

<p>Testa turrita, longitudinaliter rugosa, transuersim sulcata, labro ampliato, rostro breuissimo recto.</p>	<p>Die gethürmte Schale ist in die Länge gerunzelt, der Quere nach gefurchet, an der Schalenlefze ausgebreitet, mit einem sehr kurzen geraden Rüssel.</p>
--	---

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 68.*

*Rumph. amb. t. 30. f. T.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 22.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484 - 1485. f.*

Testa turrita. Anfractus undeni, decliues, plani, longitudinaliter rugosi, transuersim sulcati. Labrum ampliatum, acute marginatum, antice solutum. Columella vix labiata. Angulo labro opposito. Rostrium breuissimum, rectum. Color fuscus.

Die Schale ist gethürmet. Die elf Gewinde sind abhängig flach, nach der Länge mit Runzeln, in die breite mit Furchen besetzt. Die Schalenlefze ist ausgebreitet, scharf-randig und vorne abgesondert. An der Spindel ist kaum eine Lefze. Der Schalenlefze gegen über steht eine hervorragende Ecke. Der Rüssel ist sehr kurz und gerad. Die Farbe braun.



I. VI. 3. Murex gibbo-  
fus.

I. VI. 3. Die höckerige  
Stachelnadel.

Testa turrita anfracti-  
bus marginatis, ventre gibbo;  
labro fillo, denticulato, ro-  
stro breui.

Die gethürmte Schale ist an  
den Windungen eingesäumet,  
auf dem Rücken höckerig, an  
der gespaltenen Schalenlefze ge-  
zähnel, und mit einem kurzen  
Rüssel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter  
nouem transuersim striati, plicis  
longitudinalibus decussati, supra  
prope futuram compresso margina-  
ti. Venter tubere dorsali gibbus.  
Apertura oblonga Labrum supra  
sinu transuerso lato fissum, mar-  
gine denticulatum Columella re-  
plicata, laeuis. Rostrum rectum,  
breue. Color albus, maculis pal-  
lide rubris.

Die Schale ist gethürmet. Die  
Gewinde, deren beiläufig neun sind,  
gestreift, mit nach der Länge  
laufenden Falten durchkreuzet, und  
oben an der Naht mit einem ein-  
gedrückten Rande versehen. Der  
Leib hat auf dem Rücken einen Hö-  
cker. Die Mündung ist länglich.  
Die Schalenlefze durch einen breit-  
Querausschnitt gespalten, am Ran-  
de gezähnel. Die Spindel ist über-  
geschlagen, und glatt. Der Rüssel  
gerad, und kurz. Von weißer Far-  
be mit blaßrothen Flecken.

I. VI. 4. Murex Aluco.

I. VI. 4. Die gefürchte  
Dornsindel.

*Linn. S. N. Sp. 572.*

*Belg.* West Indische Pause - Kroon. *Rumph.* *Angl.* Knopped Popes  
Crown. *Petiv.*



Testa turrita, anfractibus transuersim sulcatis in medio tuberculatis, columella uniplicata, rostro ascendente.

Die gethürmte Schale hat nach der Quere gefurchte, in der Mitte mit Knoten besetzte Gewinde, zwei Falten an der Spindel, und einen aufgerichteten Rüssel.

α albidā.

α weißlich.

β alba, maculis lineisque fuscis.

β weiß, mit braunen Flecken und Strichen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 67.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 87.*

*Rumph. amb. t. 30. f. 0.*

*Petiv amb. t. 7. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 57. f. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 51. f. 25. t. 50. f. 15. 16.*

*Knor. Vergn. I. 16. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1473. 1474. f.*

I. VI. 5. Murex coronatus.

I. VI. 5. Die gedornete Schnepfennadel.

*Belg. Gedoornde Snuite Pen. Rumph. Angl. The rougheren Shell. Hill.*

Testa



Testa turrita, substriata, an- Die gethürmte Schale ist  
fractibus coronatis, columella einigermaßen gestreift, an den  
uniplicata, rostro ascendente. Gewinden gekrönt, mit einer  
Falte an der Spindel, und ei-  
nen aufgerichteten Rüssel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 69. -*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 15. f. 79.*

*Rumph. amb. t. 30. f. N.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 23.*

*Gualt. Test. t. 57. f. A.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Knor. Vergn. III. 16. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 156. t. 1478. f.*

Testa turrita substriata. Anfrac-  
tus undeni, subtus laeues, in me-  
dio spinis procumbentibus corona-  
ti, prope futuram attenuati. Aper-  
tura, & rostrum praecedentis. Color  
albidus, maculis latis, fuscis,

Die Schale ist gethürmet, und  
einigermaßen gestreift. Die drei  
Gewinde sind unten glatt, in der  
Mitte mit darnüberliegenden Le-  
nern gekrönt, nächst der Mündung  
verengert. Die Mündung und der  
Rüssel ist wie bei der vorhergehenden  
Art. Weißlich mit braunen Fle-  
cken.

I. VI. 6. Murex littera-  
tus.

I. VI. 6. Die Buchsta-  
bennadel.

Testa ventricosa turrita, ni-  
gro maculata, columella uni-  
plicata, rostro breui.

Die bäuchig gethürmte  
schwarzgeleckte Schale hat an  
der Spindel eine Falte, und  
einen kurzen Rüssel.



List. Hist. Conch. l. 4. f. 15 f. 89.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa ventricosa, turrata. Anfractus circiter octo coaliti, supra prope futuram spinis erectis brevibus muricati. Apertura ampliata. Columella uniplicata, Rostrum breve, rectum. Color niueus, maculis punctatis, characteres nonnquam aemulantibus, nigris.

Die Schale ist häuchig und gethürmet. Die acht Gewinde sind zusammengewachsen, und oben mit kurzen aufgerichteten Dornen besetzt. Die Mündung ist erweitert. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Rüssel ist kurz, und gerad. Die Farbe schneeweiß, mit schwarzen punktirten Flecken, die bisweilen buchstabenähnliche Zeichnungen bilden.

I. VI. 7. Murex fuscaeus.

Linn. S. N. Sp. 573.

I. VI. 7. Die gezackte Besansspindel.

Belg. Getaakte Bezaanknop. Gall. Obelisce chinoise. Dav.

Testa turrata, anfractibus spinosis, prope futuram crenulatis, basi planiuscula.

Die gethürmte Schale hat stachelichte, an der Muth gekerbte Windungen, und einen etwas flachen Boden.

α alba.

α weiß.

β ex fusco luteo.

β braungelb.

γ atro fusca.

γ schwarzbraun.

Gualt. Test. t. 56. f. E. H.

Argenv. Conch. Pl. II, f. L.

Knor.



*Knor. Vergn. III. 26. t. 4. 5. f.*

I. VI. 8. *Murex Radula.* I. VI. 8. Die Nadel-  
feile.

*Linn. S. N. Sp. 575.*

*Testa turrita, anfractibus serie triplici punctatis, basi planiuscula sulcata.* Die gethürmte Schale hat auf den Gewinden eine dreysache Reihe hervorstehender Punkte, mit einem etwas flachen gefurchten Boden.

$\alpha$  alba:

$\alpha$  weiß.

*Knor. Vergn. III. 15. t. 3. f.*

$\beta$  cingulis albis, rufis, fuscisque.

$\beta$  mit weißen, rothbraunen und dunkelbraunen Gürteln bemalt.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 327.*

*Gualt. Test. t. 58. f. F.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

I. VI. 9. *Murex atratus.* I. VI. 9. Die schwarze  
Stachelnadel.

*Testa turrita, atra, anfractibus transversim striatis, tuberculatis, columella uniplicata, rostro recto.* Die gethürmte schwarze Schale hat knottige, in die Quere gestreifte Windungen, eine Falte an der Spindel, mit einem geraden Rüssel.



*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus decem, coaliti, transversum striati, duplici tuberculorum acutorum, & brevium serie cincti. Apertura oblonga. Labrum dilatatum, crenulatum. Columella uniplicata. Angulus labri margini oppositus. Rostrum rectum, breue. Color, ater, nitens.

Die Schale ist gethürmet. Die zehn Gewinde sind zusammenge wachsen, und mit einer doppelten Reihe kurzer spiziger Körnchen umgeben. Die Mündung ist länglich. Die Schalenleiste erweitert, und fein gekerbet. Die Spindel hat eine Quersalte. Der Spindelkehl gegenüber steht eine hervorragende Ende. Der Rüssel ist gerad und kurz. Die Farbe ist glänzend schwarz.

**K. Trochus.**

**K. Die Kräuselschnecke.**

Testa spiralis. Apertura angulata, coarctata. Columella obliquata.

Die Schale ist schnirfelförmig gewunden. Die Mündung eckig, und eingefaßt. Die Spindel steht etwas schief.

K. I. Columella perforata.

K. I. Mit durchbohrter Spindel.

K. I. I. Trochus niloticus.

K. I. I. Die glatte Pyramide.

*Linn. S. N. Sp. 579.*

*Belg.*





Belg. Gevlakte Tol. Rumph. Angl. The great waved Top. Pet.  
all. Le Sabot marbré. Argenv.

Testa conica, anfractibus Die kegelförmige Schale hat  
onuxiusculis laevibus, co- einigermaßen erhabene glatte  
mella perforata. Gewinde, und einen durchbohr-  
ten Spindel.

Bonan. Recr. cl. 3. t. 102.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 3.

Rumph. amb. t. 21. f. A.

Gualt. Test. t. 59. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. C.

Gev. Belust. 5. t. 33 — 35.

Regenf. Samml. I. 4. t. 42. f.

Knor. Vergn. I. 12. t. 1. f.

—— — II. 5. t. 1. f. ; 6. t. 1. f.

K. I. 2. Trochus macu-  
latus.

Linn. S. N. Sp. 580.

K. I. 2. Die knottige  
Pyramide.

Belg. Bagyne - Drolle. Rumph.

Testa conica, tuberculata,  
umbilico obliquo, labio bi-  
lobo.

Die kegelförmige klein-  
knotige Schale hat einen schiefen  
Nabel, und einen zweifachen  
Lappen an der Schalenlippe.



α conica, anfractibus transuersim  
striatis; albida, rubro maculata.

α kegelförmig, mit in die Quere gestreiften Windungen; weiß mit rothen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. E.*

*Knor. Vergn. II. 2. t. 4. 5. f.*

*Müll. Linn. Nat. Syst. VI. 1. B. 18. t. 1. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 20.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 13.*

β conica, anfractibus oblique rugosis, prope futuram compressis; alba, viridisque, rubro maculata.

β kegelförmig, mit schiefrungetlichen, an der Naht zusammengedrückten Windungen; weiß, und grün, mit rothen Flecken.

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 8. f. 5.*

*Rumph. amb. t. 21. f. 3.*

*Gev. Belust. 7. t. 52 f.*

γ conica attenuata, anfractibus transuersim striatis, prope futuram compressis; viridis fusco maculata.

γ spitzkegelförmig, mit in die Quere gestreiften, an der Naht zusammengedrückten Windungen; grün mit braunen Flecken.

*Gualt. Test. t. 61. f. D. D.*

*Gev. Belust. 7. t. 48. f.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 13. f.*



K. I. 3. Trochus per-  
fectius.

K. I. 3. Die Perspektiv-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 581.*

*Belg. Perspectiv - Hoorn. Rumph. Angl. Spinner - Shell. Petiv. Gall.  
Cadran. Dav.*

Testa conuexo conica, an-  
tibus decussatim striatis,  
umbilico lato crenato.

Die gewölbt kegelförmige  
Schale hat kreuzweise gestreif-  
te Bindungen, und einen wei-  
ten gekerbten Nabel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 27. 28.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 24.*

*Rumph. amb. t. 27. f. L.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 65. f. O.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.*

*Gev. Belust. 25 t. 266 — 272 f.*

*Seb. Thes. t. 40. f. 1, 2, 13, 14, 28, 41, 42.*

*Regenf. Samml. I. 6. t. 61. f.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 1. 2. f.*

K. I. 4. Trochus pharao-  
ius.

K. I. 4. Die Pharao-  
schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 584.*

*Belg.*



Belg. Pius Roberts Knop, Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testo subouata, striata, Die fast euförmige gestreifte  
 punctis concatenatis globosis, Schale ist mit kettenförmig an-  
 columella labioque dentato, einanderstehenden runden Kör-  
 umbilico crenato. nern umgeben, an der Spin-  
 del und Schalenfalte gezähnt,  
 am Nabel gekerbt.

Bonan. Recr. pl. 3. f. 222.?

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 28.

Petiv. Gaz. t. 14. f. 10.

Gualt. Test. t. 63. f. B.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. L. Q.

Adans. Seneg. Pl. 12. f. 2.

Gev. Belust. 13. t. 101 — 107. f.

Knor. Vergn. I. 30. t. 6. f.

— — — IV. 26. t. 3. 4. f.

K. I. 5. Trochus Magus. K. I. 5. Der Heren-  
 meister.

Linn. S. N. Sp. 585.

Belg. Tovenaar. Gall. Le Sorciere. Dav.

Testa umbilicata striata: Die genabelte und gestreifte  
 anfractibus supra plicatis. Schale hat an dem Oberrande  
 gefaltene Windungen.

Gualt.



Gualt. Test. t. 64. f. C.

Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.

Gev. Belust. 13. t 127. f.

Knor. Vergn. VI. 27. t. 4. f.

K. I. 6. Trochus cine-  
arius.

Linn. S. N. Sp. 590.

Testa umbilicata, conica,  
anfractibus prope futuram ca-  
aliculatis.

K. I. 6. Der schieffstrah-  
lige Kräusel.

Die genabelte kegelförmige  
Schale ist an der Muth aus-  
gekehlet.

Alba, fasciis oblique fuscis.

Weiß, mit schiefen braunen Quer-  
bändern.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 7. Trochus umbi-  
licatus.

Linn. S. N. Sp. 592.

Testa conuexa, conica,  
anfractibus substriatis, umbi-  
lico cylindraceo.

K. I. 7. Die Wirbel-  
schnecke.

Die gewölbte kegelförmige  
Schale hat gestreifte Gewinde  
und einen walzenförmig aus-  
gehöhlten Nabel.

Mus. Caes. Vindobon.

K. I. 8.



K I. 8. Trochus fascia-  
tus.

K. I. 8. Die gebänderte  
Kräuselschnecke.

Testa conica, laevi, an-  
fractibus rotundatis supra com-  
pressis, umbilico profundo, la-  
bro crenulato.

Die kegelförmige glatte  
Schale hat rundliche oben ein-  
gedrückte Gewinde, einen tie-  
fen Nabel, mit einer gekerb-  
ten Spindelleiste.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica. Anfractus quin-  
que rotundati, supra prope suturam  
complanati. Umbilicus verticalis  
profundus. Labium crenulatum.  
Color albidus, fusco maculatus, fas-  
cia transversa rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Ihre  
fünf rundliche Gewinde sind oben  
an der Naht etwas flach gedrückt.  
Der Nabel ist tief und senkrecht.  
Die Schalenleiste fein gekerbt. Die  
Farbe weiß mit braunen Flecken,  
und einem rosenrothen Querbande,

K. I. 9. Trochus tessu-  
latus.

K. I. 9. Der Würfel-  
kräusel.

Testa conica, anfractibus  
rotundatis transversim striatis,  
columella obsolete perforata.

Die kegelförmige Schale  
hat rundliche, in die Quere  
gestreifte Windungen, und eine  
durchbohrte Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa conuexo conica. Anfractus quinque transuersim striati, conuexiusculi, decliues. Columella uniloba, replicata, obtegens foramen obliquum, tenue. Color albidus, luteo maculatus, tessulis oblongis purpureis seriatim digestis, infra hunc corticem margaritaceus.

Die Schale ist gewölbt kegelförmig. Die fünf Gewinde sind in die Quere gestreift, etwas bäuchig, und abhängig. Die Spindel hat eine lappenförmige Ecke, und bedeckt durch ihren Ueberschlag das schiefe dünne Nabelloch. Die Farbe ist weiß, mit gelben Flecken, und länglichen purpurrothen reiheweise stehenden Flecken; unter dieser Hinde perlenmutterartig.

K. I. 10. Trochus solaris.

K. I. 10. Das Sonnenhorn.

Linn. S. N. Sp. 593.

Belg. Zonne - Hoorn.

Testa umbilicata complanato conica, anfractibus spinoso radiatis, apertura semicordata,

Die genabelte flachgedrückte kegelförmige Schale hat um die Gewinde stachelichte Strahlen, und eine halb herzförmige Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 366. 367.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 9.

Rumph. amb. t. 20. f. K.

Gualt. Test. t. 65. f. N. P.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. H.

Gev. Belust. 20. t. 192 f.

Knor. Vergn. VI. 26. t. 4. f.



K. II. Imperforati.

K. II. Ohne Nabelloch.

K. II. 1. Trochus Pyramis.

K. II. 1. Die Spizsäule.

Testa conica acuminata; anfractibus imbricatis, seriatim granulosis; columella contorta imperforata.

Die kegelförmige zugespitzte Schale hat ziegelförmig aufeinander liegende, reiheweise mit Körnern besetzte Gewinde, mit einer Krümmungsdrehen und durchbohrten Spindel.

Gev. Belust. 9 t. 68 f.

Knör. Vergn. I. 12. t. 4. f.

Testa conica. acuminata. Anfractus duodecim plani declines, serie transversa triplici granulorum cincti; margine inferiore imbricato, prominente, crenato, acuto. Basis plana, transversum striata. Color pallide virescens, fusco luteo maculatus; infra corticem argenteus.

Die Schale ist kegelförmig und zugespitzt. Die zwölf Gewinde sind abhängig, flach, mit einer dreysachen Reihe Körnchen besetzt, am ziegelförmiggestellten scharfen hervorstehenden Unterrande gekerbt. Der Grund ist flach, und der Quere nach gestreift. Flagggrün mit brannen, oder gelben Flecken; unter der Rinde mit einem silberartigen Glanz.

K. II. 2. Trochus vestiarius.

K. II. 2. Das Wulstknöpfchen.

Linn. S. N. Sp. 594.

Belg. Bultslakja. Gall. Bouton de Camifole. Dav.

Testa





Testa conico orbiculata lae-  
ui, columellae basi callosa.

Die plattkegelförmige schei-  
benrunde Schale hat am Bo-  
den der Spindel einen erha-  
benen Wulst.

$\alpha$  rubella, cingulo albo.

$\alpha$  rötlich, mit einem weißen  
Gürtel.

$\beta$  cinerea, cingulo albo fuscoque.

$\beta$  aschengrau, mit einem weiß  
und braun gegliederten Gürtel.

$\gamma$  alba, radiis obliquatis griseis.

$\gamma$  weiß, mit schiefen hellgrauen  
Strahlen.

$\delta$  plumbea, cingulo albo reticu-  
late.

$\delta$  bleiförmig, mit einem weiß  
gegliederten Gürtel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.

Petiv. Gaz. t. II. f. 6.

Gualt. Test. t. 65. f. E. F. G.

Gev. Belust. 19. t. 189. f.

Knor. Vergn. VI. 22. t. 7. f.

K. II. 3. Trochus La-  
bio.

K. II. 3. Die Dicklippe.

Linn. S. N. Sp. 595.

Belg. Dicklip. Angl. Thick-lip Top. Petiv.



Testa imperforata, ouata, Die undurchbohrte euförmis  
 striato tuberculata, apertura ge mit Streifen und Knotten  
 dentata, incrassata; columel- befezte. Scha'le hat eine gezähnte  
 la unidentata. dicke Lippe, und an der  
 Spindel einen Zahn.

*List. Hist. Conch.* l. 4. f. 8. f. 25. 26.

*Rumph. amb.* t. 21. f. E.

*Petiv. amb.* t. 12. f. 1.

*Gev. Belust.* 18. t. 165. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

K. II. 4. *Trochus tur-*  
*binatus.*

K. II. 4. Der türkische  
 Bund.

*Belg.* Tulbande.

Testa ouata, laeui, anfrac-  
 tibus conuexis, columella uni-  
 dentata, imperforata.

Die euförmige Scha'le hat  
 erhabene Gewinde, mit einem  
 Zahne an der undurchbohrten  
 Spindel.

α alba, maculis oblongis nigris.

α weiß, mit länglichen schwarzen  
 Flecken.

β alba, venulis cingulisque ar-  
 ticulatis nigris.

β weiß, mit schwarzen Adern,  
 und gegliederten Gürteln.

γ alba, venulis, cingulisque ar-  
 ticulatis purpureis.

γ weiß, mit purpurrothen Adern,  
 und gegliederten Gürteln.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 33. 34. 35.*

*Gualt. Test. t. 63. f. D. E. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. N.*

*Gev. Belust. 20. t. 197. 198. 200. 201. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 6. 7. f.*

Testa ovata, Anfractus sex, con-  
uexi, laeues contigui. Apertura  
lunata, laevis. Columellae labium  
unidentatum.

Die Schale ist eiförmig. Die  
sechs Gewinde sind erhaben, glatt,  
und aneinander verwachsen. Die  
Mündung mondförmig, und glatt.  
Die Spindelstelle mit einem Zahne  
versehen.

K. II. 5. Trochus Tu-  
ber.

K. II. 5. Der Knottens-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 596.*

Testa imperforata conica,  
anfractibus subearinatis utro-  
que margine nodosis.

Die Gewinde der undurch-  
bohrten kegelförmigen Schale  
sind einigermaßen kiel förmig,  
und an jedem Rande knottig.

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. R. ?*

*Gev. Belust. 19 t. 179 f.*

*Regenf. Samml. 3. t. 27. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 2. f.*



K. II. 6. Trochus Co-  
nulus.

K. II. 6. Der Schnur-  
bund.

*Linn. S. N. Sp. 598.*

Testa imperforata conica  
striata; anfractibus linea ele-  
uata interstinclis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige gestreifte Schale hat  
die Gewinde durch eine erhas-  
bene Querlinie abgesondert.

*List. angl. t. 3. f. 15.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 91. 99.*

*Gualt. Test. t. 61. f. M.*

*Klein. Meth. Ostrac. t. 2. f. 36.*

*Gev. Belust. 9. t. 69, 70. f.*

*Knor. Vergn. VI. 27. t. 5. f.*

K. II. 7. Trochus Zy-  
ziphinus.

K. II. 7. Der Zuzubens-  
kräusel.

*Linn. S. N. Sp. 599.*

Testa imperforata, conica,  
laevi, anfractibus marginatis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige glatte Schale hat ein-  
gesäumte Windungen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 93.*

*Rumph. amb. t. 21. f. I.*



Gualt. Test. t. 91. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 9. f. N.

Knor. Vergn. III. 14. t. 2. 3. f.

K. II. 8. Trochus grā-  
nulus.

K. II. 8. Der gekörnte  
Kräusel.

Testa imperforata, conica,  
striis transversis tenuissimis, &  
granulatis, alternatim majo-  
ribus; futuris emarginatis.

Die undurchbohrte kegelför-  
mige Schale ist der Quere nach  
mit dünnen, und fein gekörn-  
ten Streifen von abwechseln-  
der Größe umgürtet, und an  
den Näthen eingesäumt.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, ventricosa. An-  
fractus circiter decem, transversim  
striati; striis alternatim majoribus,  
& granulis moniliformi serie cin-  
ctis, supra prope futuram linea ele-  
vata marginatis. Basis convexius-  
cula, striis majoribus rufo articu-  
latis. Color griseus, faux marga-  
ritacea.

Die Schale ist kegelförmig häu-  
schig. Die Gewinde, deren unge-  
fähr zehn, sind in die Quere ge-  
streift; die Streifen wechselweise  
größer, mit Perlenketten umge-  
ben, oben an den Näthen mit ei-  
ner erhabenen Linie eingesäumt.  
Der Boden ist etwas häuchig, an  
welchem die größern Streifen roth-  
braun geädert sind. Von hell-  
grauer Farbe, mit einem perlen-  
mutterartigen Schlunde.

K. II. 9. Turbo croca-  
tus.

K. II. 9. Der Safran-  
Kräusel.

= Trochus see last page errata



Testa imperforata conica, Die undurchbohrte kegelför-  
laeui, futura sulcata, anfrac- mige Schale hat eine gefurch-  
tibus conuexis, spira crocea. te Nath, gewölbte Windun-  
gen, mit einem safranrothen  
Schnirkel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa conica, laevis. Anfractus Die Schale ist kegelförmig, und  
circiter quinque convexi, sulco su- glatt. Ungefähr fünf erhabene  
turali intertincti. Basis conuexa. Gewinde, die an der Nath mit ei-  
Columella angulata, replicata, te- ner Furche von einander abgezo-  
gens foramen obsoletum. Color dert sind. Der Grund ist bäuchig.  
basis, & epidermidis nitens albus, Die eckige, übergeschlagene Spinz-  
spirae sub epidermide croceus. del deckt ein undeutliches Nabel-  
loch. Der ganze Grund und die  
Oberhaut ist glänzend weiß, der  
Schnirkel unter der Oberhaut sa-  
franroth.

K. III. Turriti, columella exserta,

K. III. Gethürmte, mit hervor-  
ragender Spindellese.

K. III. I. Trochus Te-  
lescopicum.

K. III. I. Die See-  
tonne.

*Linn. S. N. Sp. 600.*

*Belg. Zeeton. Rumph. Angl. Indian Whirligig. Petiv. Gall. Le Te-  
lescope. Dav.*

Testa imperforata turrita, Die undurchbohrte gethürm-  
striata, columella exserta spi- te und gestreifte Schale hat ei-  
rali. ne hervorragende gewundene  
Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 92.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 10.*

*Rumph.*



*Rumph. amb. t. 21 f. 12.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 10.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. B.*

*Seb. Thes. III. t. 50. f. 1 — 12.*

*Knor. Vergn. III. 22. t. 2. 3. f.*

— *Del. nat. I. t. B. IV. f. 9.*

K. III. 2. Trochus do-  
labratus.

K. III. 2. Die Schiffs-  
fahne.

*Linn. S. N. Sp. 601.*

*Belg. Vlaggetje.*

Testa umbilicata turrata,  
glabra; columella exserta, re-  
curvata, triplicata.

Die genabelte gethürmte glat-  
te Schale hat eine hervorra-  
gende gedrehte, mit drey Fal-  
ten versehene Spindel.

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. L.*

*Knor. Vergn. VI. 29. t. 2. f.*

L. Turbo.

L. Die Mondschnecke.

Testa spiralis, apertu-  
ra coarctata, rotunda, in-  
tegra.

Die schnirkelförmig ge-  
mundene Schale hat eine  
eingefasste, runde, ganz-  
randige Mündung.



L. I. Imperforati, columella plana.

L. I. Undurchbohrte mit einer flachen Spindel.

L. I. 1. Turbo littoreus.

L. I. 1. Die Strandschnecke.

Linn. S. N. Sp. 607.

Belg. Aliëkruiken. Angl. Couvin. Gall. Bigourneau.

Testa subovata transuersim fasciata, columella plana.

Die etwas eiförmige Schale ist der Quere nach mit Bändern umgeben, und mit einer flachen Spindel versehen.

List. angl. t. 3. f. 9.

— Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 43.

Gualt. Test. t. 45. f. G.

Mus. Caes. Vindobon.

L. I. 2. Turbo muricatus.

L. I. 2. Die Reißbrennschnecke.

Linn. S. N. Sp. 608.

Testa umbilicata, subovata, cincta punctis eminentibus transuersim digestis, columella obtusa.

Die genabelte, etwas eiförmige Schale ist in die Quere mit erhabenen reihenweisen Körnern besetzt, und mit einer stumpfen Spindel versehen.

Gualt.





Gualt. Test. 1. 45. f. F.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. Imperforati, solidi.

L. II. Undurchbohrte dickschalige.

L. II. 1. Turbo Pullus.

L. II. 1. Die Vock-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 610.

Belg. Bokje.

Testa imperforata ovata, laevi-  
s; apertura antice angulata.

Die undurchbohrte, eysför-  
mige glatte Schale hat eine  
vorne eckige Mündung.

Picta maculis, fasciisque purpu-  
reis & albidis.

Mit weißlichen, und purpurro-  
then Flecken, und Bändern bema-  
let.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 2. Turbo Petho-  
atus.

L. II. 2. Der Nassauer.

Linn. S. N. Sp. 612.

Belg. Petool-Horn. Angl. Nassaw-Shell. Petiv. Gall. La Nassavienne.  
Argenv.

Testa imperforata ovata, lae-  
vi, anfractibus versus futuram  
obtusè carinatis.

Die undurchbohrte eysförmi-  
ge glatte Schale ist auf den  
Gewinden gegen die Nath mit  
einer stumpfen Querkiele um-  
geben.

Litt.



*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 5. f. 39.

*Rumph. amb. t.* 19. f. D. 5. 6. 7.

*Petiv. amb. t.* 7. f. 15.

*Argenv. Conch. Pl.* 6. f. K.

*Seb. Thes. III. t.* 74. f. 23 — 29.

*Klein. Meth. Ostr. t.* 2. f. 51.

*Gev. Belust. 21. t.* 205 — 208 f.

*Regenf. Samml. I. 8. t.* 18. f. 9. t. 27 f.

*Knor. Vergn. I. 3. t.* 3. f.

—— — II. 22. t. 1. 2. f.

—— — III. 3. t. 3. f.; 23 t. 4. f. 28 t. 2 - 51

—— *Del. nat. I. t. B. III. f.* 7.

L. II. 3. Turbo Coch- L. II. 3. Der grün  
lus. Silbermund.

*Linn. S. N. Sp.* 613.

*Belg. Zilvermond. Angl. Silver - Mouth Shell. Gall. Bouche d'Argent. Argenv.*

*Testa imperforata, ouata,* Die undurchbohrte eiförmig-  
*transuersim obsolete sulcata,* ge Schale ist mit matten Quer-  
*cingulo unico dorsali crassiore.* furchen umgeben, deren eine  
auf den Rücken dicker als die  
andern ist.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 5 f. 29.

*Rumph. amb. t.* 19. f. 4.

*Petiv. amb. t.* 9. f. 14.

*Argenv.*



*Argenv. Conch. Pl. 6. f. 7.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 20, 21.*

*Gev. Belust. 20 t. 9. f.*

*Regenf. Samml. I. I. t. 12. f.*

*Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.*

—— *Del. nat. I. t. B. III. f. 6.*

L. II. 4. Turbo Chry- L. II. 4. Der Gold-  
ostomus. mund.

*Linn. S. N. Sp. 614.*

*Belg. Goud - Mond. Rumph. Angl. The golden mout'd Snail. Hill  
Hall. Bouche d'or. Dav.*

Testa imperforata subouata Die undurchbohrte etwas en-  
ugosa, anfractibus spinarum förmige runzelichte Schale hat  
ornicatarum serie duplici cin- auf den Gewinden mit einer  
dis, doppelten Reihe hohler Sta-  
cheln besetzt.

*Rumph. amb. t. 19. f. E.*

*Petiv. amb. t. 4. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 62 f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. D.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 126.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 9 — 11.*

*Hill.*



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Gev. Belust. 18. t. 171. f.

Knor. Vergn. II. 14. t. 2. f.

— — V. 13. t. 3. f.

L. II. 5. Turbo Testum persicum.

L. II. 5. Das chinesische Dach.

Linn. S. N. Sp. 615.

Angl. The prickly Trochus Hill. Gall. Le toit chinois.

Testa imperforata, ovata spinis obtusis depressis, subtus papillosa.

Die undurchbohrte eiförmige Schale ist unten mit Wärtchen, oben mit stumpfen nidergedruckten Dörnern besetzt

Argens. Conch. Pl. 8. f. P.

Hill. Hist. of Anim. Pl. 7.

Mus. Caes. Vindobon.

L. II. 6. Turbo Pagodinus.

L. II. 6. Die Pagodenschnecke.

Linn. S. N. Sp. 616.

Belg.



Belg. Langleevende Tol. Rumph. Angl. Great Nestors Top. Petiv. Gall. La Pagode. Dav.

Testa imperforata, conica, Die undurchbohrte Kegelför-  
pinis obtulis concatenatis, sub- mige untenher warzige und ge-  
us papillosa, striata. streifte Schale ist mit auf den  
Gewinden mit aneinander schlies-  
senden stumpfen Dörnern be-  
setzt.

List. Hist. Conch. I. 4. f. 8. f. 36.

Rumph. amb. t. 21. f. D.

Petiv. amb. t. 10. f. 8.

Gualt. Test. t. 22. f. B. C.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. A.

Gev. Belust. 8. t. 62. f.

Knor. Vergn. I. 25. t. 3. 4. f.

L. II. 7. Turbo Calcar. L. II. 7. Der Sporn.

Linn. S. N. Sp. 617.

Belg. De Spoor. Rumph. Angl. Spur - Shell Pet. Gall. L' Eperon.  
Dav.

Testa subimperforata de- Die eigermassen undurchbohr-  
pressa, anfractibus scabris su- te niedergedrückte Schale ist  
pra spinis fornicato compressis. auf den Gewinden rau, und  
oben mit blattgedrückten hohlen  
Dörnern umgeben.

List.



List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.

Rumph amb. t. 20. f. 7.

Petiv. amb. t. 9. f. 13.

Argenv. Conch. Pl. 6. f. R.

Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 128.

Gev. Belust. 8. t. 60. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.

L. II. 8. Turbo rugo-  
sus.

L. II. 8. Der Runzel-  
bund.

Linn. S. N. Sp. 618.

Belg. Gerimpelde Tulband.

Testa imperforata subouata, Die undurchbohrte einiger  
striata, anfractibus superne maßen ensförmige gestreifte Scha-  
rugosis. le hat am obern Umfange der  
Gewinde mit Knotten besetzt.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 41.

Gualt. Test. t. 63. f. C. F. H.

Seb. Thes. III. t. 74. f. 13. 14.

Gev. Belust. 15. t. 136. f.

Knor. Vergn. III. 20. t. 1. f.



L. II. 9. Turbo mar-  
noratus.

L. II. 9. Die Schlän-  
genhaut.

Linn. S. N. Sp. 619.

Belg. Slangen - Velle - Hoorn. Angl. The green Giants Ear. Gall.  
Oreille de geant.

Testa imperforata subouata  
aeui, anfractibus trifariam  
marginato nodosis, columella  
subrostrata explanata.

Die undurchbohrte etwas  
eyförmige glatte Schale ist am  
Rande der Gewinde mit einer  
dreysachen Reihe Knotten um-  
geben, und an der Spindel  
einigermassen in einen Rüssel  
verlängert, und flachgedrückt.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 46.

Rumph. amb. t. 19. f. A. B.

Gualt. Test. t. 64. f. A.

Seb. Thes. III. t. 74. f. 1. 2.

Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 124.

Gev. Belust. 13. t. 128 — 131 f.

Regenf. Samml. I. 5. t. 52. f.

Knor. Vergn. III. 26. t. 1 f.; 27. t. 11. f.

L. II. 10. Turbo sar-  
maticus,

L. II. 10. Der Del-  
frug.



Linn. S. N. Sp. 620.

Belg. Bont Knobbel - Hoorn. Rumph. Gall. Le burgau. Dav.

Testa imperforata, conuexo Die undurchbohrte erhabene  
nodosa obtula, anfractibus su- runde stumpfe Schale hat  
pra nodosis, canali interitinctis. oben knottige Gewinde, die  
durch eine Rinne von einander  
abgesondert stehen.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. B.

Gev. Belust. 7. t. 52 f.

Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.

L. II. 11. Turbo galea-  
tus.

L. II. 11. Die Eturn-  
haubenartige Mondschncke.

Testa turbinata transuersim Die birnförmige Schale ist  
sulcata, anfractibus oblique in die Quere gefurchet, auf  
angulatis, labio unidentato. den Gewinden mit schiefer  
Ecken, und an der Spindel-  
leste mit einem Zähnchen be-  
setzet.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 51.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata solida. Anfra-  
ctus quatuor, transuersim sulcati,  
prope marginem externum angulis  
obliquis, obtusis. Apertura luna-  
ta. Labrum integrum acutum.  
Columella subumbilicaria. Labium  
reflexum plica, seu denticulo acu-  
to notatum. Color albus, punctis  
dispersis rufis.

Die Schale ist dicht und birn-  
förmig. Die vier Gewinde sind der  
Quere nach gefurchet, am äußern  
Rande mit schiefen, stumpfen Ecken  
versehen. Die Mündung mond-  
förmig. Die Schalenleste ganzran-  
dig, und scharf. Die Spindel et-  
wasmäßig durchbohret. Die Spin-  
delleste übergeschlagen, und mit et-  
ner spitzigen zahnförmigen Kante  
besetzt. Von weißer Farbe mit  
zerstreuten rothbraunen Punkten.

L. II, 12.





L. II. 12. Turbo tro-  
chiformis.

L. II. 12. Die Kräu-  
selartige Mondschnecke.

Gall. La fripiere. Dav.

Testa imperforata conuexo  
conica, anfractibus plicato-  
rugosis, basi plano concaua,  
apertura falcata.

Die undurchbohrte, runder-  
habene kegelförmige Schale ist  
auf den Windungen mit Run-  
zeln und Falten besetzt, am  
Grunde flach und hohl, mit ei-  
ner sichelförmigen Mündung.

Knor. Vergn. III. 29. t. 1. 2. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa conuexo conica, tenera,  
subpellucida. Anfractus decliues  
imbricati, plicato rugosi. Basis  
plano concaua. Labrum integerrimum,  
falcatum. Columnella sub-  
horizontalis, reflexa, imperforata.  
Color albus, radiis obliquis curua-  
tis luteis.

Die Schale ist runderhaben ke-  
gelförmig, dünn, und halb durch-  
sichtig. Die kegelförmig abhängi-  
gen Gewinde sind mit Runzeln und  
Falten besetzt. Der Grund ist flach  
und hohl. Die Schalenleiste ganz  
randig und sichelförmig. Die Spin-  
del beinahe wagrecht, ohne Nabel.  
Von weißer Farbe, mit krummen  
gelben Querstrahlen.

Vestigiata, testis alienis infidenti-  
bus.

Sie hat Eindrücke von fremden auf-  
stehenden Schalen.

L. II. 13. Turbo heli-  
cinus.

L. II. 13. Die Schnit-  
felmondschnecke.



Testa rotundata glabra, anfractibus conuexis, columella incrassata, subimperfata.

Die rundliche glatte Schale hat gewölbte Windungen, eine verdickte Spindel, mit einem unvollkommenen Nabel.

*Knor. Vergn. V. 3. t. 1. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, solida. Anfractus sex conuexi, laeues, contigui. Apertura ouata. Columella incrassata, replicata; Umbilicus obsoletus, tectus. Color epidermidis ex purpureo viridescens, faucis argenteo margaritaceus.

Die Schale ist rundlich und dicht. Die sechs Gewinde sind erhaben, glatt, und berühren einander. Die Spindel ist verdickt, übergeschlagen, mit einem gedeckten unvollkommenen Nabelloche. Die Oberhaut ist purpurfarbig und grünlich, der Schlund mit einem silbernen Perlenmutterglanz.

L. III. Solidi, perforati.

L. III. Dichte, durchbohrte.

L. III. I. Turbo cinereus.

L. III. I. Die aschene graue Mondschnecke.

Testa rotundata, laeui, anfractibus conuexis, columellae basi elongata, fauce sulcata, umbilico lato.

Die rundliche glatte Schale hat erhabene Gewinde, einen gefurchten Schlund mit einem breiten Nabelloche.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa rotundata, laevis. Anfractus sex convexi, prope suturam complanati, & obsolete transuersim striati. Apertura semicircularis. Columellae basis elongata, diducta. Umbilicus profundus. Color cinereus, maculis & lineis albis nigrisque,

Die Schale ist rundlich und glatt. Die sechs Gewinde sind bündig, nächst der Nath plattgedrückt, mit unvollkommenen Querstreifen. Die Mündung ist halbrund. Der Grund der Spindel ist verlängert, und ausgebreitet. Der Nabel tief. Von aschgrauer Farbe mit weissen und schwarzen Flecken und Strichen.

L. III. 2. Turbo nodulosus.

L. III. 3. Die knottige Mondschnecke.

Testa conico rotundata, anfractibus noduloso striatis, denticulo umbilicali.

Die runderhabene kegelförmige Schale ist an den Gewinden mit Knotten und Streifen besetzt, und an dem Nabelloche mit einem Zähnchen versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima sequenti, sed transuersim striata, nodisque obliquis obsita. Color niger, maculis dispersis niueis.

Die Schale ist der folgenden am ähnlichsten, nur ist sie mit schiefen Knotten und Streifen besetzt. Von schwarzer Farbe mit zerstreuten schneeweißen Flecken.

L. III. 3. Turbo Pica.

L. III. 3. Die Elster.



*Linn. S. N. Sp. 622.*

*Belg. Soldat. Angl. Magpye Top - Shell. Pet. Gall. La Pic. Dav.*

Testa umbilicata, conico ro- Die genabelte runderhabene  
tundata, lacui, denticulo um- kegelförmige glatte Schale ist  
bilicali. am Nabelloche mit einem Zäh-  
nen versehen.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 29. 30.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 14. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 21. f. A.*

*Gualt. Test. t. 68. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 8. f. G.*

*Adans. Seneg. Pl. 12. f. 7.*

*Gev. Belust. t. 10 f. 74 — 77.*

—— — II. t. 78 — 80. f.

*Regenf. Samml. I. 6. t. 66. f.; II t. 57 f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. I. f.*

—— — II. 21. t. 3. f.

L. III. 4. Turbo Argy-  
rostomus.

L. III. 4. Der geribbte  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 624.*

*Belg. Geplekte Zilver - Mond. Angl. The spotted Silvermouth. Gall*  
*La bouche d'argent bariolée, Argenv.*

Testa



Testa umbilicata, suboua-  
ta, transuersim cingulata, lon-  
gitudinaliter striata.

Die genabelte eysförmige  
Schale ist in die Quere gegür-  
tet, und der Länge nach ge-  
streifet.

Alba, fasciis longitudinalibus fus-  
cis.

Weiß, mit nach der Länge herab-  
laufenden Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 12. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 19. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 64. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. F.*

*Seb. Thes. III. t. 74. 4. 6.*

*Gev. Belust. 16. t. 153. 154. f.*

*Régenf. Samml. I. 10. t. 43. f.*

*Knor. Vergn. III. 15. t. 5. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 12.*

L. III. 5. Turbo mar-  
garitaceus.

L. III. 5. Der bunte  
Silbermund.

*Linn. S. N. Sp. 625.*

*Belg. Bonte Zilver - Mond.*



Testa umbilicata subouata  
cingulis eleuatis, intercostali-  
bus laeuibus.

Die genabelte, einigermaßen  
enförmige Schale hat erhabene  
zwischen den Furchen liegende  
Gürteln.

Alba maculis viridescentibus fus-  
cisque.

Weiß, mit grünlichen und brau-  
nen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 11.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. A.*

*Seb. Thes. III. t. 74. f. 3.*

*Gev. Belust. 17. t. 155 — 158. f.*

L. III. 6. Turbo Del-  
phinus.

L. III. 6. Der gezackte  
Dolphin.

*Linn. S. N. Sp. 626.*

*Belg. Getackte Dolphyn. Angl. The echinated Snail, Petiv. Gall.  
le Dauphin. Dav.*

Testa umbilicato hispida,  
anfractuum spinis ramosis.

Die Schale hat einen gez-  
ackten Nabel, und mit ästis-  
gen Stacheln besetzte Gewinde.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 31.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 45.*

*Rumph. amb. t. 20. f. H.*



*Petiv. amb. t. 3. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 68. f. C.*

*Gev. Belust. 4. t. 26 — 28. f.*

*Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. H.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 15 — 27.*

*Knor. Vergn. I. 22. t. 4. 5. f.*

L. III. 7. Turbo distortus.

L. III. 7. Der geribbte Delphin.

*Linn. S. N. Sp. 627.*

Testa umbilicata, submucronata, spinis indivisis.

Die genabelte und gezackte Schale ist an den Gewinden mit ungetheilten Stacheln besetzt.

*Gualt. Test. t. 68. f. D.*

*Gev. Belust. 4 t. 24 f.*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1 — 6.*

*Knor. Vergn. IV. 7. t. 2. 3. f. ; 8. t. 1. f.*

L. III. 8. Turbo carinatus.

L. III. 8. Die gefielte Mondschnecke.



Testa rotundata, anfractibus carinatis, umbilico spirali profundo.

Die rundliche Schale ist an den Gewinden mit Kielen umgeben, und mit einem tiefen schnirkelförmigen Nabel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, pyramidata, tenera, subpellucida. Anfractus quinque teretes, cincti carinis lamellois tribus sex, supremis tenuioribus. Apertura orbicularis. Umbilicus verticalis, spiralis, latus. Color albus.

Die Schale ist rund, pyramidenförmig, dünn und halbdurchsichtig. Die fünf Gewinde sind erhaben rund, mit drey bis sechs blätterichten Kielen, davon die obersten dünner sind, umgeben. Die Mündung ist rund. Der breite schnirkelförmige Nabel steht senkrecht. Von weißer Farbe.

L. IV. Cancellati.

L. IV. Segitterte.

L. IV. 1. Turbo scalaris.

L. IV. 1. Die achte Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 630.*

*Belg. Wenteltrap. Angl. Royal Stair - Case. Pet. Gall. La vraie Scallata. Dav.*

Testa umbilicata, ventricoso conica, anfractibus distantibus, fasciis longitudinalibus membranaceis intertextis.

Die genabelte bäuchige kegelförmige Schale hat entfernte Gewinde, die mit nach der Länge herablaufenden häutigen Klammern verwachsen sind.

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 49. f. A.*

*Petiv. amb. t. 2. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 10. f. ZZ.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. V.*

*Knor. Vergn. IV. 20. t. 2. 3. f.*

— — — *V. 23. t. 1. f.; 24. t. 6. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 7.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1428. 1431. f.*

— — — *153. t. 1432. 1433. f.*

L. IV. 2. Turbo Cla-  
thrus.

L. IV. 2. Die gemei-  
ne Wendeltreppe.

*Linn. S. N. Sp. 631.*

*Belg Wentel-Trapje. Angl. Smaal Stair-Cafe. Petiv. Gall. La  
fausse escalata. Dav.*

Testa exumbilicata turrita, Die thurmformige Schale  
anfraetibus contiguis, fasciis hat von einander entfernte Ge-  
longitudinalibus membrana- winde, und häutige nach der  
ceis. Länge laufende Klammern,  
ohne Nabelloch.

α niuea, unicolor.

α schneeweiß, einfarbig.

β niuea, maculis dispersis pur-  
pureis.

β schneeweiß, mit zerstreuten  
purpurrothen Flecken.

γ grisea, clathris niueis.

γ lichtgrau, mit schneeweißen  
Klammern.

*Bonan.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. III.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 51.*

*Gualt. Test. t. 58. f. H.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 66.*

*Ginan. adr. II. t. 6. f. 54.*

*Knor. Vergn. I. II. t. 5. f.*

—, — IV. 20. t. 4 — 6. f.

*Mart. Konch. Kab. IV. 157. t. 1484 f.*

L. IV. 3. Turbo Uua. L. IV. 3. Das Bienenkörbchen.

*Linn. S. N. Sp. 636.*

*Belg. Gebakerde Kindje. Gall. Enfant au maillot. Dav.*

Testa umbilicata, ouata, anfractibus contiguis, plicis longitudinalibus, columella uniplicata. Die genabelte eysförmige Schale hat aneinander genäher- te Windungen, mit nach der Länge laufenden Falten, und einer Falte an der Spindel.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 140.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5 f. 47.*



*Petiv. Gaz. t. 27. f. 2.*

*Gualt. Test. t. 58. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 55. f. 12.*

*Knor. Vergn. VI. 25. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Konch IV. 153. t. 1439. f.*

L. IV. 4. Turbo Lin-  
cina.

L. IV. 4. Der Breit-  
rand.

*Linn. S. N. Sp. 639.*

Testa umbilicata oblonga,  
anfractibus decussatim striatis,  
aperturae limbo dilatato.

Die genabelte längliche  
Schale hat gleichbreite kreuz-  
weise gestreifte Windungen,  
mit einem erweiterten Mün-  
dungsrande.

*Petiv. Gaz. t. 118. f. 11.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 3. f. 71.*

*Berlin. Mag. IV. 3. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. Turriti.

L. V. Gethürmte.

L. V. 1. Turbo imbri-  
catus.

L. V. 1. Die bunte  
Schraube.

*Linn.*



Linn. S. N. Sp. 640.

Testa turrita, anfractibus  
deorsum imbricatis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale sind niederwärts  
ziegelförmig gefalten.

Liszt. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 61.

Gualt. Test. t. 58. f. E.

Seb. Tbes. III. t. 56. f. 34.

Knor. Vergn. VI. 25. t. 2. f.

Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1422. f.

L. V. 2. Turbo acut-  
angulus.

Linn. S. N. Sp. 642.

L. V. 2. Die Scharf-  
ribbe.

Testa turrita, anfractuum ca-  
rina unica majore, acuta.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben einen ged-  
ßeren und scharfschneidigen  
Querkiel.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 117.

Gualt. Test. t. 58. f. B.

Mart. Konch. Kab. IV. 67. t. 742. 743. f.

L. V. 3. Turbo dupli-  
catus,

L. V. 3. Die Doppel-  
ribbe.

Linn.



*Linn. S. N. Sp. 643.*

Testa turrata, anfractu-  
carinis duabus acutis.

Die Gewinde der gethürm-  
ten Schale haben zween scharfe  
Querkiele.

*List. angl. t. 3. f. 7.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 114.*

*Gualt. Test. t. 58. f. C.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 7. 8.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 4. Turbo exole-  
tus.

L. V. 4. Die alte  
Schraube.

*Linn. S. N. Sp. 644.*

Testa turrata, anfractibus  
longitudinaliter rugosis, cari-  
nis duabus obtusis margina-  
libus.

Die Gewinde der gethürm-  
ten nach der Länge gerunzelten  
Schale haben zween stumpfe  
am Rande stehende Querkiele.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 53.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 113.*

*Argenv. Conch. Pl. 14. f. C.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

L. V. 5.



L. V. 5. Turbo torcularis.

L. V. 5. Die gestreifte Trommelschraube.

Testa turrita, anfractibus transuersim striatis, carinis duabus obtusis submarginalibus.

Die Gewinde der gethürmten Schale sind in die Quere gestreifet, und mit zween stumpfen vom Rande etwas entfernten Querkieleu umgeben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa turrita. Anfractus circiter duodeni transuersim striati, carinis cincti duabus distantibus, obtusis, margini cuius propinguis. Apertura allinium. Color albus, maculis longitudinalibus undulatis fuscis.

Die Schale ist gethürmt. Die Gewinde deren ungefähr zwölf, sind der Quere nach gestreifet, und mit zween stumpfen Querkieleu umgeben, die nicht weit von jedem Rande entfernt stehen. Die Mündung ist wie an den anverwandten Arten. Die Farbe weiß mit wellenförmigen nach der Länge laufenden Flecken.

L. V. 6. Turbo Terebra.

L. V. 6. Die Trommelschraube.

*Linn. S. N. Sp. 645.*

*Belg. Trommel-Schroef.*

Testa turrita, anfractuum carinis sex, acutis.

Die Gewinde der gethürmten Schale haben sechs scharfe Querkiele.

*Bo.*



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 115.*

*Rumph. amb. t. 30. f. M.*

*Petiv. amb. t. 13. f. 18.*

*Gualt. Test. t. 58. f. A.*

*Adans. Seneg. Pl. 10. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 11. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 56. f. 40.*

*Knor. Vergn. I. 8. t. 6. f.*

*Mart. Konch. Kab. IV. 152. t. 1425. f.*

L. V. 7. Turbo bidens. L. V. 7. Die gefleckte  
Zahnschraube.

*Linn. S. N. Sp. 649.*

Testa turrita, pellucida, Die gethürmte durchsichtige  
anfractibus contrariis, prope Schale hat linksgewundene  
futuram maculatis, apertura an der Muth gefleckte Windun-  
postice bidentata. gen, und hinten an der Münd-  
dung zween Zähnen.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 39.*

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 41.*

*Gualt. Test. t. 4. f. C.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 20.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 2.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 4. f.*



L. V. 8. Turbo quin-  
quedentatus.

L. V. 8. Die fünfzäh-  
nige Schraube.

Testa turrita subpellucida,  
labio tridentato, labro bipli-  
cato.

Die gethürmte halbdurchsich-  
tige Schale hat an der Spin-  
dellefze tren, an der Schalen-  
lefze zwei Falten.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Simillima praecedenti. Testa cy-  
lindraceo turrita. Anfractus duo-  
decim. Columella subumbilicata.  
Labium plicis membranaceis tri-  
bus; labrum binis. Color albidus.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten, von gethürmter walzenförmiger Gestalt. Der Gewinde sind zwölf an der Zahl. Die Spindel ist einigermaßen genabelt. Die Spindellefze ist mit drei, die Schalenlefze mit zwei dünnen Falten besetzt. Von weißlicher Farbe.

L. V. 9. Turbo detri-  
tus.

L. V. 9. Die euförmige Schraube.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 300.*

Testa ovata, laevis, colu-  
mella subimperfectorata, aper-  
tura ovata.

Die Schale ist euförmig, und glatt; die Spindel einigermaßen durchbohret, die Mündung euförmig.





*List. Hist. Conch. l. 1. f. 1. f. 2.*

*Gualt. Test. 1. 5 f. N.*

*Berlin. Magaz. III. 5. t. 53. f.*

*Schroet. Erdkonch. 1. t. 1. f.*

## M. Cornu.

## M. Die Hornschnecke.

Testa elongato conica Die verlängerte kegelförmige gedrehte Schale  
volutata. Anfractus cylindrici distant. Aper- hat walzenförmige freystehende Gewinde, und eine  
tura elabiata, imperforata. Mündung ohne Leisten und Nabelloch.

## M. 1. Cornu Copiae.

## M. 1. Das Füllhorn.

Testa conico turrita, anfr- Die kegelförmig gethürmte  
tibus duobus, apertura orbiculata. Schale hat zwey Gewinde, und eine ganz runde Mündung.

*Index Mus. Caes. Vindobon. 1.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



Testa unico turrata dextrorsum  
volutata. Anfractus duo continua-  
ti, teretes, distantes, infimo remo-  
tissimo. Apex obtusus. Apertura  
orbicularis latere interno patumper  
revoluta, sine columella, labio, &  
umbilico. Color lutescens, fasciis  
tribus longitudinalibus dorso, fuscis.  
Hinc ab affine specie *Sebae* (\*)  
*Argenville* (\*\*) & vix non  
*Thon. Mülleri* (\*\*\*) distincta.

Die Schale ist kegelförmig und  
gethürmet, nach der Rechten gedre-  
het. Die zwei Gewinde sind un-  
terbrochen, walzenförmig, und  
stehen von einander frey entsetzt,  
davon das letzte am weitesten ab-  
setzt. Die Spitze ist stumpf. Die  
Mündung scheibenrund, an der  
inneren Seite etwas wenig aus-  
wärts übergeschlagen, ohne Spin-  
del, Lesze, und Nabelloch. Von  
gelblicher Farbe, mit drey nach  
der Länge des Rückens laufenden  
schwarzbraunen Bändern. Da-  
durch unterscheidet sie sich als eine  
besondere Art von jener, welcher  
*Seba* (\*) und *Argenville* (\*\*) und  
vielleicht auch von der, wel-  
cher *Thon Müller* (\*\*\*) gedenket.

## N. Helix.

Testa spiralis, anfra-  
ctibus contiguis, columel-  
la elabiata, apertura co-  
arctata.

## N. Die Schnirkel- schnecke.

Die schnirkelförmige  
Schale hat verwachsene  
Gewinde, an der Spin-  
del keine Lesze, und an  
der Mündung keinen Eins-  
chnitt.

(\*) *Thes. III. t. 40 f. 27.*

(\*\*) *Conch. II. Pl. 9. f. 2.*

(\*\*\*) *Hist. Verm. II. Sp. 313.*



N. I. Testa ancipiti.

N. I. Mit zweyschneidiger Schale.

N. I. 1. *Helix Scarabaeus*.

N. I. 1. Die Käferschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 655.**Belg. Toover Slak. Angl. River ragged Mouth. Pet. Gall. Gueule de Loup. Dav.*

Testa ouata, ancipiti; apertura dentata.

Die eysförmige zweyschneidige Schale hat eine gezähnte Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 31. 32.**Bonan. Recr. cl. 3. f. 44. 385.**Petiv. Gaz. t. 4. f. 10.*

— amb. t. 12. f. 3.

*Rumph amb. t. 27. f. 7.**Gualt. Test. t. 4. f. 8.**Argenv. Conch. Pl. 9. f. T.**Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 23.**Berlin. Mag. III. 6. t. 67. f.**Knor. Vergn. VI. 19. t. 2. 3. f.*

N. II. Anfractibus carinatis.

N. II. Mit kleeformigen Gewindem.

N. II. 1. *Helix Lapicida*.

N. II. 1. Der Steinspinner.



*Linn. S. N. Sp. 656.*

Belg. Steenbikker. Angl. Land Cheese Shell. Pet. Gall. Le Planorbe terrestre. Geof.

Testa carinata, orbiculari, umbilicata, utrinque conuexa, apertura marginata, transuersali, ouata. Die gefielte scheibenrunde genabelte Schale ist beiderseits runderhaben, mit einer eingesäumten, querliegenden, eysförmigen Mündung.

*List. angl. t. 2 f. 14.*

—— ——— *Hist. Conch. l. 1. f. 8. f. 68.*

*Petiv. Gaz. t. 92. f. 11.*

*Berlin. Magaz. II. 3. v. 15. f.*

*Sloterb. Aët. belv. V. 3. t. 36 f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 23 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 2. *Helix algira.* N. II. 2. Der Wachs-  
schirfel.

*Linn. S. N. Sp. 660.*

Testa subcarinata, complanata, anfractibus teretibus, supra reticulatim striatis, umbilico peruito. Die einigermaßen gefielte flache Schale hat runde Gewinde, die oben kreuzförmig gestreift sind, mit einem tiefen Nabel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 3.



N. II. 3. *Helix Planobis.*

N. II. 3. Die Schel-  
henschnecle.

*Linn. S. N. Sp. 662.*

Testa carinata, umbilicata,  
plana, supra concaua apertu-  
ra utrinque acuta.

Die gekielte, genabelte flache Schale, ist eben ausgehölet, und mit einer beiderseits scharfen Mündung versehen.

*List. angl. t. 2 f. 27.*

— *Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 24.*

*Petiv. Gaz. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 4. f. EE.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 8.*

*Gev. Belust. 4. t. 21. 23. f.*

*Berlin. Magaz. IV. 8. t. 18. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. II. 4. *Helix marginata.*

N. II. 4. Der einge-  
säumte Kegelschnirkel.

*Müll. Hist. Verm. II. Sp. 241.*

Testa umbilicata, carinata,  
depresso conica, oblique stria-  
ta, apertura transuersa, tri-  
angulari.

Die genabelte und gekielte, flachkegelförmige Schale ist schief gestreift, und mit einer querliegenden dreyeckigen Mündung versehen.

A a 4

Al.



Alba, fasciis transuersis rulis.

Weiß, mit rothbraunen Quer-  
bändern,

*Mus, Caes. Vindobon,*

N. II. 5. *Helix plica-*  
*ta.*

N. II. 5. Der Falten-  
mund.

Testa umbilicata, carinata,  
depressoconica, subtus con-  
uexa gibba, apertura qua-  
drangulari, fauce plicata.

Die genabelte, gekielte, flach-  
kegelförmige Schale ist unten  
erhaben rund, und höckerig,  
und inner der viereckigen Mün-  
dung mit Falten besetzt.

*Knor. Vergn. VI. 26. t. 5. f.*

Testa depressio conica. Anfractus  
supra sex, subtus vnicus, gibbus,  
margine acute carinato. Umbili-  
cus centralis, spiralis, peruius.  
Apertura quadrangularis, margine  
reflexo. Faux prope columellam  
plicata transuersa solitaria elonga-  
ta, prope labrum plicis duabus  
marginalibus acutis. Color rufus.

Die Schale ist flachkegelförmig  
Oben stehen sechs Gewinde, unter  
ein höckeriges, welches mit einer  
scharfen Kiele umgeben ist. Die  
schneckenförmige, tiefe Nabel durch-  
dringt die Mitte. Die Mündung  
viereckig, und eingesäumt. Inner-  
derselben steht an der Spindel ein  
einzelne verlängerte Querspalte, an  
Rande der Schalenfalten aber zwei  
Von brauner Farbe.

N. II. 6. *Helix obuer-*  
*sa.*

N. II. 6. Der Flach-  
wirbel.

Testa



Testa imperforata turbinata,  
anfractibus supra planis, mar-  
ginato carinatis, columella  
imperforata.

Die Gewinde der zusammen-  
gedrückten birnförmigen Scha-  
le, sind oben flach, und an  
der Kiele verändert, die Spin-  
del undurchbohret.

Gualt. Test. t. 68. f. E.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa turbinata subtus convexa,  
supra plana, plicis transversis, &  
obliquis undique decussata. An-  
fractus quinque, supra plani, lim-  
bo carina marginata cincti. Aper-  
tura transversa, subtus arcuata Co-  
lumbellae labrum tenuissimum, re-  
plicatum, imperforatum. Color  
albus.

Die Schale ist einigermaßen birn-  
förmig, unten erhabenrund, oben  
flach, mit schief und querlaufen-  
den Rungeln besetzt. Die fünf Ge-  
winde sind oben flach, mit einer  
eingesäumten Kiele umgeben. Die  
Mündung steht in die Quere, und  
ist unten gekrümmt. Die Spin-  
delleiste ist übergeschlagen, sehr dünn  
und undurchbohret. Von weißer  
Farbe.

N. II. 7. Helix torna-  
ta.

N. II. 7. Der gedrehte  
Regel.

Testa subimperforata, tro-  
chiformi, anfractibus imbri-  
catis, apertura triangulari.

Die kaum durchbohrte kräu-  
selförmige Schale hat ziegelför-  
mig übereinander liegende Ge-  
winde, und eine dreyeckige  
Mündung.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 61.

Mus. Caes. Vindobon.



Testa trochiformis. Anfractus sex imbricatim declives, oblique substriati, infimo margine acuto transuerſim carinato, ſubtus conuexo. Apertura transuerſa, triangularis Labrum extroſum marginatum. Columella reflexa, obtegens foramen obſoletum, tenue. Color extus fuſcus, faucis niueus.

Die Schale iſt trüſelförmig. 2 ſechs ziegelſörmig übereinander geſetzte Gewinde ſind ſchief geſtrichet, das untere iſt der Quere nach ſcharf gekielet, unten bündig erhaben. Die dreieckige Mündung ſteht in die Quere. Die Schalenſchnecke iſt auswärts gekielet. Die übergeſchlagene Spindelſchnecke bedeckt ein unvollkommenes dünnes Diabellon. Die Farbe iſt außen braun, der Schlund ſchneeweiß.

N. II. 8. Helix ringens.

N. II. 8. Das verkehrte Mundſtück.

Linn. Sp. N. Sp. 664.

Testa subcarinata, imperforata, apertura reſupinata, utrinque dentata.

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat ein aufwärts gekehrte beiderſeitig gezähnte Mündung.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 330. 331.

Liſt. Hiſt. Conch. l. I. f. 11. f. 100.

Argenv. Conch. Pl. 28. f. 13. 14.

Berlin. Mag. II. 4. t. 42. f.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 9. Helix ſinuata.

N. II. 9. Die ausgeſchnittene Schnirkelſchnecke.

Müll.





Müll. Hist. Verm. Sp. 217.

Testa subcarinata, imperforata, apertura transuersa, labro extus triplicato, intus quadridentato.	Die einigermaßen gekielte undurchbohrte Schale hat eine querliegende Mündung, die an der Schalenleiste mit drey, an der Spindelleiste mit vier Zähnen besetzt ist.
---	--

List. Hist. Conch. l. I. f. 99.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 10. Helix Caecocolla.

N. II. 10. Die Bastardlampe.

Linn. S. N. Sp. 665.

Gall, La Lampe antique. Argenv.

Testa carinata, imperforata, utrinque conuexa.	Die gekielte undurchbohrte Schale ist beiderseits erhaben, rund.
--	--

List. Hist. Conch. l. I. f. 10. f. 87.

Argenv. Conch. Pl. 8. f. D.

Mus. Caes. Vindobon.

N. II. 11.



N. II. 11. *Helix Cornu militare.*

N. II. 11. Die Kalkschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 666.*

*Belg. Karkal.*

*Testa subcarinata, imperforata, conuexa, apertura patula, emarginata.*

Die einigermaßen gekielte undurchbohrte runderhabene Schale hat eine erweiterte eingesäumte Mündung.

*Nitca, suturis emarginatis,*

Schneeweiß, mit geränderten Gewinden.

*Gualt. Test. t. 3. f. 7.*

*Knor. Vergn. VI. 32. t. 2. f.*

N. II. 12. *Helix maculata.*

N. II. 12. Der gefleckte Schnirkel.

*Testa perforata, subcarinata, depressa, oblique striata, subtus conuexa.*

Die etwas gekielte und flache Schale ist schief gestreift, und unten runderhaben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa*



Testa rotundata depressa, subtus  
 onuexa. Anfractus sex, teretes,  
 plique striati, extus obsolete ca-  
 nati. Apertura lunata. Labrum  
 marginatum. Columella perforata.  
 Color albidus, maculis latis diffor-  
 mibus fulvis.

Die ründliche etwas flache Schale  
 ist unten erhabenrund. Die sechs  
 runde schief gestreifte Gewinde sind  
 einigermassen gekielet. Die Mün-  
 dung mondbörmig. Die Schalen-  
 lefze gesäumt. Die Spindel durch-  
 bohret. Von weißer Farbe mit  
 breiten unörmigen rothgelben Fle-  
 cken.

N. II. 13. *Helix pun-*  
*tata.*

N. II. 13. Der punk-  
 tirte Zahnwirbel.

Testa subcarinata, rotunda-  
 a, subperforata, labio increas-  
 tato sinuato, labro tridentato.

Die stumpffielige, ründliche,  
 fast undurchbohrte Schale hat  
 eine verdickte ausgeschnittene  
 Spindellefze, mie drey Zäh-  
 nen an der Schalenlefze.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, subcompressa.  
 Anfractus quinque conuexi, infimus  
 carina obsolete cinctus. Apertura  
 transversa, oblonga. Labri margo in-  
 crassatus, antice sinuatus. Labrum  
 marginatum denticulis obtusis, mar-  
 ginalibus, tribus. Columella forami-  
 ne tenui subobtecto. Color fuscus,  
 cingulo dorsali tenui, punctisque  
 circa futuram radiantibus luteis.  
 Apertura rubescens,

Die ründliche, etwas zusammen-  
 gedrückte Schale hat fünf rund er-  
 habene Gewinde, deren äusseres  
 mit einem unvollkommenen Kiele  
 umgeben ist. Die längliche Mün-  
 dung steht in die Quere. Die Spin-  
 dellefze hat einen verdickten, vorne  
 ausgeschnittenen Rand. Die Scha-  
 lenlefze ist gesäumt und am Ran-  
 de mit drey stumpfen Zähnen be-  
 setzt. Die Spindel hat ein dün-  
 nes beynahe gedecktes Nabelloch.  
 Die Farbe braun, mit einer schma-  
 len Querbände um den Rücken,  
 und nach der Naht strahlörmig  
 stehenden Punkten von hellgelber  
 Farbe. Die Mündung ist röth-  
 lich.

N. III.



N. III. Umbilicatae, anfractibus  
rotundis.

N. III. Genabelte, mit rund  
Gewinden.

N. III. 1. Helix cor-  
nea.

N. III. 1. Das Wall-  
horn.

Linn. S. N. Sp. 671.

Belg. Europäische Post-hoorn. Angl. Great River Cheese - Shell  
Petiv. Gall. Le grande Planorbe. Geof.

Testa umbilicata plana, an-  
fractibus quatuor teretibus.

Die genabelte flache Sch-  
le hat vier runde Gewinde.

List. angl. t. 2. f. 26.

Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.

List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 40.

Petiv. Gaz. t. 92. f. 5.

Gualt. Test. t. 4. f. DD.

Gev. Belust. 3. t. 18. 19. f.

Seb. Thes. III. t. 39. f. 17.

Argenv. Conch. Pl. t. 27. f. 8.

Ginan. adr. II. t. 2. f. 12.

Berlin. Mag. IV. 8. t. 17. f.

Knor. Vergn. V. 22. t. 6. f.

Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 10.

N. III. 2. Helix poly-  
gyrata.

N. III. 2. Die Schnir-  
felscheibe.

Testa



Testa orbiculata, supra plana, Die schelbenförmige und  
 n, subtus concava, anfracti- unten hohle Schale bestehet  
 bs teretibus decem, aus zehn runden Gewinden.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa orbiculata. Supra plana, Die Schale ist schelbenförmig,  
 situs concava. Anfractus decem oben flach, unten hohl. Die zehn  
 teretibus tenuissime oblique striati. runden Gewinde sind sehr fein  
 Apertura rotundato oblonga. La- schief gestreift. Die Mündung ist  
 bium emarginatum. Color lutescens länglicht rund. Die Schalenfuge  
 ros, fascia transversa fulva. gesäumt. Von gelblicher Schale,  
 mit einer rothgelben Querbinde.

N. III. 3. *Helix Cornu* N. III. 3. Das Widder-  
 arietis. horn.

*Linn. S. N. Sp. 674.*

Belg. Rams-Hoorn. Angl. Great girdled Braile cheese Shell. Petiv.

Testa umbilicata, planius- Die genabelte, etwas flache  
 culo, anfractibus teretibus Schale hat sechs runde Ge-  
 nis, apertura ovali. winde, und eine eyförmige  
 Mündung.

Nivea, fasciis transversis rufis.

Schneeweiß, mit braunrothen  
 Querbinden.

*List.*



*Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 14 — 15.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 7.*

*Gev. Belust. 3 t. 12. 13. f.*

*Knor. Vergn. I. 2. t. 4. 5. f.*

N. III. 4. *Helix ampul-  
lacea.*

N. III. 4. Die Schlammschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 676.*

*Belg. Slyk-Slek. Angl. Smooth girdled Snail - Shell. Petiv.*

*Testa perforata, subglobosa, anfractibus teretibus, prope suturam complanatis; apertura oblonga.* Die durchbohrte kugelförmige Schale hat runde an der Naht plattgedrückte Windungen, mit einer länglichten Mündung.

*Rumph. amb. t. 27. f. Q.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 1. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 1 — 7. 53. 59.*

*Gev. Belust. 27. t. 289. 291. f.*

*Berlin. Mag. III. 6. t. 68. f.*

*Knor. Vergn. V. 5. t. 2. f.*



N. III. 5. *Helix Poma-*  
a.

N. III. 5. Die gemeine  
Weinbergsschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 677.*

*Belg. Wyngards - Slak. Angl. Wine - Gard Snail. Gall. Le Vigne-  
on. Geof.*

Testa perforata subglobosa, Die durchbohrte einiger-  
asciis transuersis obsoletis, maßen kugelförmige Schael  
apertura rotundato lunata, hat undeutliche Querverbinden,  
mit einer rundlichen mondför-  
migen Mündung.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 316.*

*List. angl. t. 2. f. 1.*

— *Hist. Conch. l. 1. f. 46.*

*Gualt. Test. t. 1. f. A.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 1.*

— *Zoom. Pl. 9. f. 4.*

*Gev. Belust. 29. r. 330 — 342. f.*

*Berlin. Mag. II. 1. t. 1. f.*

*Schroet. Erdk. I. t. 10. f.*

N. III. 6. *Helix Po-*  
maria.

N. III. 6. Die linksge-  
wundene Weinbergsschnecke.



Müll. Hist. Verm. Sp. 244.

Testa perforata, subglobosa, sinistrosa, rufescente, fasciis transuersis obsoletis.

Die durchbohrte, einigermaßen kugelförmige, linksge-  
wundene Schale ist von braun-  
lichter Farbe, mit matten Quer-  
bändern.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 7. *Helix creta-  
cea.*

N. III. 7. Die Krei-  
denschnecke.

Müll. Hist. Verm. (*nemoralis*) Sp. 157.

Testa perforata subglobosa,  
laevi, albida, fasciis transuer-  
sis fuscis.

Die durchbohrte einigermaßen kugelförmige glatte Schale  
ist von weißlicher Farbe mit  
braunen Querbändern.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 8. *Helix glau-  
ca.*

N. III. 8. Das Kuh-  
auge.

Linn. S. N. Sp. 678.

Testa umbilicata, subrotun-  
da, acuminata; labro margi-  
nato, apertura ovali.

Die genabelte, rundlichte spiz-  
wirblige Schale hat an der ey-  
förmigen Mündung eine gez-  
säumte Schalenleiste.

*Seb.*





*Seb. Thes. III. t. 38. f. 8.*

*Gev. Belust. 3. t. 20. f.*

*Knor. Vogn. V. 5. t. 5. f.*

N. III. 9. *Helix citri-*

*Linn. S. N. St. 679.*

*Belg. Navel - Slak.*

Testa perforata rotundata,  
ompressa, laevi, fascia transuer-  
diuerficolor.

N. III. 9. Die Nabel-  
schnecke.

Die durchbohrte rundlichte  
flachgedrückte glatte Schale ist  
mit einem gefärbten Bande um-  
geben.

subpellucida, pallide sulphurea,  
fasciis duabus opacis niueis, su-  
prema tenuiore.

\* halbdurchsichtig, blaßschwefelgelb  
mit zwey schneeweißen Bändern,  
davon das obere schmale riß.

*Gev. Belust. . 26. t 285. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

lactea, fascia dorsali rufa, niueae  
opacae superne contigua.

β schneeweiß mit einem rothbrau-  
nen Querbande, unter welchem  
nabe eine schneeweiße undurchsich-  
tige Binde liegt.

*Mus. Caes. Vindobon.*



♀ butyracea, spira apice & fascia ♂ butterfarbig, mit einer rothfarbläen  
dorsali ferrugineis. Schnirkelspitze, und Querbande  
um den Rücken.

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 28. f. 10.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 1 — 6.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♀ ferruginea, fascia dorsali alba. ♂ rothfarbig, mit einer weißer  
Querbinde.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 57.*

*Gualt. Test. t. 3. f. E.*

*Gev. Belust. 26 t. 277 f.*

*Knor. Vergn. V. 22. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 10. *Helix zona-* N. III. 10. Die Gürtel-  
ria, schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 681.*

*Belg. Gebandeerde Post-hoorn. Gall. Corner de Possilon bandé.*



Testa umbilicata, depressa, Die genabelte flache Schale  
 apertura transuersa, labro hat an der querliegenden Mün-  
 candido reflexo. dung eine weiße übergeschlagene  
 Schalenleiste.

α alba, undis niueis, fasciis trans- α weiß, mit schneeweißen Wellen,  
 uernis tribus rufis, infima latio- und drei rothbraunen Querbän-  
 re, den; davon die untere schmäler ist.

β alba, fasciis octo inaequalibus ru- β weiß, mit acht ungleich breiten  
 fis. rothbraunen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 72.*

*Gualt. Test. t. 3. f. L.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 52. 53. 55.*

*Knor. Verg. V. 21. t. 3. 4. f.*

N. III. 11. Helix Vol-  
 uulus.

N. III. 11. Das Wir-  
 belhorn.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 280.*

Testa trochiformi, umbilica- Die kräuselartige genabelte  
 ta, mucronata; apertura ro- spizwirblige Schale hat an der  
 tunda, labro reflexo. runden Mündung eine überge-  
 schlagene Schalenleiste.

*Petiv. Gaz. t. 77. f. 6.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 18. 19.*



N. III. 12. *Helix ungulina.*

N. III. 12. Das Schlangenhorn.

*Linn. S. N. Sp. 682.*

*Belg. Slangetje. Rumph. Angl. Thick - lip Cake - Shell. Pet. Gall. Cornet de Chasseur. Dav.*

*Testa utrinque umbilicata, subglobosa, apertura lunata, labro reflexo albo.* Die beiderseits genabelte, eignermaßen kugelförmige Schale hat an der mondformigen Mündung eine übergeschlagene weiße Schalenleiste.

*Basis obtuse carinata.*

Der Grund hat eine stumpfe Querkiele.

*Rumph. amb. t. 27 f. R.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 13.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 1. f. 11.*

*Gev. Belust. 7. t. 7. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13. *Helix Pileus.*

N. III. 13. Der Huthschirke.

*Müll. Hist. Verm. Sp. 277.*

*Testa perforata, conica, alba, fasciis transuersis rufis, apertura transuersa, labro reflexo.* Die durchbohrte kegelförmige weiße Schale ist mit rothbraunen Querbändern umgeben, und an der querliegenden Mündung mit einer übergeschlagenen Schalenleiste versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 13.



N. III. 14. *Helix mam-*  
*millaris.*

N. III. 14. Der War-  
zenschnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 685.*

Testa umbilicata, ovata;  
apertura oblonga, apici ad-  
nata.

Die genabelte eysförmige  
Schale hat eine länglichte mit  
der Schnirkelspitze verwachsene  
Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 36.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. III. 15. *Helix per-*  
*uerfa.*

N. III. 15. Der verkehr-  
te Schnirkel.

*Linn. S. N. Sp. 688.*

*Belg. Top-Slak. Gall. L'Unique.*

Testa subperforata, ovato  
oblonga, sinistrorsa, labro  
reflexo albo.

Die einigermaßen durchbohr-  
te, länglicht eyrunde links-  
gewundene Schale, hat eine  
übergeschlagene weiße Schalen-  
leiste.

„ aurantia, linea longitudinali una  
alteraue purpurea.

„ orangengelb, mit einer, oder  
mehrern nach der Länge herablau-  
fenden purpurrothen Linien.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 116.*

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Argenv. Conch. Pl. 9. f. G. interior.*

*Seb. Tbes. III. t. 40. f. 37.*

*Berlin. Mag. III. 28. t. 4. 5. f.*

♂ viridis, fasciis citrinis.

♂ grün, mit zitronengelben Bändern.

*List. Hist. Conch. l. 1. f. 34.*

*Gualt. Test. t. 5. f. P.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 4. f.*

γ alba, maculis longitudinalibus rufis. γ weiß, mit nach der Länge herablaufenden rothbraunen Flecken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 8. f. 64.*

*Petr. Gaz. t. 76. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 5. f. O.*

*Knor. Vergn. V. 23. t. 5. f.*

N. III. 16. *Helix janthina.*

N. III. 16. Die blane Schnirkelschnecke.

Linn.



Linn. S. N. Sp. 689.

Belg. Kwallen - Bootje.

Testa subimperfata sub- Die einigermaßen genabelte  
otunda, obtusa, fragili, apertu- fast runde, stumpfwirblige, dün-  
a dilatata, labro marginato. ne Schale hat eine erweiterte  
Mündung, mit einer überge-  
schlagenen Schalenleiste.

Rumph. amb. t. 20. f. 2.

Gualt. Test. t. 64. f. 0.

Berlin. Magaz. II. 2. t. 2. f.

Knor. Vergn. II. 30. t. 2. 3. f.

N. III. 17. Helix viui-  
para.

N. III. 17. Die leben-  
dig gebährende Schnirkel-  
schnecke.

Linn. S. N. Sp. 690.

Testa subimperfata, ouato Die einigermaßen durchbohr-  
oblonga, ventricosa, fasciis te länglichte ensförmige bäuchi-  
transuersis fuscis; apertura ge Schale hat braune Quer-  
rotunda. bänder, und eine runde Mün-  
dung.

List. angl. t. 2. f. 18.

— Hist. Conch. l. 2. f. 26.



*Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.*

*Gualt. Test. t. 5. f. A.*

*Argenv. Zoom. Pl. 8. f. 2.*

*Seb. Thes. III. t. 93. f. 34.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 8.*

*Berlin. Mag. IV. 7. t. 4—9. f.*

*Müll. Linn. Naturf. VI. 1. B. 18. t. 4. f.*

N. III. 18. *Helix vi-*  
*trea.*

N. III. 18. Der Glas-  
schirkel.

Testa subimperfiorata ouata,  
subpellucida, ventricosa, spi-  
rae anfractibus carinatis.

Die einigermaßen durchbohr-  
te eyförmige, halbdurchsichti-  
ge Schale hat kiel förmig erha-  
bene Schnirkelgewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata, fragilissima, sub-  
pellucida, laevis. Anfractus quin-  
que, infimus ventricosus, conue-  
xus; superiores spirales carinati.  
Apertura ouato oblonga. Columel-  
la perforata, foramine tenui subob-  
tecto. Color luteo fuscus; fasciis  
longitudinalibus undulatis sulphu-  
reis.

Die Schale ist eyförmig und sehr  
gebrechlich, halbdurchsichtig und  
glatt. Sie bestehet aus fünf Ge-  
winden, davon das unterste bäu-  
chig, und runderhaben, die oberen  
aber, welche den Schnirkel bilden,  
kiel förmig erhaben sind. Die Mün-  
dung ist länglicht eyförmig; Die  
Spindel durchbohret, mit einem  
dünnen halbgedeckten Nabelloch. Von  
gelblich brauner Farbe mit nach  
der Länge herablaufenden wellen-  
förmigen schwefelgelben Bändern.

N. IV.





N. IV. Redundatae, imperforatae.

N. IV. Rundlichte, undurchbohrte.

N. IV. I. *Helix nemoralis*.

N. IV. I. Die Waldschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 691.*

Testa imperforata, rotundata, labro fusco.

Die undurchbohrte rundlichte Schale hat eine braune Mündung.

$\alpha$  lutea unicolor.

$\alpha$  gelb, einfärbig.

*List. Hist. Conch. l. I. f. 54.*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 9.*

*Gev. Belust. 32. t. 398. f.*

$\beta$  lutea, fascia transuersa fusca.

$\beta$  gelb mit einer rothbraunen Querbinde.

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 2. f. D.*

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 18.*

*Gev. Belust. 32. t. 403. f.*

*Schroet. Erdk. 2. t. 38. f.*

$\gamma$  lutea, fasciis tribus fuscis, infima & media latissima.

$\gamma$  gelb, mit drey braunen Querbänden, davon die unterste und mittlere die breitesten sind.

*Gev.*



*Gev. Belust. 32. t. 407. f.*

♂ lutea, fasciis quatuor fuscis. ♂ gelb, mit vier braunen Querbändern.

*Gev. Belust. 32. t. 408 f.*

*Berlin Magaz. II. 3. t. 30. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 9. f.*

♀ lutea, fasciis quatuor fuscis, inferioribus subaequalibus, suprema angustiore. ♀ gelb, mit vier braunen Querbändern, davon die oberste schmaler, die unteren gleichbreit sind

*Berlin. Mag. II. 3. t. 27. 28. 29. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 2. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

♂ lutea, fasciis quinque fuscis, sursum decrescentibus. ♂ gelb, mit fünf braunen Querbändern.

*Seb. Thes. III. t. 39. f. 12.*

*Gualt. Test. t. 2. f. F.*

*Berlin. Mag. II. 3. t. 31. 32. f.*

*Schlott. Aët. helv. V. 3. t. 10. f.*

*Schroet. Erdkonch. I. t. 17. f.*

♀ rosea,



7 rosea, fasciis quinque transuer- 7 rosenroth, mit fünf braunen  
sis fuscis, binis, infimis latiori- Querbändern.  
bus.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 2. *Helix hor-*  
*tenfis.*

N. IV. 2. Die Garten-  
schnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, labro albo.

Die undurchbohrte rund-  
liche Schale, hat eine weiße  
Mündung.

Lutea, fasciis quinque transuer-  
sis fuscis, sursum decrecentibus.

Gelb, mit fünf braunen Quer-  
bändern, davon die oberen schmä-  
ler sind.

*Gev. Belust. 31. r. 374. 375. f.*

N. IV. 3. *Helix picta.*

N. IV. 3. Die gemalte  
Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglo-  
bosa, obtusa, laeui, columel-  
la anfractuumque margini-  
bus coloratis.

Die undurchbohrte rundlich-  
te glatte Schale, ist an der  
Spindel, und an dem Rande  
der Gewinde gefärbet.

Testa subglobosa, laeui. Anfra-  
ctus quatuor conuexi, infimus ven-  
tricosus, spirales obtusi, compla-  
nati. Apertura lunata. Columella  
spiralis, patens.

Die Schale ist einigermaßen fu-  
gelförmig, und glatt. Die vier  
Gewinde sind erhabenrund, davon  
das unterste bäuchig, die aber den  
Schnirkel ausmachen, stumpf und  
flach gedrückt sind. Die Mündung  
ist mondförmig. Die Spindel  
schnirkelförmig und offen.

α gri-



$\alpha$  grisea, columella lineaque suturali & transuersa dorſi fusca.

$\alpha$  lichtgrau, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Naht, und um die Mitte des Rückens.

*Mus. Caes. Vindobon.*

$\beta$  rosea, columella lineaque suturali & transuersa dorſi fusca.

$\beta$  rosenroth, mit brauner Spindel, und einer braunen Querlinie nächſt der Naht, und um die Mitte des Rückens.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 5.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 2. f.*

$\gamma$  sulphurea, columella lineaque suturali anfractuum rubra.

$\gamma$  Schwefelgelb, mit brauner Spindel, und rothen Linie an den Rändern der Gewinde.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. IV. 4. *Helix varicolor.*

N. IV. 4. Die bunte Schnirkelschnecke.

Testa imperforata subglobosa niuea, columella rosea, lineis transuersis fasciisque intermediis discoloribus.

Die undurchbohrte, rundliche Schale hat eine rothe Spindel, dünne Querlinien, mit dazwischen liegenden Bändern von verschiedenen Farben.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Te-



Testa subglobosa laevis. Anfractus conuexi, infimus ventricosus, spirales obtusi. Apertura lunata. Columella spiralis, imperforata. Color niueus, lineis transversis parallelis fuscis, fasciisque intermediis sulphureis; roseisque; columella rosea.

Die Schale ist rundlich, und glatt. Die sechs Gewinde sind eben, das unterste bäuchig, die den Schnirkel bilden stumpf. Die Mündung ist ensförmig. Die Spindel schnirkelförmig, undurchbohret. Von schneeweißer Farbe mit braunen gleichweitstehenden Quertlinien, mit safrangelben, und rothrothen Zwischenbändern. Die Spindel ist rosenroth.

N. IV. 5. *Helix aperta*.

N. IV. 5. Die offene Schnirkelschnecke.

Testa imperforata, subglobosa, spira obtusa, minima, columella spirali aperta.

Die undurchbohrte rundliche Schale hat einen stumpfen kleinen Schnirkel, und eine schnirkelförmige offene Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa, tenuis, longitudinaliter obsolete striata. Anfractus tres, infimus ventricosus, superior spirales obtusi, breues, complanati. Apertura lunata. Columella imperforata, spiralis, aperta. Color fuscus.

Die Schale ist einigermaßen kegelförmig, dünn, und nach der Länge sehr fein gestreift. Sie besteht aus drei Gewinden, davon das unterste bäuchig, die oberen Schnirkelgewinde aber stumpf, kurz, und flach gedrückt sind. Die Mündung ist mondformig. Die Spindel undurchbohret, schnirkelförmig, und offen. Die Farbe braun.

N. IV. 6.



N. IV. 6. *Helix Haematragus*.

N. IV. 6. Das Blut-  
ohr.

Testa conuexo trochiformi,  
castanea, fascia transuersa alba;  
apertura transuersim elongata  
rosea.

Die runderhabene kräuselförmige kastanienbraune Schale hat ein weißes Querband und eine querliegende länglichte rosenrothe Mündung.

*Liszt. Hist. Conch. l. 2. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 40. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 328. 329. f.*

Testa trochiformis. Anfractus quinque conuexi, uniformiter de crescentes, & eleuati in spiram conicam obtusam. Suturae contiguae crenulatae. Apertura transuersim elongata auriformis. Columella imperforata complanata. Color castaneus, fascia infra medium dorsi transuersa alba. Apertura, & spirae apex rosea.

Die Schale ist kegelförmig. Die fünf Gewinde sind erhabend und, nebeneinander gleichförmig ab in einer kegelförmigen Schnirkel. Die Näthe sind an einander verwachsen und gekerbet. Die Mündung ist in die Quere verlängert und ohrförmig. Die Spindel undurchbohret und flach. Von kastanienbrauner Farbe mit einem weißen Querbande unter der Mitte des Rückens. Die Mündung und die Schnirkelspitze sind rosenroth.

N. IV. 7. *Helix Melanotragus*.

N. IV. 7. Das Schwarze-  
ohr.

Testa



Testa connexa, trochiformi, castanea, fasciis duabus transuersis niueis; apertura transuersim elongata nigra.

Die runderhabene kranfelförmige kastanienbraune Schale hat zwey schneeweiße Quersbänder und eine in die Quere verlängerte schwarze Mündung.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa simillima priori: parum depressior, castanea, fascia transversa niuea, prope futuram tenui, lata vero infra medium dorſi. Apertura ex fusco nigra.

Die Schale ist der vorhergehenden am ähnlichsten: nur etwas flacher, von kastanienbrauner Farbe, mit zwey schneeweißen Quersbändern, davon das schwälere nächst der Naht, das breite aber unter der Mitte des Rückens liegt. Die Mündung schwarzbraun.

N. V. Turritae.

N. V. Getbürmte.

N. V. 1. *Helix decolata*.

N. V. 1. Die abgestuzte Schnirkelnadel.

*Linn. S. N. Sp. 695.*

Testa turrita, subperforata; vertice obtuse truncato, apertura ouata-

Die gethürmte, einigermaßen durchbohrte Schale hat eine stumpf abgestuzte Schnirkelspize; mit einer eyförmigen Mündung.



*Bonan. Recr. cl. 3. f. 56.*

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 12.*

*Petiv. Gaz. t. 66. f. I.*

*Gualt. Test. t. 4. f. O. P. Q.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 5.*

*Knor. Vergn. VI. 12. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. I. f. 3.*

N. V. 2. *Helix calca-*  
*rea.*

N. V. 2. Die Marmor-  
nadel.

Testa turrita, longitudinali-  
ter striata, alba; anfractibus  
decem, apertura ovata.

Die gehürnte nach der Längs-  
ge feingestreifte weiße Schale  
hat eine stumpf abgestuzte  
Schnirkelspize mit einer eysför-  
migen Mündung.

*List. Hist. Conch. l. I. f. I. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 6. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa priori simillima: at triplo  
major, nitens, longitudinaliter re-  
nuissime striata. Anfractus decem,  
teretes, vniformiter decrescetes.

Die Schale ist der vorigen am  
ähnlichsten: aber dreymal größer,  
glatt, und nach der Länge sehr  
fein gestreift. Die zehn Gewinde  
Aper-





Apertura ouata. Columella torta, sind rund, und nehmen gleichförmig ab. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel gedreht, und mit einer ausgebreiteten dünnen Lefze gedeckt. Von weißer Farbe.

An prioris varietas perfecta?

Vielleicht eine vollkommene Abänderung der vorigen Art.

N. V. 3. *Helix plicata.*

N. V. 3. Die gefaltene Schnirkelnadel.

= *Helicaria*  
*in ovata last page*

Testa subulata, anfractibus plicis longitudinalibus coronatis.

Die ahlförmige Schale ist an den Gewinden mit erhabenen nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt.

Gualt. Test. t. 6. f. H.

Berlin. Magaz. IV. 10. t. 51. f.

Mus. Caes. Vindobon.

Testa subulata subpellucida. Anfractus decem conuexi, prope futuram superiorem plicis elevatis longitudinalibus coronati. Apertura ouata. Columella elabiata.

Die Schale ist ahlförmig und halb durchsichtig. Die zehn Gewinde sind erhabenrund, und an der obern Naht mit nach der Länge herablaufenden Falten gekrönt. Die Mündung ist eysförmig. Die Spindel ohne Lefze.



N. V. 4. *Helix macu-  
lata.*

N. V. 4. Die gefleckte  
Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, pic-  
ta undis longitudinalibus ru-  
tis.

Die ahlförmige glatte Scha-  
le ist mit nach der Länge her-  
ablaufenden rothbraunen Wel-  
len bemalt.

*Gualt. Test. t. 6. f. G.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subulata, laevis, striis  
transuersis subtilissimis circumdata.  
Anfractus circiter duodecim conue-  
xi. Apertura ovata. Labium lae-  
ue. Color pallidus, fasciis undu-  
latis longitudinalibus rufis.

Die Schale ist ahlförmig und  
glatt, mit sehr feinen Quersstreifen  
umgeben. Die Gewinde deren her-  
läufig zwölf, sind erhabenrund. Die  
Mündung eiförmig. Die Spindel-  
seite glatt. Von bläßer Farbe mit  
nach der Länge laufenden roth-  
braunen Wellen bemalt.

N. V. 5. *Helix fusca-  
tus.*

N. V. 5. Die braune  
Schnirkelnadel.

Testa subulata laeui, anfra-  
ctibus teretibus.

Die ahlförmige glatte braun-  
ne Schale hat flachrunde Ge-  
winde.

*List. Hist. Conch. l. 2. f. 10.*

*Gualt. Test. t. 6. f. E.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa



Testa subulata laevis, transuersim  
subtilissime striata, Anfractus de-  
cem reretes. Apertura ouata. La-  
bium laeu. Faux cinerea. Color  
ex luteo fuscus.

Die Schale ist eysförmig und  
glatt, in die Quere sehr fein ge-  
streift. Die zehn Gewinde sind  
flachrund. Die Mündung eysförmig.  
Die Spindelöse ist glatt.  
Der Schlund aschengrau. Die Scha-  
le außen gelblichbraun.

N. VI. Ouatae, imperforatae.

N. IV. Eysförmige, undurchbohrte,

N. VI. I. Helix Ama-  
rula.

N. VI. I. Die Fluß-  
Papstkrone.

*Lin.* S. N. Sp. 702.

*Belg.* Rivier Pause - Kroon, *Rumph.* *Angl.* River - Mitter - Shell.  
*Petiv.* *Gall.* La tiare fluviatile. *Dav.*

Testa ouata imperforata, ni-  
gra; anfractibus sursum spinoso  
dentatis.

Die eysförmige undurchbohr-  
te schwarze Schale ist oben an  
den Gewinden mit zahnsförmigen  
Stacheln besetzt.

Dorsum notatum cicatricibus oua-  
libus, margine albo cinctis, quem-  
admodum Nerita pulligera.

Der Rücken ist nach Art der  
bruttragenden Schwimmschnecken,  
mit eysförmigen Narben besetzt, die  
mit einem weißen Saume eingefasst  
sind.

*List. Hist. Conch.* l. 2. p. I. f. 33.

*Rumph. amb.* t. 33. f. F. F.



*Petiv. amb.* 1. 4. f. 3.

*Gualt. Test.* t. 6. f. B.

*Argenv. Conch. Pl.* 27. f. post 6tam.

*Seb. Thes.* III. t. 53. f. 24. 25.

*Berlin. Magaz.* IV. 9. t. 38. f.

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 2. *Helix stagnalis.* N. IV. 2. Das Teichhorn.

*Linn. S. N. Sp.* 703.

Testa ovato subulata, im- Die eysförmige ahlförmig zu-  
perforata, subangulata, ven- gespizte Schale ist bäuchig und  
tricosa; apertura ovata. etwas eckig, mit einer eysförmigen Mündung.

*List. angl.* t. 2. f. 21.

—— *Hist. Conch.* l. 4. p. I. f. 21.

*Bonan. Recr. cl.* 3. f. 55.

*Gualt. Test.* t. 5. f. 7.

*Argenv. Conch. Pl.* t. 27. f. 6.

—— *Zoom. Pl.* 8. f. 5.

*Seb. Thes.* III. t. 39. f. 41 — 46. 52. 53.

*Klein. Meth. Ostr.* t. 3. f. 69.

*Slotterb. Aët. helv.* V, t. 3 f. 25. 26.

Ginan.



*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. A. B. C.*

*Berlin. Mag. IV. 9. t. 33. 35. 36. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

N. VI. 3. *Helix auricularia.*

N. VI. 3. Das Ohrhorn.

*Linn. S. N. Sp. 708.*

*Gall. La Conque spherique.*

Testa subimperfectorata am-  
pullacea, spira mucronata  
breui, apertura ampliata.

Die undurchbohrte aufgebla-  
sene Schale hat kurze, ver-  
dünnte Schnirkelspitze, und  
eine weite Mündung.

*List. angl. t. 2. f. 23.*

—— *Hist. Conch. l. 1. p. 1. f. 23.*

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 54.*

*Gualt. Test. t. 5. f. F. G.*

*Argenv. Conch. Pl. 27. f. 7.; Pl. 28. f. 22.*

*Schlott. Aët. belv. V. 3. t. 27. 28.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 3.*

*Berlin. Mag. III. 5. t. 66. f.*

—— ——— IV. 11. t. 59. f.

*Schroet. Erdk. I t. 3 f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 4.*

*Mus. Caes. Vindobon.*



N. VI. 4. *Helix solidida*.

N. VI. 4. Die dickschalige Schnirkelschnecke.

*Testa* ovato oblonga, imperforata solida, glabra; anfractibus convexus, columella incrassata.

Die eiförmig länglichte und durchbohrte Schale ist dicht und glatt, mit erhabenrunden Gewinden, und einer verdickten Spindel.

*Mus. Caes. Vindobon.*

*Testa* oblonga, solida, glabra. Anfractus sex convexus, continui. Apertura rotundato oblonga. Columella imperforata, labio incrassato, breui. Color roseus, lineis transversis tenuissimis rubro alboque articulatis.

Die Schale ist länglicht, dicht, und glatt. Die sechs Gewinde sind an einander verwachsen, und erhabenrund. Die Spindel ist undurchbohret, mit einer verdickten Lefze. Von rosenrother Farbe, mit sehr feinen roth und weiß unterbrochenen Querlinien.

N. VI. 5. *Helix halioidea*.

N. VI. 5. Die Milchschale.

Linn. S. N. Sp. 713.

Belg. Witte Oor - Schulp. Angl. White Ear. Pet. Gall. Oreille de Venus. Dav.

*Testa*



Testa elliptica, complana-  
a, imperforata; apertura ad  
picem usque hiantē.

Die elliptische, plattgedrück-  
te undurchbohrte Schale hat  
eine Fiss in die innerste Wirbel-  
spitze offene Mündung.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 21.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 29.*

*Rumph. amb. t. 40. f. R.*

*Gualt. Test. t. 69. f. F.*

*Argenv. Conch. Pl. 5. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 2.*

*Klein. Meth. Ostr. t. 7. f. 114.*

*Knor. Vergn. VI. 39. t. 5. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 15. t. 151. 152. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 3. f. 8.*

N. VI. 6. *Helix ambi-*  
gua.

*Linn. S. N. Sp. 714.*

N. VI. 6. Der Halb-  
mond.

Testa subimperforata, ro-  
tunda a, solida; apertura se-  
miorbiculari; labio incrassa-  
to.

Die undurchbohrte, rund-  
liche, dicke Schale hat eine  
halbrunde Mündung mit einer  
verdickten Spindelkante.

Labium citrinum.

Die Spindelkante ist zitrongelb.



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 39. 40.*

*Adans. Seneg. Pl. 1. f. 6. 7.*

*Gev. Belust. 28. t. 319. 320. f.*

*Knor. Vergn. VI. 23. t. 5. 6. f.*

O. Nerita.

O. Die Schwimm-  
schnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 329.*

Testa spiralis. Aper-  
turae labio transverso pla-  
niusculo.

Die Schale ist schnir-  
felförmig. Die Mündun-  
g hat eine flachgedrückt  
querliegende Spindellefze

O. I. Umbilicatae.

O. I. Genabelte.

O. I. 1. Nerita Can-  
rena.

O. I. 1. Der Knoten-  
nabel.

*Linn. S. N. Sp. 715.*

*Belg. Navel-Slak. Angl. Dice Nerit.*

Testa umbilicata, laevi;  
spira mucronata; umbilico  
gibbo bifido.

Die genabelte, glatte, spiz-  
wirblice Schale hat einen hö-  
ckerigen zweytheiligen Nabel.

α albi-





*albida*, punctis adspersa ferrugineis.  $\alpha$  weißlich, mit rostfarbigen Punkten.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 228.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. Q. S.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 3.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 60. 61.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 3. f.*

*Murr. Fund. Test. t. 1. f. 23.*

$\beta$  *albida*, seriebus transuersis macularum ferruginearum.  $\beta$  weißlicht, mit Querbändern von rostfarbigen Flecken.

*Bonan. Recr. cl. 3. f. 224.*

*Gualt. Test. t. 67. f. R.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 62. 63.*

*Gev. Belust. 27. t. 303. 304. f.*

$\gamma$  *albida*, lineis longitudinalibus angulatis ferrugineis.  $\gamma$  weißlicht, mit nach der Länge laufenden rostfarbigen Winkelzügen.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. I.*

*Gualt. Test. t. 67. f. X.*

*Gev. Belust. 27. t. 295. 302. f.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. C.*

*Adams. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. I. 54.*

*Regensf. Samml. I. 3. t. 34. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 4. f.*

♂ grisea, fasciis transversis albo ♂ gelbgrau, mit weiß und braun-  
fuscoque articulatis. unterbrochenen Querbändern.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 3. 4. 8.*

*Gualt. Test. t. 67. f. V.*

*Seb. Thes. t. 38. f. 27. 28. 51. 52. 64. 65.*

*Gev. Belust. 27 t. 294. f.*

*Knor. Vergn. I. 10. t. 5. f.*

—— — II. 10. t. 5. f.

—— — III. 15. t. 4. f. ; 20. t. 4. f.

O. I. 2. *Nerita glau-*  
*cina.*

O. I. 2. Die dicklipp-  
ge Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 716.*

Belg.



*all. Limaçon du Rivage.*

Testa umbilicata laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 fra obtusa, umbilico semi-wirblige Schale hat einen halb-  
 cufo; labio gibbo decolore, gedeckten Nabel, mit einer hö-  
 ckerigen gefärbten Lippe.

*List. angl. t. 3 f. 10.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 10.*

*Rumph. amb. t. 22. f. C.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 11.*

*Gualt. Test. t. 67. f. M. P. T.*

*Adans. Seneg. Pl. 13. f. 4.*

*Seb. Tbes. III. t. 38. f. 33.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 7. f.*

O. I. 3. *Nerita rufa.*

O. I. 3. Die braune  
*Nerite.*

*Angl. Twin girdled Nerit. Petiv.*

Testa umbilicata, laeui, Die genabelte glatte stumpf-  
 spira obtusa, umbilico bis- wirblige Schale, hat einen  
 do, zweispaltigen Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 34.*

*Rumph. amb. t. 22. f. D.*

*Petiv.*



*Petiv. amb. t. 11. f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. Z.*

*Seb. Tbes. III. t. 39. f. 30.*

*Gev. Belust. 27. t. 296. f.*

Testa subglobosa, laevis. Anfractus quatuor, infimus ventricosus, superiores efformantes spiram complanatam, obtusam. Apertura semirotonda. Labium reflexum, glabrum, non claudens umbilicum. Umbilicus profundus, costa elevata bipartitus.

Die Schale ist einigermaßen genabelt und glatt. Von den vier Gewinden ist das unterste bündel, die obern bilden einen zusammengedrückten stumpfen Schnirkel. Die Mündung ist halbrund. Die Epibellefze ist übergeschlagen, und glatt mit einem offenen tiefen Nabel, welcher durch eine erhabene Kante in zwey getheilet wird.

O. I. 4. *Nerita Vitellus.*

*Linn. S. N. Sp. 717.*

O. I. 4. *Der Eyerdotter.*

*Belg. Strand - Doijer. Angl. Doyer Velk Nerit- Pet. Gall. Jaur d' oeuf. Dav.*

Testa umbilicata subglobosa laevi, umbilico aperto aequali,

Die genabelte einigermaßen kugelfunde glatte Schale hat einen offenen glatten Nabel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 12.*

*Rumph. amb. t. 22. f. A.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 13.*

*Gualt. Test. t. 67. f. L.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. D.*

*Gev. Belust. 27. t. 292 f.*



*Seb. Thes. III. t. 38. f. 30. 31.*

*Knor. Vergn. I. 7. t. 2. f.*

— — II. 8. t. 5. f.

O. I. 5. *Nerita Albu-*  
nen.

O. I. 5. Der geschobe-  
ne Eyerdotter.

*Linn. S. N. Sp. 718.*

*Belg. Platte Doyer. Angl. Velk Nerit. Gall. Jaune d'oeuf applati. Dav.*

Testa umbilicata conuexa, Die genabelte erhabenrunde  
umbilico subcordato, labio ex- Schale hat einen etwas herz-  
anato. förmigen Nabel, mit einer aus-  
gebreiteten Spindellippe.

*Rumph. amb. t. 22. f. B.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 14.*

*Gualt. Test. t. 67. f. A. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. T.*

*Gev. Belust. 28. t. 309. f.*

*Regenf. Samml. I. 5. t. 54. f.*

*Knor. Vergn. II. 11. t. 1. f.*

— — IV. 7. t. 4. 5. f.

O. I. 6. *Nerita Mam-*  
milla.

O. I. 6. Der Warzen-  
dotter.

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 719.*

*Belg. Slek-hoorn. Angl. White Nerit. Petiv. Gall. Mammelo blanc. Dav.*

*Testa umbilicata, ouata, Die genabelte, eysförmige*  
*glabra; umbilico obtecto, a- glatte Schale hat einen gedeck-*  
*pertura ouata. ten Nabel, mit einer eysförmigen*  
*Mündung.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 5. f. 22.*

*Rumph. amb. t. 22. f. F.*

*Petiv. amb. t. 10. f. 15.*

*Gualt. Test. t. 67. f. C. D.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. X.*

*Seb. Thes. III. t. 38. f. 9. 10.*

*Gev. Belust. 28. t. 306. f.*

*Knor. Vergn. I. 6. t. 6. 7. f.*

— — — *IV. 8. t. 4. f.*

— — — *VI. 40. t. 2. 3. f.*

*O. I. 7. Nerita fulca-*  
*ta.*

*O. I. 7. Die gefurchte*  
*Schwimmschnecke.*

*Testa subglobosa, sulcis*  
*longitudinalibus, obliquatis;*  
*umbilico bifido,*

*Die einigermaßen kugelför-*  
*mige Schale hat nach der Län-*  
*ge herab, etwas schief laufen-*  
*de Strahlen, und einen zwey-*  
*spaltigen Nabel.*

*Knor.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa subglobosa. Anfractus quatuor. Spira mucronata. Sulci seu sulcae incisae secundum longitudinem descendentes. Umbilicus perforatus, costa eleuata bipartitus. Color lacteus.

Die Schale ist einigermaßen kugelförmig. Der Gewinde sind vier. Der Schnirkel ist zugespitzt. Nach der Länge herab und etwas schief laufen ausgeschnittene Furchen oder Falten. Der Nabel ist offen, und mit einer erhabenen Rille in zwei getheilet. Von schneeweißer Farbe.

O. II. Imperforatae, labio edentulo.

O. II. Undurchbohrte, ohne Zähnen an der Spindelöffnung.

O. II. 1. Nerita Radula.

O. II. 1. Die rauhe Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 721.*

Testa transuersim sulcata, costis intermediis acutè tuberculatis.

Die Schale ist der Quere nach gefurchet, und auf den Zwischenribben mit spizigen Körnern besetzt.

*Gev. Belust. 23 t. 241 f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. II. 2. Nerita littoralis.

O. II. 2. Die Strandschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 723.*



Testa laeui', vertice obtu-  
fiusculo, labio acuto eden-  
tulo.

Die glatte etwas stumpf-  
wirblice Schale hat eine schar-  
fe Schalenleiste ohne Zähne.

*List. angl. t. 2. f. 2.*

— *Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 35 — 38.*

*Gev. Belust. 24. t. 250. 252 257. f.*

Picturis, & coloribus innumeris  
varians.

Davon giebt es der Farbe und  
Zeichnung nach unzählbare Spiel-  
arten.

O. II. 3. *Nerita lacustris.*

O. II. 3. Die Sumpf-  
nerite.

*Linn. S. N. Sp. 725.*

Testa laeui, apice exqui-  
sito, labiis edentulis.

Die glatte Schale hat eine  
hervorragende Wirbelspitze, und  
ungezähnelte Leisten.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 38. ; l. 4. f. 6. f. 43*

*Petiv. Gaz. t. 91. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 4. f. M. LL.*

*Gev. Belust. 24. t. 258 — 255. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 27. 28. f.*

O. III. Imperforatae, labio den-  
tato.

O. III. Undurchbohrte mit un-  
gezählter Spindelkeule.

O. III. 1. *Nerita pul-  
liger.*

O. III. 1. Die brutt-  
tragende Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 726.*

*Belg. Rood-Oog. Angl. Red Nerit.*

Testa





Testa laeui, spirae apice Die glatte Schale hat eine na-  
 excavato umbilicato, labio belförmig ausgehöhlte Schnur-  
 crenulato. kelspize, und eine glatte fein-  
 gekerbte Spindellefze.

*List. Hist. Conch. l. 2. p. 1. f. 37.*

*Petiv. Gaz. t. 11. f. 4.*

— amb. t. 11. f. 4.

*Rumph. amb. t. 22. f. H.*

*Gualt. Test. t. 4. f. HH.*

*Seb. Thes. III. t. 41. f. 23 — 26.*

*Gev. Belust. 31. 23. t. 242. f.*

*Berlin. Mag. IV. 8. t. 31. f.*

*Knor. Verg. VI. 13. t. 3. f.*

O. III. 2. *Nerita cor-  
 nea.*

O. III. 2. Die Horn-  
 nerite.

*Linn. S. N. Sp. 722.*

Testa rotundata, obsolete  
 striata, labiis edentulis.

Die rundlichte mattgestreifte  
 Schale hat an den Lippen kei-  
 ne Zähne.

Nigra, punctis fasciisque trans-  
 versis, luteis.

Schwarz, mit gelben Punkten  
 und Querbändern.

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. M.*

*Gev. Belust. 22. t. 226. f.*

O. III. 3. *Nerita viri-  
 dis.*

O. III. 3. Die grüne  
 Schwimmschnecke.

D d 2

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 729.*

Testa laeui viridi, labio  
crenulato.

Die glatte grüne Schale hat  
eine feingekerbte Schalenleiste.

*Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 4. *Nerita virgi-*  
*nea.*

O. III. 4. Der Blutz  
zahn.

*Linn. S. N. Sp. 730.*

*Belg. Ploedige Tand. Gall. Quenotte.*

Testa laeui, ouata, labio  
gibbo, crenulato.

Die glatte eiförmige Schale  
hat eine höckerige feingekerbte  
Schalenleiste.

*Bonon. Recr. cl. 3. f. 204.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 25. 26.*

*Petiv. Gaz. t. II<sup>d</sup> f. 3.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. P.*

*Geu. Belust. 24. t. 251. f.*

*Knor. Vergn. V. 3. t. 2. f.*

O. III. 5. *Nerita pen-*  
*nata.*

O. III. 5. Die gefiederte  
Schwimmschnecke.

Testa



Testa rotundata, laeui, labio plano crenulato.

Die rundliche glatte Schale hat eine flache feingekerbte Schalenleſze.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 29.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa rotundata, laevis. Anfractus circiter quatuor, infra suturam complanati. Spira obtusa; Apex erosus. Apertura semicircularis. Labrum acutum. Labium complanatum, crenulatum. Color oliuaceus alboque varius, maculis transuersis pennatis nigris.

Die Schale ist rundlich und glatt. Die Gewinde, deren ungeſehr vier ſind, an der Naht ſammengedrückt. Der Schnirkel iſt ſtumpf; die Spitze ausgeſtreſſen. Die Mündung halbrund. Die Schalenleſze ſcharfrandig. Die Spindelſeſze flach, und gekerbet. Die Farbe olivengrün, und weiß geſpelt, mit federförmigen querliegenden ſchwarzen Flecken.

O. III. 6. Nerita polita.

O. III. 6. Die glatte Schwimmschnecke.

*Linn. S. N. Sp. 731.*

Testa laeui, obtusa, labio dentato, labro crenulato.

Die Schale iſt glatt und ſtumpfwirblig, die Spindelſeſze gezähnt, die Schalenleſze gekerbet.

„ fusco alboque nebulosa, fasciis transuersis rubris.

„ braun und weiß nebelicht, mit rothen Querbändern.



*Litt. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 66. f. G.*

*Regenf. Samml. I. 4. t. 43. f..*

*Seb. Thes. III. t. 59. f. 1. 3.*

*Gev. Belust. 22. t. 223. 224. f.*

♂ albo, fuscoque nebulosa,

♂ weiß, und braun nebelicht.

*Rumph. amb. t. 22. f. 7.*

*Petiv. amb. t. II. f. 20.*

*Gualt. Test. t. 66. f. H.*

*Argenv. Conch. Pl. 7. f. K.*

*Gev. Belust. 22. t. 220 — 221. f.*

γ griseo rubroque nebulosa, fasciis γ lichtgrau, und rothnebelicht,  
transuersis niueis. mit schneeweißen Querbändern.

*Bonap. Recr. cl. 3. f. 221.*

*Gev. Belust. 24. t. 245. f.*

O. III. 7. Nerita Polorontje.

O. III. 7. Der Peleoront Nerite.

*Linn. S. N. Sp. 732.*

*Belg. Poelorontje. Rumph. Angl. Poeloroon Nerit. Petiv.*

**Testa**



Testa striata, labiis den- Die gestreifte Schale hat  
tatis, interiore planiusculo gezähnte Lippen, deren innere  
rugoso. flach, und runzelicht ist.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. II.*

*Rumph. amb. t. 22. f. K.*

*Petiv. amb. t. II. f. 6.*

*Gev. Belust. 27. t. 299. f.*

*Knor. Vergn. III. 1. t. 4. f.*

O. III. 8. Nerita Albi-  
cilla.

O. III. 8. Die stumpfe  
Schwimm Schnecke.

*Linn. S. N. Sp. 733.*

Testa striata, spira obtu- Die gestreifte Schale hat  
fissima, labiis dentatis, inte- einen sehr stumpfen Wirbel,  
riore tuberculato. und gezähnte Lippen, deren  
innere mit Körnern besetzt ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. 8.*

*Gev. Belust. 23. t. 229. f.*

*Knor. Vergn. VI. 13. t. 4. f.*

O. III. 9. *Nerita plicata*.O. III. 9. Die gefaltene  
nerite.*Linn. S. N. Sp. 735.*

Testa fulcata, labiis den-  
tatis, interiore rotundato,  
exteriore utrinque dentibus  
acutis.

Die gefaltene Schale ha-  
gezähnte Lippen, deren inner  
rundlicht, die äussere aber bei  
derseits mit spizigen Zähnen be-  
setzt ist.

*Knor. Vergn. V. 15. t. 4. f.**Mus. Caes. Vindobon.*O. III. 10. *Nerita grossa*.O. III. 10. Die geribbte  
Schwimm Schnecke.*Linn. S. N. Sp. 736.*

Testa fulcata, labiis den-  
tatis, interiore conuexo ru-  
goso.

Die gefurchte Schale hat  
gezähnte Lippen, deren innere  
runderhaben, und runzelicht  
ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. N.**Petiv. amb. t. 5. f. 8.**Gev. Belust. 22. t. 228. f. ?**Mus. Caes. Vindobon.*

O. III. 9.



O. III. 11. *Nerita Chamaeleon*.

*Linn. S. N. Sp. 737.*

O. III. 11. Das Kamelotchen.

*Pelg. Kamelotje. Rumph. Angl. Camel Nerit. Petiv.*

Testa sulcis viginti, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

Die Schale hat zwanzig Furchen, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Rumph. amb. t. 22. f. L.*

*Petiv. amb. t. 11. f. 7.*

*Gev. Belust. 23. t. 234. f.*

*Regenf. Samml. I. 3. t. 26. f.*

*Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f.*

*omitt. see last pag.*

O. III. 12. *Nerita undata*.

*Linn. S. N. Sp. 738.*

O. III. 12. Die Wellenerite.

Testa sulcis triginta, labiis dentatis, interiore rugoso, tuberculato.

Die Schale hat dreißig Runzeln, und gezähnte Lippen, deren innere mit Runzeln und Körnern besetzt ist.

*Bonan. Recr. cl. 2. f. 215.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 6. f. 6.*

*Rumph. amb. t. 22. f. 4.*



*Gev. Belust.* 22. t. 227. f.

*Knor. Vergn.* VI. 13. t. 2. f.

O. III. 13. *Nerita Exuvia.*

O. III. 13. Die breite  
furchige Schwimmschnecke

*Linn. S. N. Sp.* 739.

*Belg.* Geworte Alykruyk. *Angl.* Deep - rigd *Nerit.* *Petiv.*

*Testa* sulcata, labiis dentatis, interiore tuberculato. Die gefurchte Schale mit gezähnte Lippen, deren innere mit Körnern besetzt ist.

*Bonon. Recr. cl.* 3. f. 220.

*List. Hist. Conch. l.* 4. f. 6. f. 14.

*Petiv. Gaz. t.* 100. f. 6.

— amb. t. 11. f. 9.

*Rumph. amb. t.* 22. f. M.

*Gualt. Test. t.* 66. f. CC.

*Argenv. Conch. Pl.* 7. f. 7.

*Seb. Thes. III. t.* 59. f. 4—9.

*Gev. Belust.* 23. t. 239. 240. f.

*Knor. Vergn. III. I. t.* 5. f.

*Da Cost. Elem. Pl.* 3. 14. 15. f.





P. Haliotis.

P. Die Ohrschnecke.

Testa auriformis, foraminibus secundum longitudinem digestis. Spira occultata laterali.

Die Schale ist ohrförmig und der Länge nach mit Löchern durchbohret. Der Schnirkel stehet verborgen an der Seite.

P. I. Haliotis Midas.

P. I. Das Hohlohr.

Linn. S. N. Sp. 740.

Belg. Groot Holzeeor. Angl. The great Ear-Shell. Hill. Gall. La grande Oreille de Mer.

Testa subrotunda, rugosa, limbo lato.

Die beinahe runde und runzelichte Schale hat einen breiten Rand.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 96. f. B.

Valent. Abb. 12. t. 102. f.

Argenv. Conch. Pl. 3. f. A.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Knor. Vergn. V. 20. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 136. f.

P. 2.



P. 2. *Haliotis striata*.

P. 2. Das gestreifte Ohr.

*Linn. S. N. Sp. 742.*

*Belg. Gestrepte Zeeohr. Gall. Oreille de mer striée.*

Testa ovata, transuersim Die eysförmige Schale  
rugosa, longitudinaliter stria- nach der Quere gerunzelt, un-  
ta. in die Länge gestreift.

*Knor. Vergn. I. 20. t. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 138. f.*

P. 3. *Haliotis marmo-  
rata*.

P. 3. Das Marmorohr.

*Linn. S. N. Sp. 744.*

*Gall. Oreille marbrée.*

Testa ovata, striis longitu- Die eysförmige Schale ist de-  
dinalibus, transuersis, obsole- Länge nach gestreift, und i-  
tis. die Breite mit matten Strei-  
fen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 6.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. B.*

*Knor. Vergn. II. 17. t. 4. 5. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 14. t. 139. f.*

P. 4. *Haliotis asinina*.

P. 4. Das Eselohr.

*Linn. S. N. Sp. 745.**elg. Lange Parlemoor - Schulp. Angl. Long Sea Ear. Hill. Gall. ille d'ane. Dav.*

Testa ovato oblonga, glabra, Die eysförmige, länglichte  
 rgine subsulcato, dorso glatte Schale ist am Rande  
 iato. einigermaßen gefurchet, und  
 auf dem Rücken gestreiset.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 7. f. 1.**Rumph. amb. t. 40 f. E. F.**Petiv. amb. t. 16. f. 34.**Gualt. Test. t. 69. f. D.**Argenv. Conch. Pl. 3. f. E.**Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.**Regenf. Samml. III. 9. t. 29. f.**Knor. Vergn. III. 15. t. 1. f.**Mart. Konch. Kab. I. 16. t. 150. f.*



## Q. Patella.

## Q. Die Napfsschnecke.

Testa fornicata, subconica, absque spira.

Die Schale ist gewölbel kegelförmig, ohne Schnirkel.

Q. I. Labio interno.

Q. I. Mit einer Lippe in der inneren Wölbung.

Q. I. I. Patella equestris-

Q. I. I. Die Fischweiberhaube.

Linn. Sp. N. Sp. 747.

Belg. Vjschhuifje. Rumph. Angl. Beaked Limpet. Hill. Gall. L. Cabochon. Dav.

Testa conica, vertice obliquo, labio subverticali canaliculato.

Die kegelförmige Schale hat einen schiefen Wirbel, und eine rinnenförmige nahe unter dem Wirbel stehende Lippe.

Bonan. Recr. cl. 1. f. 12.

List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 39.

Rumph. amb. t. 40. f. P. O.

Petiv. amb. t. 16. f. 28.

Gualt. Test. t. 9. f. Z.

Hill.



Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Dav. Cat. syst. I. Pl. 2. f. B. b.

Mart. Konch. Kab. I. 13. t. 117 — 110. f.

Murr. Fund. Test. t. I. f. 5.

Walch Naturf. IX. 3. t. I. 2. f.

Q. I. 2. Patella fornicata,      Q. I. 2. Der Pantosel.

Linn. S. N. Sp. 751.

Belg. Pantoseltje. Angl. Small indian Canoe-Shell. Gall. Le Sante.  
e. Dav.

Testa ovata, vertice marginali, mucronato, incuruo, la- Die euförmige Schale hat  
o interno concauo. an einem Ende einen spitzigen  
gekrümmten Wirbel, mit einer  
hohlen Lippe.

List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 33.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. N.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 8.

Knor. Vergn. VI. 21. t. 3. f.

Mart., Konch. Konch I. 13. t. 129. 130. f.

Q. II.



Q. II. Margine angulato.

Q. II. Mit eckigem Rande.

Q. II. 1. Patella saccharina,

Q. II. 1. Die Sternpatelle.

*Linn. S. N. Sp. 754.**Belg. Bonnetje. Angl. White rib'd Limpet. Pet. Gall. Astrolepas. Das*Testa margine angulato,  
costis carinatis acutis.Die Schale hat einen eckigen Rand, und scharfsielig  
Ribben.*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 10.**Rumph. amb. t. 40. f. B.*° *Petiv. amb. t. 3. f. 3.**Gualt. Test. t. 9. f. M. O.**Argenv. Conch. Pl. 3. f. M.**Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 4.**Knor. Vergn. III. 29. t. 3. f.**Mart. Conch. Kab. I. 9. t. 76. f.**Murr. Fund. Test. t. 1. f. 6.*

Q. II. 2. Patella barbara.

Q. II. 2. Die Mütze.

*Linn. S. N. Sp. 755.**Belg. Grasje.*

Testa



Testa angulata , costis viginti undatis , tuberculatis.

Die eckige Schale hat 20 wellenförmige knottige Rippen.

*Knor. Vergn. V. 13. t. 3. f.*

Q. II. 2. Patella plicata.

Q. II. 2. Die Faltenpatelle.

*Gall. La tete de Meduse, Dav.*

Testa angulata , costis triginta obtusis , undulosis , transversim rugosis.

Die eckige Schale hat dreißig stumpfe , wellenförmige , in die Quere gerungelte Rippen.

*Knor. Vergn. III. 30. t. 1. f.*

*Dav. Cat. syst. I. Pl. 3. f. D.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovata. Margo dentatus, dentibus 30-34. Costae totidem dorsales, undatae, transversim rugosae. Vertex subcentralis, obtusus. Color albus, maculis fuscis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand mit 30 — 34 Zähnen umgeben. Auf dem Rücken liegen ebenso viele wellenförmige und in die Quere gerungelte Rippen. Der Querschnitt zeigt einen Wirbel nahe am Mittelpunkt. Weiß mit braunen Flecken.



Q. II. 3. *Patella granularis*.

Q. II. 3. Die Festung.

Linn. S. N. Sp. 756.

Belg. De Fortresse. Angl. The Fortresse. Gall. La Forteresse. Dav.

Testa angulata, dorso squamis angulatis imbricato, fundo fusco. Die eckige Schale hat auf dem Rücken ziegelförmig gestellte eckige Schuppen, und einen braunen Boden.

List. Hist. Conch. I. 4. f. I. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. F.

Argenv. Conch. Pl. 2. f. G.

Hill. Hist. of. Anim. Pl. 7.

Regenf. Samml. I. 9. t. 31. f.

Knor. Delic. nat. I. t. B. V. f. 8.

— Vergn. I. 30. t. 2. f.

Mart. Conch. Kab. I. 9. t. 71.

Q. II. 4. *Patella Oculus*.

Q. II. 4. Das Bocksaug.

Angl. Goat's Eye Limpet. Da Cost. Gall. L'oeil de bouc. Argenv.

Testa





Testa angulata, costis ca- Die eckige Schale hat viel-  
rinatis, vertice fundoque förmige Ribben, den Wirbel  
albo. und Grund von weißer Farbe.

Gualt. Test. t. 9. f. H. 1

Argenv. Conch. Pl. 2. f. B.

Mart. Konch. Kab. I. 10. t. 86. f.

Da Cost. Elem. Pl. 2. f. I.

Testa similis priori, a qua differt: Eine Art die der vorhergehenden  
colore fundi verticisque albo, squa- ähnlich ist, von der sie sich durch die  
marumque defectu. weiße Farbe des Wirbels und Grund-  
des, und durch den Mangel der  
Schuppen unterscheidet.

Q. II. 5. Patella grana-  
tina.

Q. II. 5. Das Körner-  
schild.

Linn. S. N. Sp. 757.

Belg. Gedoornd Kapje. Gall. Lepas granuleux.

Testa multifulcata, punctis  
elevatis muricata, margine  
dentato.

Die Schale ist mit vielen  
Furchen und erhabenen Punk-  
ten besetzt, und mit einem er-  
habenen Rande versehen.



*List. Hist. Conch.* t. 4. f. 1. f. 15.

*Bonan. Mus. Kirch. cl.* 2. f. 22.

*Argenv. Conch. Pl.* 2. f. H.

*Regenf. Samml.* I. 2. t. 14. f.

*Mart, Konch. Kab. I.* 8. t. 61.

Q. II. 6. *Patella coerulea*.

Q. II. 6. Die blaue Napfschnecke.

*Linn. S. N. Sp.* 759.

Testa inaequaliter sulcata, cavitate coerulescente, margine subangulato.

Die Schale ist mit ungleichen Furchen besetzt, in der Höhlung blaulicht, und am Rande einigermassen eckig.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. II. 7. *Patella miniata*.

Q. II. 7. Der Sonnenschirm.

*Belg. Gestraalte Kapje. Gall. Le Parasol. Dav.*

Testa ovata, striis inaequalibus decussatis, margine subangulato.

Die eiförmige Schale ist mit ungleichen Strichen durchkreuzet, und am Rande einigermassen eckig.

*List.*



*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 21.*

*Knor. Vergn. V. 8. t. 4 — 6. f. ; 19. t. 2. 3. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 7. t. 52. f. ; 8. t. 63. f.*

Testa ovata. Margo obsolete angulatus. Dorsum striis longitudinalibus transuersisque decussatim striatum. Vertex obtusus. Color albus, punctis minutis, radiisque roseis.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand hat vollkommene Ecken. Der Rücken ist der Länge und Quere nach mit feinen Streifen durchkreuzet. Der Wirbel stumpf. Weiß mit kleinen Punkten und Strahlen von rosenrother Farbe.

Q. II. 8. Patella Cochlear,

Q. II. 8. Der Löffel.

*Gall. La Cuilliere.*

Testa ovata, complanata, postice attenuata, margine subangulato.

Die Schale ist eiförmig und plattgedrückt, hinten verschmälert, und am Rande einigermaßen eckig.

*Knor. Vergn. II. 26. t. 3. f.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ovalis. Margo crenatus. Dorsum antice planiusculum, postice attenuatum, utrinque compressum.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand gekerbt. Der Rücken vorne etwas flach, hinten verlängert, an beiden Seiten.



fum. Striatum, striis longitudina-  
libus inaequalibus. Cavitas post-  
riorum canali ulata. Color albus,  
cavitas macula lata purpureo coe-  
rulea.

den Seiten zusammengebrücket, mit  
ungleichen Streifen der Länge nach  
besetzt. Die Höhlung ist rückwärts  
rinnenartig ausgehöhlet. Weiß,  
mit einem breiten purpurblauen  
Flecke in der Höhlung.

Q. II. 9. Patella pen-  
tagona.

Q. II. 9. Der spani-  
sche Huth.

Testa pyramidata subquin-  
quangula, margine explanato  
inaequali.

Die pyramidenförmige eini-  
germaßen fünfeckige Schale  
hat einen ausgebreiteten runden  
Rand.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa pyramidata, angulis quin-  
que obtusis, latere uno ampliore  
Basis explanata quinquangula, cre-  
nata. Vertex centralis obtusus.  
Color albidus, Fundi rubellus.

Die Schale ist pyramidenförmig  
mit fünf stumpfen Ecken, und ei-  
ner breiteren Seite. Der Rand  
ist ausgebreitet, und gekerbet. Der  
stumpfe Wirbel steht in der Mitte.  
Die Farbe ist weißlich, der Boden  
röthlich.

Q. III. Vertice acuminato cur-  
vato.

Q. III. Mit einem gespitzten krüm-  
men Wirbel.

Q. III. 1. Patella unga-  
rica.

Q. III. 1. Die Matros-  
senfärpe.

*Linn. S. N. Sp. 761.*

*Belg.*



Belg. Lots - Kap, Rumph, Gall. Bonnet de Dragon. Dav.

Testa conica, vertice acuminato spiraliter curvato.

Die kegelförmige Schale hat einen zugespitzten schnirkelförmig gekrümmten Wirbel.

Bonan. Mus. Kirch. cl. 2. f. 13.

Gualt. Test. t. 9. f. IV.

Klein. Meth. Ostr. t. 8. f. 10.

Knor. Vergn. VI. 16. t. 3. f.

Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 107. 108. f.

Q. III. 2. Patella deflexa.

Q. III. 2. Die einseitige Napfschnecke.

Testa ovata, longitudinaliter sulcata, vertice dextrorsum curvato.

Die Schale ist eysförmig, der Länge nach gestreift, mit einem nach der linken Seite gekrümmten Schnirkel.

Helbl. Abb. e. Priv. Ges. in Boehm, IV. I. t. 2. 10. f.

Testae ambitus ovatus. Dorsum fornicatum, utrinque compressum, longitudinaliter sulcatum. Vertex obtusus, compressus, in latus dextrum decurvatus. Color fuscus, striae radiantes & fundus albus.

Der Umfang ist eysförmig. Der Rücken gewölbet, beiderseits zusammengedrückt, und der Länge nach gefurchet. Der Wirbel ist stumpf, zusammengedrückt, und nach der rechten Seite gekrümmt. Von schwarzer Farbe mit weißen Strahlen und Wirbelboden.



Q. III. 3. Patella mamillaris.

Q. III. 3. Die Kopfschnecke.

Linn. S. N. Sp. 764.

Belg. Getepelte Patelle.

Testa integra, conica, striata, vertice reflexo laevi.

Die ganzrandige, kugelförmige, gestreifte Schale hat einen zurückgebogenen glatten Wirbel.

List. Hist. Conch. l. 4. f. I. f. 17.

Klein. Meth. Ostrac. t. 8. f. I.

Adans. Seneg. Pl. 2. f. 5.

Mart. Konch. Kab. I. 7. t. 58. 59. f.

Q. III. 4. Patella tricarinata.

Q. III. 4. Die dreynkieselige Napfschnecke.

Linn. S. N. Sp. 764.

Testa reticulato striata, antice tricarinata, vertice recurvo.

Die netzförmig gestreifte Schale hat vorne dreyn Kiele, mit einem zurückgebogenen glatten Wirbel.

Mus. Caes. Vindobon.

Q. III. 5.



Q. III. 5. *Patella pectinata*.

Q. III. 5. Die Kamm-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 765.*

Testa integra, ovata, membranacea, squamis imbricatis, vertice reflexo submarginali.

Die ganzrandige, eysförmige, dünnhäutige Schale ist mit hohlen Schuppen ziegelförmig bedeckt, und nahe am Rande mit einem zurückgebo-  
genen Wirbel versehen.

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. III. 6. *Patella lutea*.

Q. III. 6. Der gelbe  
Huth.

*Linn. S. N. Sp. 766.*

Testa integra, ovali, striata, vertice submarginali reflexo mucronato.

Die ganzrandige eysförmige gestreifte Schale, hat nahe am Rande einen zurückgebogenen gespitzten Wirbel.

*Mus. Caes. Vindobon.*



Q. IV. Integerrimae , vertice  
obtus.

Q. IV. Mit ganz glatten Rand,  
und stumpfen Wirbel.

Q. IV. 1. Patella pellu-  
cida.

Q. IV. 1. Die Glas-  
patelle.

*Linn. S. N. Sp. 770.*

Testa ouata , ventricosa,  
membranacea pellucida , ra-  
diis coeruleis.

Die eysförmige , bäuchige ,  
dünnhäutige , und durchsichtige  
Schale , hat blaue Strahlen.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 27.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. IV. 2. Patella testu-  
dinaria.

Q. IV. 2. Der Schild-  
krötennapf.

*Linn. S. N. Sp. 771.*

*Belg. Getygerd Schild, Gall. Bouclier de Tortue. Dav.*

Testa integerrima ouata ,  
glabra, fusco maculata.

Die ganzrandige , eysförmige ,  
glatte Schale ist braun  
gefleckt.

*List.*





*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 9.*

*Gualt. Test. t. 8. f. B.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. P.*

*Knor. Vergn. I. 21. t. 1. f.*

*Mart. Conch. Kab. I. 6. t. 45 — 48. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 2. 3. f.*

Q. IV. 3. *Patella radiata,*

Q. IV. 3. Die Strahlpatelle.

Testa integerrima, ouata, striata, vertice radiisque fuscis.

Die ganzrandige, eiförmige, gestreifte Schale hat einen braunen Wirbel, mit gleichfarbigen Strahlen,

*Mus. Caes. Vindobon.*

Testa ouata. Margo integerrimus. Dorsum longitudinaliter striatum. Vertex subcentralis. Color albidus. Cavitae margaritacea. Fundus & fasciae radiantes fuscae.

Die Schale ist eiförmig. Der Rand ganz glatt. Der Rücken der Länge nach gestreift. Der Wirbel steht beinahe in der Mitte. Von weißlicher Farbe. Die Höhlung hat einen Perlglanz. Der Boden und die strahligen Bänder sind braun.

Q. IV. 4.



Q. IV. 4. *Patella compressa*.

Q. IV. 4. Der Stroh  
huth.

*Linn. S. N. Sp. 772.*

*Belg. Geele Kapje.*

Testa integerrima, oblonga  
striata, dorso utrinque com-  
presso.

Die ganzrandige länglicht  
gestreifte Schale hat einen bei-  
derseits zusammengeprägten  
Rücken.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 25.*

*Knor. Vergn. VI. 28. t. 1. f.*

*Walch Naturf. VIII. 4. t. 1. f.*

Q. IV. 5. *Patella rustica*.

Q. IV. 5. Die Bauern-  
kappe.

*Linn. S. N. Sp. 773.*

Testa integerrima, conica  
sulcato striata, obtusa.

Die Schale ist ganzrandig  
kegelförmig, stumpfwirblig, mit  
Furchen und Streifen besetzt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 8. f. P.; t. 9. f. C.*

*Mart.*





Testa ouata reticulato stria-  
ta, antice fissa, vertice re-  
curuo.

Die eysförmige nezartig ge-  
streifte Schale, ist vorne ge-  
spalten, mit einem zurückgebo-  
genen Schnitzel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 28.*

*Petiv. Gaz. t. 75. f. 2.*

*Mart. Konch. Kab. I. 12. t. 109. 110. f.*

*Müll. Zool. Dan. t. 24. f. 7.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

Q. V. 2. *Patella graeca.*

Q. V. 2. Das Kumpel-  
gitter.

*Linn. S. N. Sp. 780.*

*Belg. Griechsche Patelle. Angl. Thimble Limpes. Pet. Gall. Le  
Treillis. Dav.*

Testa ouata, costata, de-  
cussatim striata, vertice per-  
forato.

Die eysförmige geribbte, in  
die Quere gestreifte Schale  
hat einen durchbohrten Wir-  
bel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 6.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 1.*

*Petiv. Gaz. t. 80. f. 11.*

Klein.



*Klein. Melb. Ostr. t. 8. f. 3.*

*Gualt. Test. t. 9. f. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 2. f. J.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 7.*

*Regenf. Samml. I. 2. t. 23. f.*

*Knor. Vergn. I. 30. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 98. 99. f.*

Q. V. 3. *Patella nim-*  
*bosa.*

Q. V. 3. Das Strahl-  
gitter.

*Linn. S. N. Sp. 781.*

Testa ouata longitudinali-  
ter sulcata, transuersim stria-  
ta, vertice perforato.

Die eysförmige Schale ist  
nach der Länge gefurchet, und  
in die Quere gestreift, mit  
einem durchbohrten Wirbel.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 3.*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 1. f. 4.*

*Gualt. Test. t. 9. f. Q. R. S. T.*

*Argenv. Conch. Pl. 6. f. C.*

*Adans. Seneg. Pl. 2. f. 6.*

*Mart. Konch. Kab. I. II. t. 91. 92. f; 12. t. 105. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 1. f. 3.*

Q. V. 4.

Q. V. 4. *Patella nodosa*.

Q. V. 4. Das Knottengitter.

*Angl.* Wart-rib'd Limpet.*Testa onata sulcata, costis nodosis, vertice perforato.*

Die eysförmige gefurchte Schale hat knottige Ribben, und einen durchbohrten Wirbel.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 1. f. 6.**Petiv. Gaz. t. 153. f. 5.**Mart. Conch. Kab. L. II. t. 94. f.**Testa ovata. Dorsum longitudinaliter sulcatum, costis intermediiis nodosis. Vertex subcentralis, pertusus; foramine oblongo. Color rubellus.*

Die Schale ist eysförmig. Der Rücken der Länge nach gefurcht, mit knottigen Zwischenribben. Der durchbohrte Wirbel steht an der Mitte. Die Oefnung ist länglicht. Von röthlicher Farbe.

R. *Dentalium*.

R. Die Zahnschnecke.

*Linn. Syst. Nat. Gen. 332.**Testa conico tubulosa, libera, utrinque pervia.*

Die freye Schale ist kegelförmig, hohl, und an beiden Enden offen.

R. I.



R. 1. Dentalium ele-  
phantinum.

R. 1. Der Elephantenzahn.

*Linn. S. N. Sp. 783.*

*Belg. Oliphants - tand. Rumph. Angl. Elephant's - Ttooth. Pet. Gall. Dentale. Dav.*

Testa decemangula, subar-  
cuata, striata.

Die Schale ist zehneckig,  
etwas gekrümmt, und gestrei-  
fet.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 8.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Petiv. amb. t. 16. f. 33.*

*Gualt. Test. t. 10. f. 7.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. H.*

*Ginan. adr. II. p. 2. t. 1. f. 1.*

*Knor. Vergn. I. 19. t. 3. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 5. f. A.*

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 19. t. 1. f.*

R. 2. Dentalium stria-  
tum.

R. 2. Das gestreifte  
Zähnen.



*Angl.* The striated Tooth - Shell. *Hill.*

Testa octangula, subarcuata, dense striata.

Die Schale ist achteckig, etwas gekrümmt, und mit Streifen dicht besetzt.

*Gualt.* Test. t. 10. f. G.

*Hill. Hist. of. Anim. Pl.* 7.

*Mart. Konch. Kab. I.* 1. t. 5. f. B.

Differt a praecedente crassitie minore, & striis densis numerosis.

Diese Art unterscheidet sich von der vorigen durch ihre Dünne, und die vielen gedrängt an einander stehenden Streifen.

R. 3. Dentalium Dentalis.

R. 3. Der Wolfszahn.

*Linn. S. N. Sp.* 785.

*Gall.* La dent de loup. *Dav.*

Testa subarcuata, longitudinaliter sulcata, tenui, rubella.

Die röthliche dünne Schale ist etwas gekrümmt, und nach der Länge gefurchet.

*Rumph.*





*Rumph. amb. t. 41. f. 6.*

*Mus, Caes. Vindobon.*

R. 4. Dentalium Enta-

R. 4. Der Hundszahn.

S.  
*Linn. S. N. Sp. 786.*

*Belg. Witte Wolfstand. Augl. The Dog - tooth Shell. Pet. Gall.*  
*Entale. Dav.*

Testa subarcuata, laevissi- Die Schale ist etwas ge-  
aa. frümmet, und ganz glatt.

*Bonn. Recr. cl. 1. f. 9.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 2. f. 2.*

*Petiv. Gaz. t. 65. f. 9.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 5.*

*Gualt. Test. t. 10. f. E.*

*Argenv. Conch. Pl. 3. f. K, K.*

*Ginan. adr. II. t. 1. f. 2.*

*Knor. Vergn. I. 29. t. 4. f.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 1. 2. f.*

R. 5. Dentalium poli-  
tum.

R. 5. Der Polirzahn.



*Linn. S. N. Sp. 788.*

Testa subarcuata , striis Die etwas gekrümmte Schale ist in die Quere mit gedräng-  
annularibus confertissimis. stehenden Streifen umgürtet.

*Gualt. Test. t. 10. f. F.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 3. f. A.*

*S. Serpula.*

*S. Die Röhrenschnecke*

*Linn. S. N. Gen. 333.*

Testa tubulosa , adna- Die Schale ist röhrig  
ta , saepius isthmis inter- und angewachsen, auch öf-  
cepta. ters durch Scheidewand  
abgetheilet.

*S. 1. Serpula triquetra. S. 1. Die dreieckig  
Röhre.*

*Linn.*



*Linn. S. N. Sp. 795.*

*Gall. Vermiculaire blanc & triangulaire.*

Testa repente, flexuosa,  
triquetra.

Die dreneckige Schale ist in  
einander geschlungen, und fle-  
bet auf andern Körpern fest.

*Gualt. Test. t. 10. f. P.*

*Bast. subs. I. t. 9. f. 2.*

*Mus. Caes. Vindobon.*

S. 2. *Serpula filograna.*

S. 2. Die Flechtenröh-  
re.

*Linn. S. N. Sp. 797.*

Testis capillaribus, fascicu-  
latis, ramosis, confluentibus.

Mehrere haarförmige, bü-  
schelweise und ästig an einan-  
der verwachsene Schalen.

*Seb. Tbes. III. t. 100. f. 8.*

*Koelr. Nov. Comm. Petr. VII, t. 16. f. 3.*



S. 3. *Serpula contor-*  
*tuplicata.*

S. 3. Der Fischdarm.

*Linn. S. N. Sp. 799.*

*Gall. L'assemblage des bojaux.*

Testa rugosa, flexuosa, ca-  
rinata.

Die Schale ist runzelicht,  
geschlungen und gefeibet.

*Bonan. Recr. cl. 1. t. 20. f. G.*

*Argenz. Conch. Pl. 4. f. D.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 24. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 6.*

S. 4. *Serpula glome-*  
*rata.*

S. 4. Der Vogelbarm.

*Linn. S. N. Sp. 800.*

*Gall. Bojaux des oiseaux. Dav.*

Testa decussatim striata, con-  
torta, glomerata.

Die Schale ist kreuzweise  
gestreift, und klumpenweise  
in einander geschlungen.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. E.*

*Gualt. Test. t. 10. f. T.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. 23. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 7.*



S. 5. *Serpula lumbricalis*.

S. 5. Die Hornschlange.

*Linn. S. N. Sp. 801.*

*Belg. Zeeslangetje. Gall. Vilebrequin. Dav.*

*Testa flexuosa, apice spirali.*

Die geschlungene Schale hat eine schnirkelförmig gewundene Endspitze.

$\alpha$  solitaria.

$\alpha$  einzeln.

*Bonán. Recr. cl. 1. f. 20. A.*

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 1.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 1.*

*Petiv. amb. t. 22. f. 1.*

*Gualt. Test. t. 10. f. Q. V.*

*Argenv. Conch. Pl. t. 4. f. 7.*

*Ginan. adr. II. t. 2. f. 14.*

*Knor. Vergn. II. 13. t. 1. f.*

—— ——— IV. 17 t. 2. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 2. t. 12. f. B.*

$\beta$  testis aggregatis.

$\beta$  mit angehäuften Schalen.

*Adans. Seneg. Pl. II. f. 1.*

S. 6. *Serpula polythalamia*.

S. 6. Die Sandpf.



*Linn. S. N. Sp. 802.*

*Angl. The chambered Vermiculus. Da Cost.*

Testa ponderosa, tereti, con-  
camerata, bifurcata.

Die schwere, runde Schale  
ist in Kammern abgetheilet,  
und zweytheilig.

*Seb. Thes. III. t. 49. f. V.*

*Mart. Konch. Kab. I. 1. t. 6. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 5.*

**S. 7. Serpula arenaria. S. 7. Der Ochsendarm.**

*Linn. S. N. Sp. 803.*

*Belg. Hondsdarm. Rumph. Angl. Ovenshell. Pet.*

Testa supra angulata, subtus  
planiuscula.

Die Schale ist oben eckig,  
und unten flach.

*Bonan. Recr. cl. 1. f. 20. B.*

*Rumph. amb. t. 41. f. L.*

*Gualt. Test. t. 10. f. L. N.*

*Argenv. Conch. Pl. 4. f. H.*

*Adans. Seneg. Pl. 11. f. 5.*

*Mart. Konch. Kab. I. 3. t. f. 19.*

S. 8. *Serpula anguina*.

S. 8. Der Hühnerdarm.

*Linn. S. N. Sp. 804.**Belg. Hornslangetje. Rumph.*

Testa tereti, rima longitu-  
dinali, apice cylindrico spi-  
rali.

Die runde Schale hat nach ih-  
rer Länge eine Spalte, und eine  
walzenartige schneckenförmig  
gedrehte Endspitze

α - laevis.

α glatt.

*List. Hist. Conch. l. 4. f. 3. f. 2.**Rumph. amb. t. 41. f. 2.**Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f.**Mus. Caes. Vindobon.*

β angulata, &amp; muricata.

β mit einer eckigen, und stach-  
lichten Schale.*Rumph. amb. t. 41. f. H.**Mart. Konch. Kab. I. 2. t. 13. f. B.**Mus. Caes. Vindobon.*S. 9. *Serpula Penis*.

S. 9. Die Gießkanne.

*Linn. S. N. Sp. 806.*

*Belg. Venus - Schagt. Rumph. Angl. The wattering Pot. Gall. L'arro-  
soir. Dav.*



Testa tereti, extremitate Die runde Schale ist an  
lata, tubulis cylindricis per- dem breiten Ende mit walzen-  
tula. förmigen Röhrchen durchsto-  
chen.

*Bonan. Mus. Kircb. cl. I. f. 38.*

*List. Hist. Conch. I. 4. f. 3. f. 3.*

*Rumph. amb. t. 41. f. 7.*

*Valent. Abb. t. 10. f. 87.*

*Petiv. amb. t. 12. f. 17.*

*Gualt. Test. t. 10. f. M.*

*Argenw. Conch. Pl. 3. f. 9.*

*Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.*


— — VI. 40. t. 1. f.

*Mart. Conch. Kab. I. 1. t. 7. f.*

— berl. Beschaeft. II. 11. t. 1 — 5. f.

*Müll. linn. Naturf. VI. 1. B. 3. f.*

*Da Cost. Elem. Pl. 2. f. 8.*





N O M I N A  
T R I V I A L I A  
O R D I N E A L P H A B E T I C O.

---

Benennungen  
d e r  
K o n c h y l i e n  
in alphabetischer Ordnung.

---

NOMENCLATOR GERMANICVS.  
Deutsche Benennungen.

	Seite.
Mbrikosenstein	60. K. III. 5.
Achatbirne	319. I. V. 16.
Admiralstute	134. C. II. 2.
Aentenbrut	6. B. 6.
Astersturmhaube	245. G. IV. 2.

Aster,

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Astervenus blaustreifige	53. K. II. 11.
Agatmuschel	50. K. II. 8.
Arche Noah	73. N. II. 1.
Argus doppelter	158. D. I. 4.
Argus Weibchen	172. D. IV. 1.
Affel	181. D. IV. 15.
Affelschnecke	276. H. II. 8.
Auster gemeine	99. O. VI. 4.
—— gezähnelte	99. O. IV. 5.

<b>B</b> abelsturm	308. I. V. 1.
Bakassanmuschel	20. F. I. 5.
Bandnadel braune	216. F. IV. 6.
Band rothes	189. E. 11.
Bandspindel	321. I. V. 19.
Bartarche	74. N. II. 2.
Bartkneifer	12. D. 4.
Bastardarche	75. N. III. 1.
Bastardargus	156. D. I. 1.
Bastardbauernmusik	134. C. II. 1.
Bastarddrachenköpfchen	171. D. III. 3.

Bastard.

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Bastardlampe	379. N. II. 10.
Bastardmuschel gestumpfte	103. P. 4.
Bastardvioline	24. F. II. 6.
Bastardvenus	45. K. I. 3.
Bauernkappe	444. Q. IV. 5.
Bauernmusik	142. C. II. 12.
Beetchen gekröntes	239. G. II. 10.
Bernstein Muster	103. P. 3.
Besansfegel	278. H. III. 3.
— — aufgewickelte	279. H. III. 4.
Besansspindel gezackte	328. I. VI. 7.
Beizeng	305. I. IV. 8.
Bezoer grauer	241. G. III. 2.
— — glatter	242. G. III. 3.
Bienenförbchen	364. L. III. 3.
Birne getrocknete	297. I. III. 8.
Birnwalze	224. F. IV. 16.
Bischofsmütze	217. F. IV. 8.
Blase offene	187. E. 7.
Blasentasche	95. O. III. 3.
Blasenwalze	205. F. III. 1.
Blätterkamm	107. Q. I. 2.
Blaulippe	56. K. II. 17.

Blute

# MONENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Blutohr	400. N. IV. 6.
Blutzahn	420. O. III. 4.
Bocksaug	434. Q. II. 5.
Bockschnecke	347. L. II. 1.
Bohne	208. F. III. 4.
Bohrer gefurchter	146. C. III. 3.
— — punktirter	145. C. III. 1.
Bootsacke	267. H. I. 3.
Böttcherbohrer	192. E. 14.
Brandfleck	176. D. IV. 7.
Brandhorn	291. I. II. 5.
Brandnadel braune	214. F. IV. 2.
Braunlippe	51. K. II. 9.
Breitrand	365. L. IV. 4.
Brunette	151. C. III. 9.
Buchstabennadel	327. I. VI. 6.
Buchstabenporzellane arabische	157. D. I. 3.
Bund türkischer	340. XII. 4.
Butterwecke gelbe	139. C. II. 9.

**C**auris gefleckte

174. D. IV. 4.

Dach

# Deutsche Benennungen.

<b>D</b> ach chinesisches	350. L. II. 5.
Delphin geribbter	361. L. III. 7.
— gezackter	360. L. III. 6.
Dienestflügel	272. H. II. 3.
Dicklippe	339. K. II. 3.
Distelschnecke	304. I. IV. 7.
Doppelribbe	366. L. V. 3.
Dornspindel gefurchte	325. I. VI. 4.
Dose gefurchte	39. O. II. 15.
— gewölbte	93. O. II. 14.
Dosenschnecke	245. G. IV. 3.
Drachenhaupt	174. C. IV. 5.
Dreneck	41. I. I.
Dünnribbe	46. K. I. 4.
Dünnschale	164. D. I. 12.

<b>E</b> ckhorn	252. G. VII. 1.
Eichelmuschel	69. M. 5.
Eichenholzutte	140. C. II. 10.
Eismuschel	94. O. III. 1.
Elephantenzahn	449. R. 1.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Elster	357. L. III. 3.
Erbsenschotte	15. E. 3.
Erdbeere rothe	33. G. 10.
Eselchen	170. D. III. 2.
Eselohr	429. P. 4.
Estrich	131. C. I. 8.
En	183. E. 1.
Eyerdotter	414. O. I. 4.
— geschobener	415. O. I. 5.

Fahne	118. R. 5.
Fahnenmadel	214. E. IV. 3.
Faltenklappe	65. L. 2.
Faltenmund	376. N. II. 5.
Faltenmadel	264. G. VIII. 13.
Faltennerite	424. O. III. 9.
Faltenpatelle	433. Q. II. 5.
Faltenschnecke nezförmige	212. F. III. 10.
Faß	231. G. I. 5.
Feige	190. E. 1.
—— linksgewundene	313. I. V. 8.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Feile	95. O. III. 2.
Felsengienmuschel	71. M. 8.
Fenster Scheibe	105. P. 7.
Festung	434. Q. II. 4.
Fischdarm	454. S. 3.
Fischernez	139. C. II. 8.
Fischweiberhaube	430. Q. I. 1.
Flachwirbel	376. N. II. 6.
Flechtenröhre	453. S. 2.
Fledermaus	219. F. IV. II.
Fleischhorn	273. H. II. 1.
— — — unmähtes	314. I. V. 9.
Fleischlinse	26. F. III. 3.
Flügelschnecke gebänderte	274. H. II. 6.
Flußpabstkrone	405. N. VI. 1.
Flußperlmuschel	11. D. 3.
Frieselporzellane	179. D. IV. 12.
Froschschnecke	294. I. III. 2.
Fuchs	160. D. I. 7.
Fuchsturm	215. F. IV. 5.
Füllhorn	371. M. 1.
Fußhorn	296. I. III. 6.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

<b>G</b> artenbeetchen	238. G. II. 9.
Gartenschnecke.	397. N. IV. 2.
Gelbschmuz	177. D. IV. 8.
Gespinst	152. C. IV. 1.
Giennuschel nierenförmige	69. M. 6.
Gieskanne	457. S. 9.
Gitterhorn	254. G. VII. 4.
Gittervenus	57. K. II. 18.
Glassohrmuschel	104. P. 6.
Glasschnirkel	394. N. III. 18.
Glaspatelle	442. Q. IV. 1.
Goldmund	349. L. III. 4.
Gondel	226. F. V. 2.
Gurke glatte	208. F. III. 5.
Gürtelschnecke	388. N. III. 10.
Gürtelspindel	317. I. V. 14.
Gürtelvenus	58. K. III. 2.

<b>H</b> ahnenherz	38. G. 18.
Hahnenkamm	106. Q. I. 1.
Halbmond	409. N. VI. 6.

Hans



# Deutsche Benennungen

Seite.

Hammer polnischer	97. O. IV. 1.
Harfe	246. G. V. 1.
Hautschnecke	297. I. III. 7.
Hermelinschwanz	141. C. II. 11.
Herz dreysseitiges	30. G. 5.
— gelbes	35. G. 13.
— gelbmündiges	34. G. 12.
— glattes	35. G. 14.
— knottiges	32. G. 8.
— schuppiges	29. G. 4.
Herzmuschel breite	37. G. 16.
— geribbte	28. G. 1.
— große	34. G. 11.
— kammähnliche	37. G. 17.
Herztute	123. C. I. 1.
Hexenmeister	334. K. I. 5.
Hochrücken	185. E. 4.
Hohlohr	427. P. 1.
Holzspindel	320. I. V. 18.
Hornmerite	419. O. III. 2.
Hornschlange	455. S. 5.
Hühnerdarm	457. S. 8.
Hundszahn	451. R. 4.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

Nuth spanischer	438. Q. II. 10.
— gelber	441. Q. III. 6.
Nuthschnirkel	190. N. III. 13.

<b>N</b> ägertasche	83. O. I. 5.
Jakobsmuschel	61. O. I. 2.
Nock	184. E. 3.
Nfabelle	169. D. II. 7.
Nujubenkräusel	342. K. II. 7.

<b>N</b> äfermuschel kleine	1. A. 2.
— — schuppige	1. A. 1.
Näferschnecke	341. N. I. 1.
Nammquaster	98. O. IV. 3.
Nammblat	18. Q. I. 3.
Namelschnecke	276. H. III. 1.
Namelotchen	425. O. III. 11.
Nammuschel scharfribbig	91. O. II. 12.
Nammipatelle	441. Q. III. 5.
Nampfhahn	271. H. II. 2.

Namm,

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Rammvenus	61. K. III. 8.
Kanarienschnecke breite	280. H. III. 6.
— — — höckerige	275. H. II. 7.
— — — knottige	281. H. III. 7.
Kanarienvogel	251. G. VI. 2.
Karkasschnecke	380. N. II. 11.
Käsetutte	131. C. I. 8.
Kastanie große	301. I. IV. 2.
Kätzchen geflecktes	148. C. III. 6.
Käsenzunge	17. F. I. 1.
Ke gel gedrehter	377. N. II. 7.
Ke gelschnirkel eingesäumter	375. N. II. 4.
Keil	43. I. 1.
Kie bizen	187. E. 8.
Kinkhorn gefurchtes	251. G. VI. 3.
— — — förniges	243. G. III. 4.
Klasmuschel bäuchige	10. D. 1.
Klappmuschel gezackte	63. L. 1.
Klauenmuschel	112. Q. III. 5.
Klebbaufter	102. P. 1.
Kleid attalisches	235. G. II. 5.
Klöppelküssen	129. C. I. 5.
Knöpfchen glattes	182. D. IV. 17.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite
Knottenbund	341. K. II. 5.
Knottengitter	448. Q. V. 4.
Knottennabel	410. O. I. 1.
Knottenschelle	2 32. G. II. 1.
Knottenschnecke runzelichte	303. I. IV. 6.
Knottensturmhaube	235. G. II. 4.
Kofferhörnchen weißes	244. G. IV. 1.
Kompasmuschel	82. O. I. 4.
Königsmantel	84. O. II. 1.
Kopspatelle	440. Q. III. 3.
Korallenmuschel	85. O. II. 2.
Korbmuschel fahle	40. H. 2.
— — sprenglerische	39. H. 1.
Korbvenus	52. K. II. 10.
Kornelkirsche	206. F. III. 2.
— — eingefäumte	207. F. III. 3.
Körnerschild	435. Q. II. 6.
Kornknöpfchen	182. D. IV. 16.
Krabbenschnecke	269. H. I. 5.
Krauschnecke	289. I. II. 3.
Kräusel geförntes	343. K. II. 8.
Kräuselschnecke gebänderte	396. K. I. 8.
Kreidenschnecke	386. N. III. 7.

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Kronenbäcke	154. C. IV. 4.
Krontute	125. C. I. 2.
— — schwarzbraune	126. C. I. 3.
— — weiße	130. C. I. 6.
Kröte	166. D. II. 4.
Krötenschnecke	292. I. III. 1.
Kuhaug	386. N. III. 8.

Lagermuschel	53. K. II. 12.
Lagervenus punktirte	60. K. III. 6.
Lagerwalze	197. F. II. 2.
Landcharte	156. D. I. 2.
Langohr	197. F. I. 2.
Lanzennadel	261. G. VIII. 9.
Laus	179. D. IV. 13.
Livreeschnecke	298. I. III. 9.
Löffel	437. Q. II. 9.
Lorbeerblatt	97. O. IV. 2.
Löventute	144. C. II. 14.
Luchoneserschnecke	274. H. II. 5.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

Seite.

<b>M</b> ahlermuschel	11. D. 2.
Mangosnadel	324. I. VI. 2.
Mantel bandirter	87. O. II. 5.
—— bunter	88. O. II. 7.
—— gefleckter	90. O. VI. 9.
—— gefurchter	86. O. II. 4.
—— gewölbter	84. O. I. 6.
—— glatter	89. O. II. 8.
—— goldgelber	91. O. II. 11.
—— langer	86. O. VI. 3.
—— menningrothe	88. O. II. 6.
Marmornadel	402. N. V. 2.
Marmorohr	428. P. 3.
Masernporzellane	168. D. I. 11.
Matrosenkappe	438. Q. III. 1.
Maul krummes	299. I. III. 11.
Maulbeere gezackte	300. IV. 1.
—— lange	302. I. IV. 4.
Maulwurf	162. D. I. 9.
—— — graue	161. D. I. 8.
Maus	163. D. I. 10.
Mennonitentate	130. C. I. 7.

Men

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Menschenherz	28. G. 2.
Meereiche grosse	2. B. 1.
Meertulpe	4. B. 2.
Messerheft	14. E. 2.
Midasohr	196. F. I. 1.
Miesmuschel gefärbte	111. Q. III. 4.
—— geferbte	110. Q. III. 2.
—— geribbte	113. Q. III. 6.
—— gemeine	110. Q. III. 3.
Milchporzellane	163. D. I. 11.
Milchschale	408. N. VI. 5.
Mittelherz	31. G. 6.
Mohr bandirter	310. I. V. 4.
Mohrenbauch	164. D. II. 1.
Mohrenkrone	225. F. V. 1.
Mönch	137. C. II. 5.
—— grauer	138. C. II. 6.
Mondschncke aschengraue	356. L. III. 1.
— — — gefielte	361. L. III. 8.
— — — knottige	257. L. III. 3.
— — — kräuselartige	355. L. II. 12.
— — — sturmhaubenartige	354. L. II. 11.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Morgenstern ausgeschnittener	307. I. IV. 10.
Mundstück verkehrtes	378. N. II. 8.
Musik wilde	221. F. IV. 12.
Muskatenblüthe	70. M. 7.
Muskatennuß	253. G. VII. 2.
Münze guineische	172. D. IV. 2.
Münze	432. Q. II. 2.
Münze polnische	237. G. II. 7.

<b>N</b> abelberg	29. G. 3.
Nabels aneckte	387. N. III. 9.
Nadel aschengraue	262. N. VIII. 1.
—— durchgestochene	216. F. IV. 7.
—— durchstochene	263. G. VIII. 2.
—— gefärbte	259. G. VIII. 6.
—— gekrönte	258. G. VIII. 5.
—— gestriegelte	260. G. VIII. 7.
—— knottige	282. H. IV. 1.
—— rostfarbige	258. G. VIII. 4.
—— umwundene	261. G. VIII. 10.



# Deutsche Benennungen.

Seite.

Nadel weisse	257. G. VIII 3.
Nadelfeile	329. F. IV. 2.
Nadelwalze rauhe	213. F. VI. 8.
Nagelherz	31. G. 7.
Nähnadel	260. G. VIII. 8.
Napfsschnecke blaue	436. Q. II. 7.
— — — dreykielige	439. Q. III. 2.
— — — einseitige	440. Q. III. 4.
Narrenkappe	66. M. I.
Nassauer	347. L. II. 2.
Neptunsdose	82. Q. I. 3.
Nerite braune	413. O. I. 3.
— — — brunttragende	418. O. III. 1.
Nezhorn	255. G. VII. 5.
Nezschnecke	299. I. III. 10.
Neztute bandirte	138. C. II. 7.
Notenschnecke	218. F. IV. 10.

**N**chsendarm

456. S. 7.

Nchsenherz unächtes

49. K. II. 6.

Del.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Deſkuchen eckiger	295. I. III. 6.
— — — geribbter	295. I. III. 4.
— — — knottiger	194. I. III. 3.
Deſkrug	353. L. II. 50.
Ohr geſtreiftes	428. P. 2.
Ohrhorn	407. N. VI. 3.
Olivenkern	210. F. III. 7.
Olivenwalze	198. F. II. 2.
Orangenſegel	133. C. I. 11.
Oranienboprer	147. C. III. 4.
Oſt- und Weſtmuſchel	36 G. 15.

<b>P</b> abſtkrone	217. F. IV. 9.
Pagodenſchnecke	350. L. II. 6.
Pantoffel	431. Q. I. 2.
Papierhaube	236. G. II. 6.
Papierrolle	188. E. 9.
Pavusmuſchel	113. Q. III. 7.
Pellerontnerice	422. O. III. 7.
Perlmutter	108. Q. II. 1.
Perspektivſchnecke	333. K. I. 3.

Pfer-

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Pferdefuß	67. M. 3.
Pferdehuf dorniger	71. M. 9.
Pharaoschnecke	333. K. I. 4.
Pilgrimsmuschel	8. O. I. 1.
Pimpelchen	303. I. IV. 5.
Platwirbel	147. C. III. 5.
Podagraschnecke	268. H. I. 4.
Polierzahn	451. R. 5.
Porzellanblase	193. E. 15.
Posthorn	122. B. 2.
Prinzenfahne	193. E. 16.
Purpurhorn gehörntes	286. I. I. 5.
Purpurschnecke dreyflüglige	287. I. II. 1.
— — — dreyseitige	288. I. III. 2.
— — — vieleckige	292. I. II. 6.
Pyramide glatte	330. K. I. 1.
— — knottige	331. K. I. 2.

**S**autenkörbchen

76. N. III. 2.

Nebhun

229. G. I. 2.

Reisbrey Mondschnecke

346. L. I. 2.

Reis-

# NOMENCLATOR GERMANICVS,

	Seite.
Reiskorallenporzellane	180. D. IV. 14.
Ring	173. D. IV. 3.
Rinne	13. E. 1.
Röhre dreyeckige	452. S. 1.
Rostfleckchen	177. D. IV. 9.
Rothmund	148. G. V. 3.
Rübe	191. E. 13.
Rübe dicke	306. I. IV. 9.
—— langschnabelige	312. I. V. 6.
Rudolphsschnecke	247. G. V. 2.
Runzelbund	352. L. II. 8.
Runzelgitter	446. Q. V. 2.
Runzelklappe	100. O. IV. 6.

<b>S</b> afranträusel	343. K. II. 9.
Säge	42. I. 4.
Salzkornporzellane	166. D. II. 3.
Sammelmuschel	78. N. IV. 2.
Sandpfeife	455. S. 6.
Sandtelline	25. F. III. 1.
Sandrutte	143. C. II. 13.

# Deutsche Benennungen.

Sattel polnischer	101. O. IV. 7.
Säumchen gefaltenes	241. G. III. 1.
Scharfrinne	366. L. V. 2.
Scheibenschnecke	375. N. II. 3.
Schellenhorn	228. G. I. 1.
Schellenschnecke französische	195. E. 17.
Schiffsboot dicker	121. B. 1.
Schiffsfahne	345. K. III. 2.
Schildkrötennapf	442. Q. IV. 2.
Schildkrötenpocke	5. B. 5.
Schildkrötenporzellane	159. D. I. 5.
Schildkrötentute	137. C. II. 3.
Schildmuschel achte	62. K. IV. 1.
Schindchen	24. F. II. 5.
Schinke edle	116. R. 2.
— — geräucherte	116. R. 1.
— — lange	117. R. 4.
Schlammuschnecke	384. N. III. 4.
Schlanguhaut	353. L. II. 9.
Schlanguhorn	390. N. III. 12.
Schlangukopf	103. P. 5.
— — — der grosse	165. D. II. 2.
Schlauchdattel dicke	202. F. II. 3.
Schminkeplasterchen	302. I. IV. 3.

Schnauz

# NOMENCLATOR GERMANICVS

Schnauzennadel	323. I. VI. 1.
Schnepfentopf dorniger	286. I. I. 4.
— — — gezackter	285. I. I. 3.
Schnepfennadel gedörnte	326. I. VI. 5.
Schnepfenschnabel	282. I. I. 1.
Schnirkel gefleckter	380. N. II. 12.
— — — verkehrter	391. N. III. 15.
Schnirkelmondschnecke	355. L. II. 13.
Schnirkelnadel abgestuzte	401. N. V. 1.
— — — braune	404. N. V. 5.
— — — gefaltene	403. N. V. 3.
— — — gefleckte	404. N. V. 4.
Schnirkelscheibe	382. N. III. 2.
Schnirkelschnecke ausgeschnittene	378. N. II. 9.
— — blaue	392. N. III. 16.
— — bunte	398. N. IV. 4.
— — dickschalige	408. N. VI. 4.
— — gemalte	397. N. IV. 3.
— — lebendig gebährende	393. N. III. 17.
— — offene	399. N. IV. 5.
Schnurbund	342. K. II. 6.
Schnurwalze	212. F. IV. 1.
Schraube alte	567. L. V. 4.
— — bunte	365. L. V. 1.

Schup-

# Deutsche Benennungen.

	Seite.
Schuppenbezoar	238. G. II. 8.
Schüsselfchen	90. O. II. 10.
Schwalbe	170. D. III. 1.
Schwarzang	178. D. IV. 11.
Schwarzohr	400. D. IV. 7.
Schweizerhose gezackte	277. H. III. 2.
Schwimmuschnecke breitzurchige	426. O. III. 13.
— dicklippige	412. O. I. 2.
— gesiederte	420. O. III. 5.
— gefurchte	416. O. I. 7.
— geribbte	424. O. III. 10.
— glatte	421. O. III. 6.
— grüne	419. O. III. 3.
— stumpfe	423. O. III. 8.
Seenuß	68. M. 4.
Seepocke	3. B. 2.
Seetonne	344. K. III. 1.
Segler breitkieliger	120. A. I. β.
— papierner	119. A. I.
— schmalkieliger	119. A. I. α.
Silbermund bunter	359. L. III. 5.
— geribbter	358. L. III. 4.
— grüner	348. L. II. 3.

# MONENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Skorpionschnecke	290. I. II. 4.
Smaragdschnecke	249. G. V. 5.
Sommerprosse	271. H. II. 1.
Sonnenhorn	337. K. I. 10.
Sonnenschirm	436. Q. II. 8.
Sonnenstrahl gestreifter	18. F. I. 3.
— glatter	23. F. II. 4.
— kleiner	25. F. II. 7.
Spalte	445. Q. V. 1.
Spielmuschel	52. K. II. 7.
Spindel französische	309. I. V. 3.
— gefleckte	317. I. V. 13.
— gezackte	312. I. V. 7.
— javanische	309. I. V. 2.
— indische	311. I. V. 5.
— nordische	315. I. V. 11.
— rothbraune	318. I. V. 15.
— zweyfielige	314. I. V. 10.
Spinne	283. I. I. 2.
Spizdattel	203. F. II. 4.
Spizsäule	338. K. II. 1.
Spizenrolle	150. C. III. 8.
Sporn	351. L. II. 7.



# Deutsche Benennungen.

Seite.

Stachelnadel höckerige	325. I. VI. 3.
— schwarze	329. I. VI. 9.
Staatenfahne	189. E. 10.
Steinbohrer	7. C. 1.
— geribbter	8. C. 2.
Steinchen	248. G. V. 4.
Steinkern	92. O. II. 13.
Steinmuschel	109. Q. III. 1.
Steckmuschel gedornite	117. R. 3.
Sternnadel	265. H. I. 1.
Sternpatelle	432. Q. II. 1.
Sternporzellane	178. D. IV. 10.
Strahlgitter	447. Q. 5. 3.
Strahlpatelle	443. Q. IV. 3.
Strahlscheibe	61. K. III. 7.
Strahlscheide blaue	16. E. 4.
Strandmondschnecke	346. L. I. 1.
Strandnerite	417. O. II. 2.
Stricknadel	256. G. VIII. 1.
Strohhut	444. Q. IV. 4.
Stümpfchen	42. I. 3.
Stumpfmuschel flachlichte	41. I. 2.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Sturmhaube dicklippige	230. G. I. 3.
— gefurchte	230. G. I. 4.
— gestricke	233. G. II. 2.
— rothe	234. G. II. 3.
Äsche rauhe	96. O. III. 4.
— wellenförmige	94. O. II. 16.
Äubchen	279. H. III. 4.
— blühendes	209. F. III. 6.
— traurendes	211. F. III. 9.
Äubeney	186. E. 6.
Zeichhorn	406. N. IV. 2.
Zellmuschel blaßrothe	21. F. II. 1.
— dreyeckige	27. F. III. 4.
— dunkelrothe	22. F. II. 2.
— eckige	19. F. I. 4.
— runzelichte	18. F. I. 2.
— scharfrandige	22. F. II. 3.
— schuppige	26. F. III. 2.
— unächte	20. F. I. 6.
Ziegnadel	257. G. VIII. 2.

# Deutsche Benennungen.

Seite.

Tiegerporzellane	167. D. II. 5.
Tiegertüte	127. C. I. 4.
Tiegerzunge	158. K. III. 1.
Topf	227. F. V. 3.
Treppe	250. G. VI. 1.
Trinkschale	445. Q. IV. 6.
Tritonschnecke	316. I. V. 12.
Trommelschraube	368. L. V. 6.
— gestreifte	368. L. V. 5.
Tulpe	153. C. IV. 3.
Tute guineische	136. C. II. 4.

## Vase

— gezackte	221. F. IV. 13.
— rothmündige	223. F. IV. 15.
—	222. F. IV. 14.
Venusmuschel ächte	44. K. I. 1.
— aderige	59. K. III. 4.
— ausgefahlte	48. K. II. 4.
— breitblättrige	48. K. II. 3.
— gereifte	47. K. II. 2.
— schiefe	49. K. II. 5.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
Venusmuschel warzige	46. K. II. 1.
— weißbackige	55. K. II. 5.
— weitlippige	54. K. II. 13.
— wellenförmige	54. K. II. 14.
Vielfußschnecke	270. H. I. 16.
Vogeldarm	454. S. 4.
Vogelfuß	266. H. I. 2.
Vogelmuschel	114. Q. III. 8.
Vortreppe	320. I. 5. 17.

Wachsschnirkel	374. N. II. 2.
Wafelmuschel	56. K. II. 17.
Waldhorn	383. N. III. 3.
Waldschnecke	395. N. IV. 1.
Walffischpocke	4. B. 4.
Walzenporzellane	169. D. II. 8.
Warzendotter	415. O. I. 6.
Warzenschnirkel	391. N. III. 14.
Waschbecken	66. M. 2.
Weberspuhl kleiner	184. E. 2.

# Deutsche Benennungen

	Seite
Weib altes	45. K. I. 2.
Weilchen armes	210. F. III. 8.
Weinbergsschnecke gemeine	385. N. III. 5.
— links gewundene	385. N. III. 6.
Weißaug	175. D. IV. 6.
Weitaug	160. D. I. 6.
Wellenhorn	253. G. VII. 3.
Wellenmerite	425. O. III. 10.
Wellenspindel	322. I. V. 20.
Wendeltreppe ächte	362. L. IV. 1.
— gemeine	363. L. IV. 2.
Wirbelhorn	389. N. III. 11.
Wirbelschnecke	335. K. I. 7.
Widderhorn	383. N. III. 3.
Wolfszahn	450. R. 3.
Wolkenbacke	153. C. IV. 2.
Wolkenrolle	149. C. II. 7.
Wulst	186. E. 5.
Wulstknöpfchen	338. K. II. 2.
Würfelkräusel	336. K. I. 9.

# NOMENCLATOR GERMANICVS.

	Seite.
<b>Z</b> ähnen gestreiftes	449. R. 2.
Zahnschraube gefleckte	369. L. V. 7.
Zahnwirbel	381. N. II. 13.
Ziegelherz	32. G. 9.
Zirkelbohrer	145. C. III. 2.
Zirkelscheibe	59. K. III. 3.
Zwibelschale	102. P. 2.
Zwirntute	132. C. I. 10.



# NOMENCLATOR BELGICVS.

## Holländische Benennungen.



	Pag.
<b>A</b> doublet, de griekische	53. K. II. 12.
Aardbesie	33. G. 10.
Achaat - gaaper	51. K. II. 8.
Achaatje	200. F. II. 2. η.

Achaat-

# Holländische Benennungen.

Pag.

Achaat - peer	319. I. V. 16.
Achaat - toot	154. C. IV. 3.
Adama - doublet	93. O. II. 14.
Admiral, opper	134. C. II. 2.
Alykruik	346. L. I. 1.
— geworte	426. O. III. 13.
Arabische Lettershorn	157. D. I. 3.
Arakans - garen	132. C. I. 10.
Arke Noachs foort.	74. N. II. 2.
Argus, dubbelde	158. D. I. 4.
Argus Oogen, gebande	295. I. III. 4.

## B

Baardnyper	12. D. 4.
Babilonfe Tooren	308. I. V. 1.
Bacassan doublet	20. F. I. 3.
Bagyne - drolle	331. K. I. 2.
Bak gekroonde	225. F. V. 1.
Bakje bruingebandeerd	193. E. 15.
Bandpen	214. F. IV. 4.
— genobelde	216. F. IV. 6.
Banket hammetje	24. F. II. 5.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Baſtert - Argus	156. D. I. 1.
Baſtert - Oranje Admiral	146. C. III. 3.
Baſtert - tygers katje	134. C. II. 1.
Baſtert - Wewers ſpoeltje	184. E. 2.
Beddetje, geſtreepte	239. G. II. 10.
Belhorn, franſche	195. E. 17.
— geknobbelde	232. G. II. 1.
— geplekte	231. G. I. 5.
— geribbde	228. G. I. 1.
Bernſteen - Oeſter	103. P. 3.
— paarſche	102. P. 3.
Beuldouplet	15. E. 3.
Bezaan Knop, getaakte	318. I. VI. 7.
Bezaantje	278. H. III. 3.
— opgerolde	279. H. III. 5.
Bezoar, geſchubde	238. G. II. 8.
— gevlackte	239. G. II. 9.
Boerenjonge	252. G. VII. 1.
Boeren Myſik	142. C. II. 12.
Boetje	210. F. III. 7.
Bokje	347. L. II. 1.
Bonne je	432. Q. II. 1.
Bonje	208. F. III. 4.



# Holländische Benennungen

	Pag.
Bootshaak Wuifje	267. H. I. 3.
Bostrappen	320. I. V. 17.
Boterweg	140. C. II. 9.
Brana Hoorn dubbelde	291. I. II. 5.
Brandvlakje	176. D. IV. 7.
Broinet - toot	151. C. III. 9.
Buitslakje	338. K. II. 1.
Bultje	279. H. III. 4.
— gevoord	250. G. VI. 1.

<b>C</b> astanje, bandeerde	301. I. IV. 2.
-----------------------------	----------------

<b>D</b> aadel	198. F. II. 2.
— swarte	201. F. II. 2.
Davids harp	246. G. V. 1.
Diklip	339. K. II. 3.
Dokje huifje	119. A. 1.
Dolphyn, getakte	360. L. III. 6.
Doyer, platte	415. O. I. 5.

Draakje

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Draakje	175. D. IV. 5.
Duifje, broedende	209. F. III. 6.
Duizend been	270. H. I. 6.

<b>E</b> cken - houts toot	140. C. II. 10.
Eende - Schulpe	6. B. 6.
Ezeltje	171. D. III. 2.

<b>F</b> oelie - Bladeren	70. M. 7.
Fonteinbak	66. M. 2.
Fortresse	434. Q. II. 3.

<b>G</b> apper, eeviger	8. C. 2.
Gelsmetje	177. D. IV. 8.
Geneefche toot	136. C. II. 4.
Gnemoë hoorn	317. I. V. 13.
Goldlaken	150. C. III. 8.

Goud-

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Goudmond	349. L. II. 4.
Grasje	432. Q. II. 2.

<b>H</b> aanekam	106. Q. I. 1.
— getakte	107. Q. I. 2.
Hammerje, gedoord	117. R. 3.
Hart, blaasagtig	37. G. 16.
Hart toot	124. C. I. I. $\alpha$ .
— roodt	124. C. I. I. $\beta$ .
Hermelin Staart	141. C. II. 11.
Holzeoor, groot	427. P. 1.
Honds darm	456. S. 7.
Hoogruggetje	186. E. 5.
Hornslangetje	457. S. 8.

<b>J</b> aager - Weytafch	83. O. I. 5.
Jacobs - doublet, spaanfche	81. O. I. 2.
Jacobs Kruck	226. F. V. 2.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Jacobs - schulp.	81. O. I. 1.
Jamboeze, witte	185. E. 4.
Indian	311. I. V. 5.
Jokje	185. E. 3.
Joppe - doublet	82. O. I. 3.
Isabelle	169. D. II. 7.
Juffertje, rood	25. F. II. 7.

<b>K</b> aaphorn	156. D. I. 2.
Kaas, groene.	132. C. I. 9.
Kamelhoorn	276. H. III. 1.
Kamelotje	425. O. III. 11.
Kanartje, gebande	275. H. II. 7.
— geblomde	280. H. III. 6.
— gebulde	281. H. III. 7.
Kapje, gedooord	435. Q. II. 5.
Kapje, geele	444. Q. IV. 4.
— — gestraalte	436. Q. II. 7.
Karkal	380. N. II. 11.
Kasket, graeuwe	241. G. III. 2.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Katetonge	18. F. I. 1.
Katje, geplekte	148. C. III. 6.
—— blaauwe	170. D. III. 1.
Kauris blaauwe	173. D. IV. 3.
—— gemeene geele	173. D. IV. 2.
Kemphaantje	271. H. II. 2.
Kievits - Ey	188. E. 8.
—— witte	187. E. 6.
Kindje, gebakerde	364. L. IV. 3.
Kinkhorn	316. I. V. 12.
Kliphorn, getygerde	167. D. II. 5.
Knobbelhorn	321. I. V. 19.
—— bonte	354. L. II. 10.
Knoll, geknobbelde	306. I. IV. 9.
—— langestaarte gladde	312. I. V. 6.
Knollhorn	191. E. 13.
Kofferhoortje	244. G. IV. 1.
Kokhaan, bonte	38. G. 18.
Kompas - Schulp	82. O. I. 4.
Königs Mantel	84. O. II. 1.
Koral - doublet	85. O. II. 2.
Korelye - Knoopje	182. D. IV. 16.
Kornoelkersje gestippelte	207. F. III. 2, β.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Kornocltje, gebandeerde	206. F. III. 2. 2.
Kousdoublet, getireepte	45. K. I. 3.
Krabbe, geele	269. H. I. 5.
Kroon - hoorn	125. C. I. 2.
— tuetee	126. C. I. 3.
Knipers - Boor	192. E. 14.
— gegranuleerde	145. C. III. 1.
— gladde	251. G. VI. 2.
— witte gevoorde	145. C. III. 2.
Kwaker, gelstraalde	52. K. II. 10.
Kwalle - Bootje	393. N. III. 16.

<b>L</b> andcharten, westindische	144. C. II. 14.
Laurierblad	97. O. IV. 2.
— gekamd	108. Q. I. 3.
Lazarus Klappen, getakte	64. L. I.
Leger, turkische	61. K. III. 6.
Letterschulp, langaagtige	62. K. IV. 1.
Livrey - hoorn	298. I. III. 9.
Lohoensche Hoorntje	274. H. II. 5.

# Holländische Benennungen

	Pag.
Lotskap	439. Q. III. 1.

<b>M</b> aagt - Bloem	75. N. III. 1.
Malpriem	256. G. VIII. 1.
Mantel, gebandeerde	87. O. II. 5.
— — gestippelte	89. O. II. 7.
Mauger Naalde	324. I. VI. 2.
Mazelen	168. D. II. 6.
Mennonist - toot	130. C. I. 7.
Meshammer	97. O. IV. 1.
Messehecht	14. E. 2.
Midas - Oor	196. F. I. 1.
Modervlakje	244. G. III. 5.
Moerberzie, langverpige	302. I. IV. 4.
Moerbey, getakte	300. I. IV. 1.
— — graeuwe	276. H. II. 8.
Mol	162. D. I. 9.
— graeuwe	161. D. I. 8.
— roode	161. D. I. 7.
Monniks - Kappe	216. F. IV. 7.
Moffel	110. Q. III. 3.
— breede purpuragtige	113. Q. III. 5.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Muis	163. D. I. 10.
Munnik graeuwē	201. F. II. 2. 2.
— —	137. C. II. 5.
Musikhoorn	218. F. IV. 10.
— — wilde	221. F. IV. 11.
Muts poolſche	171. D. III. 3.
— —	237. G. II. 7.

<b>N</b> aalde - pen	260. G. VIII 7.
Nagel doublet , gedoornte	31. G. 7.
Nagel - ſchulp	32. G. 9.
Navel - Slak	387. N. III. 9.
— —	410. O. I. 1.
Net - tootje	138. C. II. 7.
Noachs Arck , rechte	73. N. II. 7.
Noote Moskat , getakte	253. G. VII. 3.

<b>O</b> cean - hoorn	289. I. II. 5.
Oeſter	99. O. IV. 2.



# Holländische Benennungen.

	Pag.
Oester gedraaide	72. N. I. 1.
—— okergeele	71. M. 8.
Offerhoorn, witte	224. F. IV. 16.
Oiſtelhoortje	304. I. IV. 7.
Olyfaats, tand	449. R. 1.
Olyhoorn, diklippige	230. G. I. 3.
Olykock, gebulde	294. I. III. 3.
Oorhoorn	299. I. III. 11.
Oorſchulp, witte	408. N. VI. 5.
Oranje - Mantel	92. O. II. 12.
Orgelpypen	13. E. 1.
Oſt en Weſt - doublet	36. G. 15.
Oude Wyfs ſchulp gerimpelde	45. K. I. 2.

<b>P</b> aadchoorn	292. I. III. 1.
Paardevoetje	67. M. 3.
Paertje	182. D. IV. 17.
Pantofeltje	431. Q. I. 2.
Papier - turkſe, zonder lippen	236. G. II. 6.
— — — porcellain horn	164. D. I. 12.
Papier-Kasket, volwaſſe turkſche	235. G. II. 4.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Papiere Nautilus, breed kielde	120. A. I. β.
Parlslakke	121. B. I.
Patelle getepelte	440. Q. III. 3.
— — griekifche	446. Q. V. 2.
Patrys horn	229. G. I. 2.
Pauſe Kroon	218. F. IV. 9.
— — — weſtindiſche	325. I. VI. 4.
Pelicans - Poot	266. H. I. 2.
Pen, gekartede	258. G. VIII. 5.
— — — omwondene	261. G. VIII. 10.
Pennhoorn	217. F. IV. 8.
— — rauwe	213. F. IV. 2.
Peer, gedroeyede	297. I. III. 8.
Perle - moer ſchulp	108. Q. II. 1.
— — — — lange	429. P. 4.
Perspectiv - hoorn	333. K. I. 3.
Petool - hoorn	343. L. II. 2.
Pickenier	261. G. VIII. 9.
Pimpeltje	203. I. IV. 5.
Piffeped	181. D. IV. 15.
Podagra - Krefst	268. H. I. 4.
Poelorontje	422. O. III. 7.
Pofferdoubled, gerib'd	78. N. IV. 1.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Pokje	174. D. IV. 4.
Porphyrt Daadel	197. F. II. 1.
Porphyrtsteene Daadel	200. F. II. 2. 5.
Potfelain hoorn	183. E. 1.
Pothoorentje	122. B. 2.
Pothoorn , europische	382. N. III. 1.
— — gebandeerde	383. N. III. 10.
Prince Begræfenis	199. F. II. 2. 9.
Prince Robertshoorn	334. K. I. 4.
Prince - Vlag	193. E. 16.
Pruim	209. F. III. 5.
Purper - Hoorn gebandeerde	287. I. I. 5.

<b>P</b> raap	312. I. V. 7.
Ramshoorn	383. N. III. 3.
Raspdoublet	95. O. III. 2.
Remies	25. F. III. 1.
Rivier Pauze Kroon	405. N. VI. 1.
Rood . bandje	190. E. II.
Rood - Oog	418. O. III. 1.
Rootshoorn met Moesjeses	302. I. IV. 3.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Rorzdoulet	71. M. 9.
Rys - Korrel	180. D. IV. 14.
Ryſtenbry - hoorentje	243. G. III. 4.
<b>S</b> cheppertje	283. I. I. 1.
Scherfje	49. K. II. 5.
Shild , getygerd	442. Q. IV. 2.
Schildpad - hoorn	159. D. I. 5.
Schildpad Luis	5. B. 5.
Schildpad - toot	136. C. II. 4.
Schildpaſtaert , gedoorende	305. I. IV. 8.
Schout by Nagt	125. C. I. I. 7.
Schwitzersbroek , capitaale	222. F. IV. 14.
— — — — getakte	223. F. IV. 15.
Scorpioentje	290. I. II. 4.
See - Noot	78. N. IV. 2.
Slange - Kop	165. D. II. 2.
— — — — kleene	164. D. II. 1.
Slangen Vellehoorn	352. L. II. 9.
Slangetje	390. N. III. 12.

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Slek - hoorn	416. O. I. 6.
Slet	61. K. III. 7.
Sluik - daadel	202. F. II. 3.
Slyk - Slek	384. N. III. 4.
Snippckop , gedoornde	285. I. I. 3.
— getakte	286. I. I. 4.
Snuite - pen, gedoornde	326. I. VI. 5.
Soldat	358. L. III. 3.
Sooftolatje	177. D. IV. 9.
Speeldoublet	50. K. II. 7.
Speldewerk kuffen	129. C. I. 5.
Spinnekop	284. I. I. 2.
Spockje	152. C. IV. I.
Spoor	351. L. II. 7.
Spraetje	271. H. II. I.
Staate Vlagetje	189. E. 10.
Starre - pen , dikke	265. H. I. I.
Steenbikker	374. N. II. I.
Steen - moffel	109. Q. III. I.
Steenfcheede	7. C. I.
Sterretje	178. D. IV. 10.
Stombje	42. I. 3.
Stormhoed , gebreide	233. G. II. 2.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Stormhoed, geribd westindische	236. G. II. 5.
— — roode	234. G. II. 3.
Strand - Dayer	414. O. I. 4.

<b>T</b> abaks - pip	310. I. V. 3.
Tand, ploedige	420. O. III. 4.
Teepel bak	227. F. V. 3.
Telline, platzydige	24. F. II. 5.
Tellmoffel, roode with straalige	23. F. II. 4.
Toll, gevlake	331. K. I. 1.
— langleevende	351. L. II. 6.
Toornje	215. F. IV. 5.
Toover - Slak	373. N. I. 1.
Top - Slak	391. N. III. 15.
Tovenaar	334. K. I. 5.
Transparant	105. P. 7.
Trommel - Schroef	368. L. V. 5.
Tuitje, witte	323. I. VI. 1.
Tulbande	340. K. II. 4.
Tulband, gerimpelde	352. L. II. 8.
Tulpen	4. B. 3.

Tyger-

# Holländische Benennungen.

	Pag.
Tyger - pen , dunne	257. G. VIII. 2.
Tyger - tong , wilde	58. K. III. 1.

<b>V</b> aas , witte	221. F. IV. 13.
Vellhorn	297. I. III. 7.
Venus - doublet , geribde	28. G. 1.
Venus hart	28. G. 2.
— driezydig	30. G. 5.
Venus Schagt	457. S. 9.
Venus schulp , rechte met Hair	44. K. I. 1.
Vjſch huifje	430. Q. I. 1.
Vlagetje	345. K. III. 2.
Vleermuis	219. F. IV. 11.
Vleeshoorn	273. H. II. 4.
Vleugelhoorn , getakte	277. H. III. 2.
Vleugelhoorntje	287. I. II. 1.
— geplekte	288. I. II. 2.
Vliegge ſchettje	143. C. II. 13.
Vloerken , italianſche	131. C. I. 8.
Voethoorn	196. I. III. 6.
Vogeltje	114. Q. III. 8.

# NOMENCLATOR BELGICVS.

	Pag.
Vorfchen - poppe	294. I. III. 2.
Vyg , fpaanfche	190. E. 12.
<b>W</b> afelyfer	56. K. II. 17.
Wenteltrap	362. L. IV. 1.
Wenteltrapje	363. L. IV. 2.
Whulk	254. G. VII. 3.
— noordfche	315. I. V. 11.
Witooge	175. D. IV. 6.
Wit - rugge , cartageenfche	167. D. II. 4.
Wolfstand, witte	451. R. 4.
Wolkbakje	153. C. IV. 2.
Wolkhoorn	149. C. III. 7.
Wolkje	154. C. IV. 4.
Wydmonder	247. G. V. 2.
Wyd - Oog	160. D. I. 6.
Wyfje , kleene, van den Argus	172. D. IV. 1.
Wynyards - Slak	385. N. III. 5.
Wyzer	272. H. II. 3.



# Hollandsche Benennungen.

Pag.

<b>Z</b> aaagertje	42. I. 4.
Zadel, poolſche	101. O. IV. 7.
Zandmoſſel	114. Q. III. 7.
Zeeohr, geſtrepte	428. P. 2.
Zeepocke	3. B. 2.
Zeepuiſten	2. B. 1.
Zeeſchelling	4. B. 4.
Zeeslangetje	455. S. 5.
Zeeton	334. L. II. 3.
Zes Vloog	179. D. IV. 13.
Zilverlaken	152. C. IV. 1.
Zilvermond	348. L. II. 3.
— — bonte	359. L. III. 5.
— — geplekte	358. L. III. 4.
Zoomtje, geſtreepte	241. G. III. 2.
— gladde	242. G. III. 3.
Zooneltraaf	19. F. I. 3.
— rooſe roodt	16. E. 5.
— violet blauwe	16. E. 4.
Zotskap	66. M. 1.
Zoute Koreltje	166. D. II. 3.

NOMENCLATOR GALLICVS.

Französische Benennungen.



<b>A</b> dmiral, faux orangé	146. C. III. 3.
— — — grand	134. C. II. 2.
Agate bossue	202. F. II. 3.
Agathine	319. I. V. 16.
Aigrette	221. F. IV. 13.
Aile d'ange	271. H. II. 2.
Aile de papillon	136. C. III. 4.
Aïlée bossue	275. H. II. 7.
—— grande	277. H. III. 2.
Alene	261. G. VIII. 9.
Amande	62. K. III. 8.
Amande a cils	74. N. II. 2.
Ane ; petit	171. D. III. 2.
Antale	451. R. 4.
Araignée femelle	267. H. I. 3.
— male	269. H. I. 5.
Arche de Noe	73. N. II. 1.

Ar-

# Französische Benennungen.

	Pag.
Arculaire blanc	244. G. IV. 1.
Argus a boutons	295. I. III. 4.
Argus, faux	157. D. I. 3.
— — grand	158. D. I. 4.
— — petit	172. D. IV. 4.
Arlequine, la fausse	157. D. I. 3.
Arrofoir	457. S. 9.
Assemblage de bojaux	454. S. 3.
Astrolepas	432. Q. II. 1.

<b>B</b> aquet bandé	193. E. 15.
Becasse epineuse	284. I. I. 2.
Bigourneau	346. L. I. 1.
Bistournée	72. N. I. 1.
Bois de chene	140. C. II. 10.
Bonnet de Dragon	439. Q. III. 1.
— polonois	171. D. III. 2.
	237. G. II. 7.
Boffüe	185. E. 3.
Bouche d' Argent	348. L. II. 3.
— — — bariolée	358. L. III. 4.

Bouche

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Bouche d'or	349. L. II. 4.
— — petite	186. E. 5.
Bouclier de Tortue	442. Q. IV. 2.
Bout de Chandelle	130. C. I. 7.
Bouton de Camifole.	334. K. I. 4.
	338. K. II. 1.
Brocard de Soye	154. C. IV. 3.
Brunette	151. C. III. 9.
Buccin unique	313. I. V. 8.
Bulle d'eau	187. E. 6.

<b>C</b> abochon	430. Q. 1. 1.
Cadran	333. K. I. 3.
Came coupée	41. I. 1.
— marquée de Verges	50. K. II. 7.
— truitée	51. K. II. 8.
Campement turque	61. K. III. 6.
Carte géographique	156. D. I. 2.
Casque Bezoard	241. G. III. 2.
— cannelé, gros	239. G. II. 10.
— pavé	238. G. II. 8.

Cas-

# Französische Benennungen.

Pag.

Casque plume	236. G. II. 6.
— trinangulaire	235. G. II. 4.
— tricoté	233. G. II. 2.
— truité	239. G. II. 9.
— tuberculé	232. G. II. 1.
Chagrin	18. F. I. 1.
Chameau	276. H. III. 1.
Chataigne a bandes	301. I. IV. 2.
Chausse trappe	223. F. IV. 15.
— — —	289. I. II. 3.
Chaeuve Souris	219. F. IV. 11.
Chenille blanche	223. I. VI. 1.
Chicorée	291. I. II. 5.
Cloniffe	46. K. II. 1.
Cloporte	181. D. IV. 15.
Cloud	256. G. VIII. 1.
Cocombre pointée	208. F. III. 4.
Coeur allongée	69. M. 5.
Cocur en Arche de Noe	75. N. III. 1.
Cocur de boeuf	66. M. 1.
— epincux	31. G. 7.
— tuillé	32. G. 9.
Cocur enflé	37. G. 16.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Coeur triangulaire	37. G. 5.
— de Venus	28. G. 2.
Colique	173. D. IV. 3.
Conque anatifere	6. B. 6.
— exotique	28. G. 1.
— de St. Jaques, bariolée	81. O. I. 1.
— perfique	247. G. V. 2.
— de Venus, a pointes	44. K. I. 1.
Contre Admiral	125. C. I. 1. y.
Coq bigaré	38. G. 18.
Coquette	302. I. IV. 3.
Coquille de St. Jaques d'Espagne	81. O. I. 2.
Coralline	85. O. II. 2.
Cornalline	200. F. II. 2. η.
Corne d'Amon	122. B. 2.
Cornouille fasciée	206. F. III. 2. α.
— ponctuée	207. F. III. 2. β.
Couronne d'ethiopie	225. F. V. 1.
— — imperiale	125. C. I. 2.
Crapaud	167. D. II. 4.
Crete de Coq	107. Q. I. 2.
Cuiller de Neptune	226. F. V. 2.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Cuillere	437. Q. II. 8.
Culotte de Suisse	294. I. III. 3.

<b>D</b> ail	7. C. I.
Damier	127. C. I. 4.
Datte	109. Q. III. 1.
Dauphin	360. L. III. 6.
Degrés bordés	297. I. III. 8.
Dent de loup	450. R. 3.
Dentale	449. R. 1.
Drap d'argent	236. G. II. 5.
— mortuaire	199. F. II. 2. 8.
— d'or	150. C. III. 8.
— a reseau	139. C. II. 8.

<b>E</b> braique	221. F. IV. 12.
— — —	142. C. II. 12.
— la fausse	134. C. II. 1.
Ecaille de tortue	136. C. II. 3.
Ecorchée	149. C. III. 7.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Ecriture arabique	62. K. IV. 1.
— — grecque	53. K. II. 12.
l'Emeraude	249. G. V. 5.
Enfant au maillot	364. L. IV. 3.
Entonnoir	445. Q. IV. 6.
l'Eperon	351. L. II. 7.
l'Eventail	82. O. I. 4.

<b>F</b> aitiere	66. M. 2.
Feuille	108. Q. I. 3.
— de Choux	67. M. 3.
— de Laurier	97. O. IV. 2.
Figue	190. E. 12.
Flamboyante	129. C. I. 5.
Foret	260. G. VIII. 7.
Forteresse	434. Q. II. 3.
Fraise rouge	33. G. 10.
Fripiere	355. L. II. 12.
Furie flamboyante	77. N. III. 3.
Fuseau	310. I. V. 3.
— étoilé	265. H. I. 1.



# Französische Benennungen.

	Pag.
<b>G</b> ateau feuilleté	70. M. 7.
Gibeciere en Manteau	83. O. I. 5.
Gland de <sup>e</sup> mer rayé	3. B. 2.
— — tulipe	2. B. I.
— — turban	4. B. 3.
Gondolée rayée	189. E. 10.
Gourgandine	51. K. II. 9.
Grelée	166. D. II. 3.
Grenouillette	294. I. III. 4.
Grimace	299. I. III. 11.
Gueule de Loup	373. N. I. 1.
— — noire	274. H. II. 5.
— — de souris	115. Q. III. 6.
Guilochée	26. F. III. 2.

<b>H</b> arpe	246. G. V. 1.
Herisson	300. I. IV. 1.
Hermine	132. C. I. 9.
Hirondelle	114. Q. III. 8.
Huitre	99. O. IV. 4.
— d'ambre jaune	103. P. 3.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

Pag.

Huitre ecailleuse a feuilles

couleur de citron

71. M. 8.

— électrique

102. P. 2.

— epineuse

64. L. 1.

**J**amaïque

60. K. III. 5.

Jambonneau epineux

117. R. 3.

Indienne

311. I. V. 5.

Isabelle

169. D. II. 7.

**L**ampe antique

379. N. II. 10.

Lanterne rouge rayonnée de blanc

16. E. 5.

Lard

305. I. IV. 8.

Leopard rouge

124. C. I. 1. α.

Lepas granuleux

435. Q. II. 5.

Lévantine

46. K. I. 4.

Lievre

159. D. I. 5.

**M**anche de Couteau

13. E. 1.

— — courbée

15. E. 3.

# Französische Benennungen.

	Pag.
Manche de couteau femelle	13. E. 2.
Monteau bandé	87. O. II. 5.
— — ducal	84. O. II. 1.
— — d'orange	92. O. II. 12.
— — pointillé	89. O. II. 7.
Marteau	97. O. IV. 1.
Massue la grande	285. I. I. 3.
— — d'Hercule	286. I. I. 4.
— — lifse	312. I. V. 6.
Mere Perle	108. Q. II. 1.
Mignature	216. F. IV. 6.
Millepied	270. H. I. 6.
Minaret	216. F. IV. 6.
Minime	138. C. II. 6.
Misaine roulée	279. H. III. 5.
Monnoye de Guinée	173. D. IV. 2.
Moresque	201. F. II. 2. A.
Moskat	253. G. VII. 2.
Moule	110. Q. III. 3.
— arborifée	111. Q. III. 4.
— des peintres	11. D. 2.
— de la terre des Papous	114. Q. III. 7.
Mure allongée	302. I. IV. 4.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Muscade	188. E. 8.
Musique	218. F. IV. 10.

<b>N</b> appe d' Italie	131. C. I. 8.
Nassavienne	347. L. II. 2.
Navet	132. C. I. 10.
— a longue queue	312. I. V. 7.
Navette petite	184. E. 2.
Nautile a cloisons	121. B. I.
Nautile papyracé	119. A. I.
— — a carene retrecie	119. A. I. $\alpha$ .
— — a large carene	120. A. I. $\beta$ .
Noix de mer	78. N. IV. 2.

<b>O</b> belisc chinois	328. I. VI. 3.
Oeil de bouc	434. Q. II. 4.
Oeuf	183. E. I.
Olive	198. F. II. 2.
Olive de fatin	201. F. II. 2. $\kappa$ .
— fatinée a bandes	200. F. II. 2. $\zeta$ .

# Französische Benennungen.

	Pag.
Oreille d'ane	272. H. II. 3.
— — —	429. P. 4.
— de Cochon	106. Q. I. 1.
— — —	273. H. II. 4.
— de Geant	352. L. II. 9.
— de Mer, grande	427. P. 1.
— marbrée	428. P. 3.
— firiée	428. P. 2.
— de Midas	196. F. I. 1.
— de Venus	408. N. VI. 5.
l'Oublie	188. E. 9.

<b>P</b> agode	351. E. II. 7.
Parasole	436. Q. II. 5.
Patte de Crapaud	290. I. VI. 4.
— — d'Oie	266. H. I. 2.
Peau d'ane	174. D. IV. 4.
— — de Chagrin	144. C. II. 6.
— — de Tigre	167. D. I. 12.
Pelote de beurre	140. C. II. 9.
Pelure d'oignon	102. P. 1.
Perdrix	229. G. I. 2.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Perdrix a grosse levre	230. G. I. 3.
Petoncle sans Oreilles	78. N. I. 1.
Pholade, grande de l'Amerique	8. C. 2.
Picotée	148. C. III. 6.
Pie	358. L. III. 3.
Pigeon couvant	209. F. III. 6.
Pigeonne	279. H. III. 4.
Pince de Chirurgien	24. F. II. 5.
Piquure de Mouche	143. C. II. 13.
Planorbe , grand	382. N. III. 1.
— — terrestre	374. N. II. 1.
Pointillage blanc	175. D. IV. 6.
Poire seche	297. I. III. 8.
Porcellaine etoilée	178. D. IV. 10.
— — marbrée	164. D. I. 12.
Porphyre	197. F. II. 1.
Pou de Baleine	4. B. 4.
— de Mer	179. D. IV. 13.
Poulette	104. P. 6.
Pourpre a bandes	287. I. I. 5.
— — tacheté	288. I. II. 2.
— — triangulaire ailé	287. I. II. 1.
Prune	209. F. III. 5.

# Französische Benennungen.

Pag.

<b>Q</b> uacre rayonné	52. K. II. 12.
Quenotte	420. O. III. 4.
Queue d'Hermine	141. C. II. 12.

<b>R</b> acrocheuse	292. I. III. 1.
Radix	191. E. 13.
— le gros	306. I. IV. 9.
Ratiffoir	95. O. III. 2.
Rave	224. F. IV. 16.
Rezeau blanc	57. K. II. 18.
Rhinoceros	296. I. III. 6.
Ruban	193. E. 16.

<b>S</b> abot marbré	331. K. I. 1.
Sandale	431. Q. I. 2.
Scalata, fausse	363. L. IV. 2.
— — vraie	362. L. IV. 1.
Scarabée	103. P. 5.

# NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
Scie	42. I. 4.
Scorpion	268. H. I. 4.
Selle de Pologne	101. O. IV. 7.
Soleil levant	15. E. 4.
Sorciere	334. K. I. 5.
Souris	163. D. 10.
Spécère	152. C. IV. 1.

<b>T</b> apis	321. I. V. 19.
Tarriere	192. E. 14.
— blanche et cerclée	145. C. III. 2.
— chagrinée	145. C. III. 1.
Tasse de Neptune	227. F. V. 3.
Taupe	162. D. I. 9.
— rousse	161. D. I. 7.
Telescope	344. K. III. 1.
Telline bariolée de violet & blanc	20. F. I. 5.
— fluviatile	12. D. 3.
— radiée	19. F. I. 3.
— rayée de couleur de chair	20. F. I. 5.

Tete



# Französische Benennungen.

	Pag.
Tete de Becasse	283. I. I. 1.
— de Dragon	175. D. IV. 5.
— de Meduse	433. Q. II. 2.
— de Serpent	165. D. II. 2.
— — —	271. H. II. 1.
— — petite	164. D. II. 1.
Tiare episcopale	217. F. IV. 8.
— papale	218. F. IV. 9.
Tigre noir	124. C. I. 1.
Tonne cannelée	228. G. I. 1.
— dentelée	231. G. I. 5.
Tour de Babel	308. I. V. 1.
— de Coppenhague	250. I. VI. 1.
Tourterelle	278. H. III. 3.
Treillis	446. Q. V. 2.
Tricotée	56. K. II. 17.
Tronquée	42. I. 3.
Truitée	168. D. II. 6.
Tulipe	154. C. IV. 3.
Turban rouge	234. G. II. 3.

## NOMENCLATOR GALLICVS.

	Pag.
<b>V</b> erniculaires blanc & triangulaires	452. S. I.
Verole petite	180. D. IV. 14.
Vieille ridée	45. K. I. 2.
Vilebrequin	455. S. 5.
Vis de pressoir	260. G. VIII. 8.
Vis tigrée	257. G. VIII. 2.
Vitre chinoise	105. P. 7.
Volute panachée	152. C. III. 10.
 <b>Z</b> ig-zag	 54. K. II. 13.

---

## NOMENCLATOR ANGLICVS.

### Englische Benennungen.

<b>A</b> gathe Chama	51. K. II. 8.
Amber - Oyster, small	103. P. 3.
Amboina scallop, common	83. O. I. 3.
Arabian - shell	62. K. IV. 1.
Arck, spotted	78. N. IV. 1.
— virgin	75. N. III. 1.

Ar-

# Englische Benennungen.

	Pag.
Argus, little Wife of	172. D. IV. 1.
Argus shell	158. D. I. 4.
Argus shell, girdled	293. I. III. 5.
Ass Gowry	171. D. III. 2.
Augur Peg, speckled	192. E. 14.
<b>B</b> abel Shell	308. I. V. 1.
Balanus, great, wide mouthed	4. B. 3.
— — grey, narrow mouthed	3. B. 2.
Barnacle, common english	2. B. 1.
— — tortoise wart	5. B. 5.
Batt Musik stamper, long	219. F. IV. 11.
Beetle Porcelaine	177. D. IV. 9.
Bischops Miter shell	217. F. IV. 8.
Blaaws stamper	126. C. I. 3.
Black - moors - tooth	173. D. IV. 2.
Blobber - lipt	266. H. I. 2.
Bodkin, tooth'd	258. G. VIII. 5.
Brittle Saylor, course	120. A. I. β.
— — — great	119. A. I. α.
Broadlip, horned	172. H. II. 3.

Broad

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Broadlip knobb'd	271. H. II. 1.
Buff Gowry	161. D. I. 7.
Burg's stamper	134. O. II. 3.

<b>C</b> ados Shell, wide	292. I. III. 1.
Cake Shell, thik - lipt	390. N. III. 12.
Caltrup Shell	289. I. II. 3.
Camel - Nerit	425. O. III. 11.
Camp	197. F. II. 1.
— turkische	61. K. III. 6.
Canary, broad knobbed	280. H. III. 6.
— girdled	275. H. II. 7.
— great	278. H. III. 3.
— hunch - bakt	279. H. III. 4.
— long knobbed	280. H. III. 7.
Canoe Shell, smal indian	431. Q. I. 2.
Carpe muscle, deep furowed	113. Q. III. 6.
Caroline muscle	114. Q. III. 7.
Cartagena Gowry	167. D. II. 4.
Ceram Coronet	225. F. V. 1.
Ceram Spuc - Shell	223. F. IV. 13.
Chain stamper, small	146. C. III. 3.

Cha-

# Englische Benennungen.

Pag.

Chama, truncated, smouthed	51. K. II. 9.
— violet and white	41. I. 1.
Cheefe Shell, great, girdled, Brasil	383. N. III. 3.
— great, River	382. N. III. 1.
— Land	374. N. II. 1.
Cheker Cockle, grained	58. K. III. 1.
Chesnut, great	301. I. IV. 2.
Cloudy - Stamper	154. C. IV. 4.
Cockle, with heary streaks	78. N. IV. 2.
Cocquet	302. I. IV. 2.
Conch, large	277. H. III. 2.
Corall scallop	83. O. I. 5.
Couvin	346. L. I. 1.
Cross Cokle	62. K. III. 8.
Crown, papal	218. F. IV. 9.
Crown stamper	125. C. I. 2.
Curry Comb Oyster	106. Q. I. 1.

**D**evils Claw, female  
Diamond stamper, blak  
Dice Gowry cloudy

267. H. I. 3.  
142. C. II. 12.  
250. G. VI. 1.

Dice

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Dice Nerit	410. I. 1.
Dog - tooth Shell	451. R. 4.
Doyer whelk	414. O. I. 4.
Dragon Gowry	175. D. IV. 5.
Dvelwe Fingers	270. H. I. 6.

<b>E</b> ar, hairy	299. I. III. 11.
— white	408. N. VI. 5.
Ear - Shell, great	427. P. 1.
Endive Shell	291. I. II. 4.
Egg Gowry, white	183. E. 1.
Elephan's - tooth	449. R. 1.

<b>F</b> ary Stamper	152. C. IV. 1.
Feather Stamper	236. G. II. 6.
Finger Oyster great,	107. Q. I. 2.
Flying Muscle	114. Q. III. 8.
Fortresse	434. Q. II. 3.

# Englische Benennungen.

	Pag.
Furrow pen	261. G. VIII. 9.
Fyg whelk	190. E. 12.

<b>G</b> arter stamper	132. C. I. 10.
Giants Ear , great	352. L. II. 9.
Goats Ey Limpet	434. Q. II. 4.
Goldbrocade	150. C. III. 8.
Goose Shell	6. B. 6.
Govry saffron toothed	168. D. II. 6.
Saltspekled	166. D. II. 3.
— whit eyed	175. D. IV. 6.
Grain Cockle	32. G. 8.
Grain Girdled stamper	146. C. III. 3.
Grater - scallop	95. O. III. 2.
Green stamper	132. C. I. 9.

<b>H</b> am Muscle , priley	117. R. 3.
Hammer Oyster	79. O. IV. 1.
Harp Shell	246. G. V. 1.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Heart Cockle exotic	28. G. 1.
— — girdled	58. K. III. 2.
— — human	28. G. 2.
Hebrew Gowry , great	156. D. I. 1.
Hogs Ear - Oyſter	108. Q. I. 3.
Honez Comb Cockle	127. C. I. 4.
Horſe - hoof	67. M. 3.

St. <b>J</b> ames Cockle	81. O. I. 1.
Indian Dipper	188. E. 8.
Iſabelle Gowry	169. D. II. 7.

<b>K</b> asket, knot - liſted	232. G. II. 1.
— — —	233. G. II. 2.
— — ſmal curl'd	241. G. III. 1.
— — ſmooth, gray	241. G. III. 2.
— — ſmooth, lipd	242. G. III. 3.
Kasket Shell red	234. G. II. 3.
Knob fingers	268. H. I. 4.
Koffer Shell, ſmall	244. G. IV. 1.



# Englische Benennungen.

Pag.

<b>L</b> eghorn Govry kin, small	185. E. 3.
Leopard, great	167. D. II. 5.
Leopard - stamper, great yellow	140. C. II. 9.
Lighter, twisted	27. N. I. 1.
Limped beaked	
— — craked Barnstable	445. Q. V. 1.
— — thimble	446. Q. V. 2.
— — wart rib'd	448. Q. V. 4.
— — white, rib'd	432. Q. II. 1.
Lohoe broad - lip	274. H. II. 5.
Loufe - Gowry	179. D. IV. 13.

<b>M</b> agos Peg	324. I. VI. 2.
Magpye. top Shell	358. L. III. 3.
Maiden - Muscle	44. K. I. 1.
Mantel scallop ducal	48. O. II. 1.
Map - Shell	158. D. I. 4.
Marble date, purple	200. F. II. 2. 5.
Massle Gowry, long	174. D. IV. 4.
Melon, clouded	226. F. V. 2.
Melon - tun	227. F. V. 3.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Midas Ear	196. F. I. 1.
Monk, gray	137. C. II. 5.
Mulberry Shell	302. I. IV. 4.
Murex blue and white	305. I. IV. 8.
— common, thormey	286. I. I. 4.
— pointed	313. I. V. 8.
. Muscle conted	74. N. II. 2.
Mufik Shell	218. F. IV. 10.
— oriental	221. F. IV. 12.
— white	221. F. IV. 13.

<b>N</b> ail scallop, wife of	66. M. 2.
Naffau Shell	347. L. II. 2.
Nerit, deep, rig'd	426. O. III. 13.
— red	419. O. III. 1.
— twin girdled	413. O. I. 3.
— white	406. O. I. 6.
Nestors - top, great	351. L. II. 6.
Nipple Gowry - kin, white	185. E. 4.
Noahs Lighter	73. N. II. 1.

# Englische Benennungen.

	Pag.
<b>O</b> aker - wood Stamper	140. C. II. 10.
Olive Gowry, freckled	171. D. III. 3.
Olive Shell	198. F. II. 2.
— clouded	202. F. II. 3.
Oren Shell	456. S. 7.
Oxheart Cockle	31. G. 7.
Oxheart Shell, rough	32. G. 9.
Oyster	99. O. IV. 4.
— chinese pelluind	105. P. 7.
— great prikley	64. L. I.

<b>P</b> aper Nautilus	119. A. I.
Parement, italian	131. C. I. 8.
Partridge great, spat ribd	231. G. I. 5.
— indian	229. G. I. 2.
— round	191. E. 13.
— thik lipd	230. G. I. 3.
Pearl Gowry	182. D. IV. 17.
Pearl Oyster	108. Q. II. 1.
— the flat	101. O. IV. 7.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Pearl river muscle	11. D. 2.
Peg, white snouted	323. I. VI. 1.
Persian Shell	247. G. V. 2.
Pholas, deaeep furrowed	8. C. 2.
Pidak, oblong white	7. C. 1.
Plough	271. H. II. 2.
Poeloroon Nerit	422. O. III. 7.
Popes Crown, knopped	325. I. VI. 3.
Porcellain, yellow zoned	162. D. I. 9.
Porphyry Shell	151. C. III. 9.
Pot wattering	457. S. 9.
Prince Stamper	199. F. II. 2. 8.

<b>R</b> amshorn	122. B. 2.
Razor Shell, blueisch crooked	15. E. 3.
— — little, strait	13. E. 2.
— — thik	13. E. 1.
Rice Gowry	180. D. IV. 14.
River ragged mouth	373. N. I. 1.

# Englische Benennungen

	Pag.
Sail Shell thik	121. B. I.
Sandtamper	143. C. II. 13.
Saylor, course brittle	120. A. I. $\beta$ .
— great brittle	119. A. I. $\alpha$ .
Scallop, litte yellow	84. O. II. 1.
— thin	82. O. I. 4.
Sea Ear, long	429. P. 4.
Seeren Shell, rough	326. I. VI. 1.
Silver Gowry kin, blakspekled	208. F. III. 4.
Silvermouth	348. L. II. 3.
— — spotted	858. L. III. 4.
Snail, echinated	360. L. III. 6.
— golden mouthed	349. L. II. 4.
Snailshell, smouth girdled	384. N. III. 4.
Snake Gowry, small	164. D. II. 1.
Snippe, thorney	285. I. I. 3.
Solen, thik, red	16. E. 5.
— violet purple, papyraceons	15. E. 4.
Spider Shell	269. H. I. 5.
Spindle Shell	310. I. V. 3.
Spinnet Shell	333. K. I. 3.
Spur Shell	351. L. II. 7.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Spur Shell small	300. I. IV. 1.
Stair Cafe, royal	362. L. IV. 1.
— — small	363. L. IV. 2.
Stamper, net lifted	129. C. I. 5.
Starkake, wrinkled	4. B. 4.
Star Gowry	178. D. IV. 10.
Strawberry heart Cockle	30. G. 5.
— — red	33. G. 10.
Stone piercer	109. Q. III. 1.
Stone whelk	196. I. III. 6.

<b>T</b> abby Stamper	148. C. III. 6.
Tellin, rayed	19. F. I. 3.
Thik-top	339. K. II. 3.
Top, great waved	331. K. I. 1.
Tooth Shell, striated	449. R. 2.
Tourtlet Govry, great	159. D. I. 5.
—— Leopard great	165. D. II. 2.
Tree Oyster	97. O. IV. 2.
Tritons Trumpet	316. I. V. 12.

# Englische Benennungen.

	Pag.
Trochus , prikley	350. L. II. 5.
Trumpet - knobbed	294. I. III. 3.
Tullip tellina	23. F. II. 4.
Tulip Shell	154. C. IV. 4.
Tyger Shell	124. C. I. 1.
Tygershorn brownn	257. G. VIII. 2.
Tygerstamper	149. C. III. 7.
Tyger tooth	256. G. VIII. 1.

<b>V</b> elk Nerit	415. O. I. 5.
--------------------	---------------

<b>W</b> art Gowry	182. D. IV. 16.
Wax Stamper	130. C. I. 7.
Wedge Muscle	24. F. II. 4.
Whelk	254. G. VII. 3.
— common english	315. I. V. 11.
— great net	279. H. III. 4.
— heary	297. I. III. 8.
— least ragged	290. I. II. 4.

# NOMENCLATOR ANGLICVS.

	Pag.
Whelk persian	235. G. II. 4.
— small laticed	254. G. VII. 4.
— small prikle	304. I. IV. 7.
— small rough	252. G. VII. 1.
— spiked	276. H. III. 1.
Whirligig, Indian	344. K. III. 1.
Woman, old	45. K. I. 2.
Woodcock Shell	283. I. 1.
— — thorney	284. I. I. 2.

<b>Z</b> igzag Chama	53. K. II. 12.
----------------------	----------------

---

W I E N ,  
gedruckt bei Joseph Gerold, kais. Reichshof-  
raths- und Universitätsbuchdruckern.

I 7 7 8.



# E R R A T A.

Pag.


21. F. I. 6. Knor. Vergn. II. 20. t. 1. f.  
 21. F. I. 6. ——— VI. 11. t. 2. f.  
 23. F. II. 4. ——— II. 19. t.  
 23. F. II. 4. ——— IV. 2. t; 24. f.  
 24. F. II. 5. ——— II. 2. t.  
 26. F. III. 1. Lilt. H. C. 1. 2.  
 26. F. III. 2. mondförmigen  
 27. F. III. 3. Lilt. H. C. 1. 2.  
 29. G. 2. Knor. Vergn. I. 18. t. 2. f.  
 42. I. 3. Das Stümpchen  
 42. 1. 5. Donax  
 42. 1. 5. Knor. Vergn. V.  
 50. K. II. 7. ——— II.  
 54. K. II. 12. ——— I. 21. t. 4. f.  
 54. K. II. 13. Zigzag  
 63. L. dicke Zähne, zwischen eine Grube  
 71. M. 8. verlängerte Schale  
 75. N. II. 2. Knor. Vergn. II. 27. t.  
 90. O. III. 9.  
 96. O. III. 4. Ostrea  
 101. O. IV. 7. plattgedrückte  
 133. C. II. 7. breite eiförmige  
 158. D. I. 4. Grand Argus  
 160. D. I. 6. Linn. S. N. Sp. 320.  
 174. D. IV. 3. Knor. Vergn. II. 9. t.  
 188. E. 9. verkehrt eiförmige  
 203. F. II. 4. schief gespaltene  
 204. F. II. 4. γ. lang mit braunen  
 204. F. II. 4. δ. Knor. Vergn. VI. 34. t. 45. f.  
 209. Knor. Vergn. IV. 21. t. 3. 4. f.  
 215. F. IV. 5. longitudinalibus  
 221. D. Hebraique  
 224. F. IV. 16. β. Knor. Vergn. VI. 22. 2. f.  
 227. F. V. 2. Knor. Vergn. V. 28. t. 1. f.  
 233. G. II. 7. ——— III. 8. n. 2. f.  
 276. H. III. 1. tuberculato  
 283. I. I. 1. the comonon  
 309. I. V. 1. Argenv. Conch. Pl. 12. f. M.  
 312. I. V. 5. ——— Pl. 10. f. A.  
 319. I. V. 16. ——— Pl. 13. f. K.  
 328. I. VI. 7. ——— Pl. 11. f. L.  
 328. I. VI. 7. Obelisc chinois  
 328. I. VI. 7. β. ex fusco luteo  
 333. K. I. 3. Argenv. Conch. Pl. 9. f. M.  
 334. K. I. 4. ——— Pl. 11. f. L. Q.

corrige

- II. 20. t. 5. f.  
 V. 11. t. 2. f.  
 1; 19. t.  
 IV. 2. t. 4. f.  
 IV. 2. t.  
 Lilt. H. C. 1. 3.  
 mondförmigen  
 Lilt. H. C. 1. 3.  
 I. 18. t. 3. f.  
 Das Stümpchen.  
 Donax.  
 Knor. Vergn. VI.  
 ——— VI.  
 ——— I. 21. t. 5. f.  
 Zigzag.  
 dicke Zähne, und dazwi-  
 schen eine Grube.  
 verlängerte Klappe.  
 II. 2. t  
 O. II. 9.  
 Ostrea.  
 plattgedrückte.  
 neförmige.  
 Grand Argus.  
 S. N. Sp. 330.  
 IV. 9. t.  
 fast eiförmige  
 schief gefaltene.  
 weiß mit braunen  
 VI. 34. t. 4. 5. f.  
 IV. 21. t. 3. f.  
 longitudinaliter.  
 L'hebraique.  
 VI. 27. t. 2. f.  
 V. 28. t. 2. f.  
 III. 8. t. 2. f.  
 tuberculata.  
 the common.  
 Pl. 9. f. M.  
 Pl. 9. f. A.  
 Pl. 10. f. K.  
 Pl. 11. f. α.  
 Obelisc chinois.  
 ex fusco lutea.  
 Pl. 8. f. M.  
 Pl. 8. f. L. Q.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 334. K. I. 5. le Sorciere                     | la Sorciere.           |
| 335. K. I. 5. Argenv. Conch. Pl. 11. f. S.    | Pl. 8. f. S.           |
| 343. K. II. 9. Turbo crocatus                 | Trochus crocatus.      |
| 348. Knor. Vergn. I. 3. t. 3. f.              | I 3. t. 4.             |
| 349. L. 4. Schale hat                         | Schale ist             |
| 351. L. II. 6 ist mit auf den Gewinden        | ist auf den Gewinden.  |
| 351. L. II. 7 blattgedrückten                 | platgedrückten.        |
| 352. L. II. 7 Knor. Vergn. III. 20 t. 1. f.   | IV. 4 t. 2. f.         |
| 352. L. II. 8. gestreifte Schale hat          | gestreifte Schale ist. |
| 354. L. II. 10. convexo nodosa obtusa         | convexa obtusa.        |
| 365. L. IV. 4. Berl Mag. IV 2. t. 3. f.       | omittatur.             |
| 376. N. II 5. Knor. Vergn. VI, 26. t.         | V. 26 t.               |
| 380. N. II. 12. Helix maculata                | Helix maculosa.        |
| 381. N. III. 2 gelblicher Schale              | gelblicher Farbe.      |
| 403. N. V 3. Helix plicata                    | Helix plicaria.        |
| 425. O. III. 11. Knor. Vergn. II. 9. t. 1. f. | omittatur.             |
| 449. R. I. Knor Vergn I. 19. t.               | 29. t.                 |
| 458. Knor. Vergn. IV. 28. t. 2. f.            | IV. 28. t. 1. f.       |



















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00317970 2

nhmoll QL406.B73

Index rerum naturalium Musei Caesarei Vi